


DE STIRPIVM COLLECTIONE TAB

BVLAE TVM GENERALES,
TVM PER DVODECIM MEN-
ses, cum Germanicis nominibus, & alijs ha-
ctenus à nemine traditis, olim per Conra-
dum Gesnerum conscriptæ ac æditæ: nunc
authoris opera locupletatæ, & de no-
uo in vsum Pharmacopolarum
luci datæ,



PER CASPARVM VVOLPHIVM
Tigurinum Medicum.

ACCESSERVNT DE STIR-
pibus earum partibus tabulae ex Theo-
phraستي præcipue libris confectæ,
eodem Gesnero authore.



TIGVRI
IN OFFICINA FROSCHO.
ANNO M. D. LXXXVII.



CASPARVS VVOL

PHIVS TIGVRINVS MEDICVS,

D. LVCAB STOECKLIO PHAR-

macopolæ Constantiensi fideli & in-

dustrio, amico suo

S. D.



QVANTVM in medicamento-
rum, quæ in vsum medicum ad-
uocantur, tum in vniuersum o-
mnium, tum verò potissimum
stirpium ipsarum, exacta cogni-
tione scitum sit, id ipsum, vir industrie, abundè
testatur, non solum ea voluptas, quæ foris oculo-
s, & animum intus mirificè afficit atque ob-
lectat, & præterea honestas, quæ ex cognitione
manat, & sola hominis est ornamentum: verum
insuper & quidem cum primis hæc ad benè fa-
liciterq; viuendum utilitas, qua nihil magis se-
cundum naturam est. Quum enim Deus Opt.
Max. pro sua diuina providentia facilè nouis-
set, quis esset futurus hominis status aut condi-
tio, quæne in morbos præceps & perpetua rui-
na: varijs hisce morborum incommodis, varia
quoque, eademq; admirandis viribus prædita
antidota statim opposuit, ne qui modò in lucem
esset editus homo, aut per omnem reliquam vi-

EPISTOLA.

tam miserè degeret, aut penitus ab exortu sta-
 tim succumberet atq; periret. Quin insuper ei-
 dem etiam, & ea ipsa cognoscendi, recte q; iisdē
 utendi notitiam studiumq; ingenuit: quod pro-
 pensissimæ erga nos suæ voluntatis argumen-
 tum est. Hinc nimirum, quia maximam esse hu-
 ius cognitionis præstantiam paulatim homines
 persentiscerent, eorundemq; usu, natura huma-
 næ imbecillitati subsidia magna cōparari, quo-
 tidianum comprobaret experimentum: factum
 est, ut omnis generis & conditionis, summæ, in-
 fimæ, homines: ὡς φίλ & αὐτῶ πᾶς ἀνθρώ-
 π & φύσει τέλει. quotidie ad obseruandum,
 & amplius experiendum studio & animi quasi
 quodam impetu ferrentur: id quod multorum
 nostri & superioris seculi scripta selecta lucu-
 lenter testantur. Nam quia hæc materia varia
 & multiplex, proindeq; non vno tantum modò
 afficiat, delectet, & ad sui cultum inuitet: pro
 cuiusq; ingenio & voluntate, modò hæc eius par-
 tem, modò illam familiarius tractare, studioseq;
 excolere singuli instituerunt: Sunt etiamnum,
 & ante hæc fuerunt tempora multi, qui externa
 tantum stirpium facie oblectati, sexuum inue-
 nerunt discrimina, partium singularum linea-
 menta curiosius obseruarunt, & singulis inge-
 niosas insuper descriptiones affinxerunt: quæ
 profecto

EPISTOLA.

profecto cōtemplatio, vti per se est iucunda gratia, ita quoq; in medico vsu, sua non destituitur vtilitate. Plurimos contra videas admirari, reconditam illam interius, penitusq; abditam formam, solam miraculorum omnium, quæ hodie in medicina passim & multa & magna fiunt, effectricem causam: facultates dico, cū specificas & occultas, tū manifestas, hoc est, primas, & eas quæ has proximè sequuntur. Atq; hi quidem, dum quod quærendo experiendoq; sunt consequuti, omne ad communē vitæ vsum contulerunt, laude egregia apud quoscunq; sunt conspicui, inter doctos verò amplissimis dignitatum titulis clari. Ceterum ad comparandam absolutam huius contemplationis studiūq; notitiam (dummodo quod profuturum nouimus, ad vsum vitæ conferendum quoque arbitremur) præterea etiam requiritur diligens & accurata Præparatio: & qui hanc rectè præcedit, in colligendo asseruandoq; cum ratione Delectus: in quibus duabus partibus, commentando exornandoq; haud perinde multos speciatim laborasse nouimus. Quantum verò referat, quamq; sit necessaria tum Medici tum Pharmacopolæ diligens & exquisita circa stirpiū, earundemq; partium ad vsum collectionē conseruationemq; industria, (de præparandi namq; ratione hoc loco non agimus) sæpe hætenus ipse nos rerum

EPISTOLA.

euentus satis superq; docuit. Qui enim hac in
 parte committuntur errores, quæ temporis lo-
 ciq; curiosam rationem & tempestiuam expo-
 scunt obseruationem, plerunq; non ægri solùm
 valetudinem in discrimen vocant, sed ipsius
 quoq; medici, quantumvis præstantis famæ exi-
 stimationiq; periculum creant: nec nisi pœniten-
 do, quicumq; sic error commissus fuerit, corrigi
 potest. In grauem errorẽ inducunt, nostramq; ex-
 pectationẽ prorsus decipiunt compositorum vi-
 res, si, quibus ea constant, facultates ignauæ &
 inertes, aut prorsus obsoletæ fuerint. Proinde
 non sine ratione Galenus in Theriacæ compo-
 sitione, simplicia omnia & quidem singula seor-
 sim eam componentia, diligenter exploranda
 præcipit: ne tota antidotus inutilis reddatur:
 ἢ ὡς ἐν τῷ τὴν ὁδὸν ἡγῶντα, inquit ille, πολλαὶ
 ὁδοὶ εἰς τὴν πᾶντα. In idẽ studiũ nobis quoq;
 quotidie medicamenta præscribentibus, incum-
 bendum est, vt ea, si modo profutura speremus,
 theriacæ nomen & antidoti, contrā præsentis
 morbi vim, habeant, ea tantũ assumendo, quæ
 fuerint viribus integra, & in suo genere præ-
 stantia. Quid enim quæso attinet, simplicium fa-
 cultates nouisse, si nullæ insint? putare autem
 inesse, quum non insint, quod colligentis siue in-
 scitia siue negligentia, non naturæ vitio acci-
 dit, viri

EPISTOLA.

dit, viri prudentis non est. Magna igitur medicina nostræ pars in medicamentorum delectu posita est, maior medici gloria, & maxima agrorum spes. Solatium ingens est agrotis, si medicamentorum auxilia præsentia esse viderint: in maiorem verò spem eriguntur, quum de inuentis præscriptisq; remedijs, & eorum integritate nihil penitus sibi dubitandū nouerint. Hæc aliāq; cum satis nota essent Gesnero nostro, putauit suo labore & studio huic necessitati obuiam eundum. Quare ante multos annos, de herbarum, florum, fructuum, &c. colligendi tempore, & conseruandi reponendiq; modo & loco, tabulas generales & particulares edidit, breues quidem illas, pro occasionis nimirum præsentis ratione, alterius verò operis, & plenioris considerationis, quasi quoddam rudimentum. Atque hoc suum propositum persequutus procul dubio fuisset, si Dei voluntate ætas ei fuisset prorogata. In eum namq; finem, paulatim plura obseruare & consignare cæpit, quæ ad locupletandū exornandūq; priorem laborem spectabant. Verum haud incommodò, quum per fati necessitatem suum perficere institutum ipse prohiberetur, voluntatem eius promouit hoc tempore, quo res necessariae omnes in angustum sunt contractæ, Typographus noster, qui, ut interea dum ad Germanorum πτυχες ipse descendit, in suorum

EPISTOLA.

operariorum gratiam, ut illorum nimirum domesticam necessitatē subleuaret, hunc qualemcunque à me flagitando, impetrauit. Quaecumque igitur ipse vel studio obseruauit, vel quotidie in hortulo proprio producta vidit, eadem nos, pro ut ipse instituerat, duplici ordine, secundū florum fructuumque tempora disposuimus. Alphabeticè primum: ita enim initia & fines florendi, fructificandi, commodè indicari, & quæ de vna stirpe hætenus diuersis in locis scripta legebantur, coniuncta & simul apparere, putauit. Deinde verò iuxta primum institutum, sed breuius, etiam secundum Menses, adiectis plerisque Germanicis appellationibus. Ad generalē verò tabulam accessit, ex clarissimi Matthioli in Dioscoridem commentarijs, de eodem argumento, quod placere poterit. In frontem in super totius libri retulimus generales aliquot de stirpibus, ex Theophrasti magna ex parte libris, depromptas tabulas, nec inelegantes nec inutiles: quas, si per paginae spacium licuisset rectius diducere, & membra membris opponere, multò elegantiores & ad vsum aptiores apparerent. Cæterum hunc Gesneri libellum, & meum in eundem collatum laborem, tibi vir spectatissime, offero & multis de causis dedico. Ac primo quidem, quod cognitum habeam, te authoris, quandiu in viuisset & obseruatorem semper
& ami-

EPISTOLA.

et amicum extitisse. Deinde, ut quoniam hic liber præcepta et instituta præscribit, quibus futuri Pharmacopola instruendi informandiq; sunt: tuq; ipse eius artis usu excellis, præceptisq; egregie præ cæteris abundas: per te tyrones non officij solùm sedulò admoneantur, sed tyrocinij sui etiam rudimenta deponant, rectiusq; ad proxim accedant. Ad has accedit præterea etiam ea, quam ipse iam pridem tum domi tuæ laute accipiendo, tum hic familiariter conuersando, multis tuis humanitatis et beneuolentiæ officijs mihi præbuiisti. Ne itaq; ingratus omnino videar, meam vicissim tibi hoc ipso probatam volui voluntatem. Rogo igitur te, ut hanc qualemcunque animi grati significationem, hilari vultu excipias, et boni consulas. Vale.

Tiguri calendis Maij, anni

1587.

CONRADVS GESNERVS ME-
dicus Tigurinus Nicolao Speichero
pharmacopolæ Argentinenſi
peritiſſimo S. D. P.

DAuid Kyberus Argentinenſis, feliciſ memorie vir optimus & doctiſſimus, diligentiſſimo ſuo Rei herbarie Lexico Tabulas temporum, quibus ſingule ſtirpes florerent aut fructum ad-
rent, ceu corollarium adiungere ſtatueraſ: id verò eius propoſitum mors immatura interceptit. Huic igitur ego ſuauiſſimi amici memoria inuitatus, vt aliquo modo ſatiſfacerem, quantum per occupa-
tiones meas licebat, eiufdem argumenti Tabulas conſcripſi. Tibi verò in primis, optimè Nicolae, nuncupare eas volui, non tantum quod profeſſioni tuæ, in qua excellis, conueniant, tuq; eaſdem ali-
quando augere ac perficere poſſis: ſed magis quia Kyberus utriq; noſtrum amiciſſimus fuit, vt eius amiſſi hoc veluti ſolacium quoddam haberes, & me quoq; propter communis amici memo-
riam amares. Vale Tiguri anno Salu-
tis 1553. pridie Nonas Aprilis.

DE VSV HARVM TA-
bularum.

TABVLAE istæ non pharmacopo-
lis tantum, tyronibus præsertim &
minus exercitatis, viles sunt futu-
ræ, sed omnibus stirpium notitiæ
studiosis. Qui cum singulis ferè mensibus ver-
nis, æstiuis & autumnalibus, partim cognitio-
nis, partim animum remittendi & corpus ex-
ercendi gratia, rusticatum exire soleant, occa-
sionem ex hisce tabulis capient, quænam eis
plantæ potissimum quærendæ aut sperandæ
sint. Libuit autem non medicis tantum vñtatas
stirpes, & quarum necessaria pharmacopolis
est cognitio, hic enumerare, sed quasuis simpli-
citer quæ nunc in mentem mihi venire porue-
runt: & de quibus mihi quò tempore florent
aut fructificarent cõitabar, reliquas sibi quis-
que suo loco addet, vel nos aliquando si vita
diuinitus prorogetur: neque enim vnus aut
alterius anni hoc opus est. Atque ita non me-
dicinalis tantum hæc per anni tempora dige-
stio stirpium fuerit, sed etiam physica & philo-
sophica. Sic Theophrastus & Plinius non re-
medijs modo quæstas, sed omne genus stir-
pium, cum aliter tum secundum tempora qui-
bus quæque florem & fructum ædunt dis-
ferentijs, descripserunt. Sed quoniam cœli &
regionum discrimen facit, vt plurimæ descri-

ptæ à veteribus stirpes apud nos non proue-
niant, & illarum quæ proueniunt tempora nõ
respondeant, operæpretium visum est vt nas-
centium apud nos siue sponte, siue satione tem-
pora distincta notarentur. Scio etiam in vna
eademq; regione diuersitatem reperiri. Diffe-
runt enim in singulis loci, humiles, æditi, aquil-
lonares, austrini, opaci, aperti, vmbrosi, apri-
ci, vento expositi, tecti vel non expositi, aquo-
si, aridi. Memini ego me in altissimis monti-
bus Augusto mense & autumnii initio, eadem
ferè omnia quæ in planis Aprili & Maio nas-
cuntur, reperisse, violas florentes & varios
flores vernos, fraga maturescencia & matura,
&c. Quin & pro annorum diuersitate hyems
aliàs magis, aliàs minus extenditur, & annus
alter altero magis minúsue pluuius est. Itaq;
fit vt nihil his de rebus omnino constans &
perpetuum tradi possit. Rursus verò non adeò
incerta hæc ratio est, vt nullum in ea descri-
benda operæpretium habeatur. Quamobrem
volui pro vnius regionis, hoc est Germaniæ
nostræ, vsu, has tabulas conscribere, partim ex
observationibus meis cum alijs tum ambula-
tionum & rusticationum mearum, partim ex
Collectaneis amici cuiusdam philiatræ, qui
quo stirpès quæque florem fructumq; æde-
rent tempore ex Hier. Tragi & Leon. Fuchsij
illustribus per Germaniam nostram scriptori-
bus, per singulos menses annotarat. Quod si
non

non per omnia satisfecerit hæc diligentia no-
stra pharmacopolis cæterisq; rei medicæ stu-
diosis, cogitent hanc lucubrationem hac de re
& primam & extemporaneam esse, & sibi
quisque ubi voluerit vel emendet vel augeat.
Nullo enim periculo tum omittere multa, tum
labi in quibusdam, hisce tradendis potuimus,
vt facilius nobis non dico venia danda (neque
enim grauib; istis & vt sibi videntur doctis-
simis scribimus, à quibus exoranda sit venia,)
sed potius gratiæ agendæ sint à candidatis me-
dicinæ & benignis ac æquis lectoribus. Cæte-
rum vt pluribus prodessem, non singularum
duntaxat stirpium tempora, sed insuper com-
munes quasdam obseruationes statim ab initio
proponere visum est, vt appareat minimè no-
bis placere pharmacopolas collecturos certis
anni temporibus astrictos esse. Et quanquam
illi quibus generalis hæc colligendi doctrina
intellecta fuerit, singularium enumeratione
non admodum indigeant, arbitratus sum
tamen eam quoque nec iniucundam
nec prorsus inutilem futuram.

ACHILLES P. GASSARVS L.
medicus, Conrado Gesnero medico.

CVM aliud nunc opere precij ad te
scribendi non habeam, Conrade do-
ctissime idemq; amicissime, volui saltem
veteris nostri amiculi carmina ista ad te
mittere, vt simplicibus tuis vel extremo fo-
lio adderes. Bene vale cum tuis omnibus.

CARMEN IO. MOIBANI MEDI-
ci doctoris Augsburgensis, continens ca-
talogum medicamentorum purgan-
tium simplicium, quorum nunc
vsus in Myropolijs est.


SVnt suspecta satis Tithymallus & Esula quænis
Et quod habet nomen flebile Dacridij,
Est Turbuh turbans. sic Hermodactylus is qui
Colchicon est, seruis perniciosa salus,
Euphorbiq; liquor, sed & Anticyræ medicamen,
Quodq; solet viduas reddere Mezereon,
Sic nec amara placet Colocynthis, & ipse lapillus
Pulchro stellarum cœrulus igne micans,
Namq; hæc callo us vel carice textus acuta
Venter, quo ferrum rustica turba coquit.
Aut stomachus similis rugosis arte cothurnis
Militis indomiti dira Aconita coquens,

Vix

Vix impune feret, vel si feret, ardua res sit,
 His quæ tormentis subdere colla iubet.
 ¶ Contra civili qui gaudent lege medendi,
 Et quibus haud vlla est pœna luenda graui.
 His plenis baccis frondescat Frunus in horto,
 Et placeat quiuis Irida murus habens,
 Et suaves spirent Violas in cespite prata,
 Ornent & pulchras pulchra Roseta domos,
 Nec desint Manna Calabrorum roscida mella,
 Et fuluum quod dat Barbara terra Raued,
 Indorumq; Thamar, Balanusq; Aloëq; Cetrachq;
 Lymphata vndas & Galathea ferens,
 Soldanella, Filix, Ebulus, Sena, Cassia, Nitrum,
 Et veteris Galli mollia iura placent,
 Absinthi, Capniq; liquor, vel Agaricus illis
 Sit cura, tuto quis redimenda salus.

ERRATA CORRIGENDA.

ἀγαλάλασα, pag. 24. b. Differentiæ sunt, p. 22. a.
 in præfationem, p. 42. b. in pratis, p. 71. b
 Eaurie/ pag. 123. b.



CONRADI GESNERI DE PAR-

TIBVS ET DIFFERENTIIS

PLANTARVM PHYSICA SY-

nopsis, secundum Theophrastum, Plinium &

Dioscoridem: in tabulas methodicè dige-

sta, introductionis vice ad quas-

vis stirpium historias

legendas.

PHILOSOPHI nostri omnē
ferè de plantis consideratio-
nem nō solū quæ historiam,
sed etiam quæ causas attinet,
partim ad rem medicam, par-
tim rusticam reiecisse videntur, vt in pleris-
que etiam alijs Philosophiæ amplissimam
professionem circumciderūt, vt ipsis, quan-
tumuis in paucis vtcunq; eruditi, philoso-
phos se profiteri minori negotio possent,
hoc est videri magis quàm esse,

PLANTA, stirps, *φυτόν*, corpus est na-
turale compositum, animatum, telluri ceu
parenti, vt alimentum continuè attrahat, af-
fixum, speciem suam de se propagans, loco
immobile, insensibile.

TABVLAE STIRPIVM

Stirpium aliæ sunt

Herbæ,

Frutices,

Minores,

Arborescentes.

Suffrutices, herbæ lignosæ, quarum caules non percunt quotannis.

Arbores

Iustæ

Fruticosæ.

Quædam fortè ad certum genus vix referas, vt sunt Viscum, Fungi, Corallium, Lens palustris.

DIFFERENTIAE STIRPIVM

vnde sumantur.

Loci, à quibus stirpium & partium singulorum differentia sumuntur, in historijs Dioscorid. Plinij, Theophra. &c. sunt vel
1 Substantia,

Secundum genera & species plantarum, vt

Arbor.

Herba.

Frutex.

Olus.

Legumen, &c.

Secundum

IN GENERE.

2

Secundum corporis cōstitutionem
& partium cōcrementum, *τύσσειν*,
compactionem,

Durum.

Molle.

Densum.

Rarum, vel partium

Tenuium

Crassarum.

Alias tactiles qualitates secundas.

Quod singulæ vel habent vel non ha-
bent partes aliquas.

2 Quantitas.

Numerus.

Magnitudo.

3 Qualitas.

Actu & sensibilis

Communis,

Figura

Similitudo

Vnius,

Duorum aut plurium.

Propria

Tactui

Graue, leue, Asperum, lene,

Durū, molle. Lubricū, aridū,

Crassum, tenue. Rarū, densū.

A 2

TABVLAE STIRPIVM

Visui

Fulgor.

Color.

Odori

Graueolés, virosum, foetidú.

Inodorum,

Acre, acutum.

Odoratum,

Suauiter, fragrans.

Caput tentans, grauans.

Gustui

Inspidus, ἀπρόσιτος.

Dulcis.

Amarus.

Acris, acidus, &c.

Potentia & occulta qualitas. Ab in-
sito autem calore nostro ex potentia
in actum producitur.

Prima,

Calidum 1. Obscurè.

Frigidú 2. Sensibiliter.

Humidú 3. Vt ledat sensú.

Siccum 4. Vt destruat sè.

In quarto gradu delibutoria.

διληνθήματα, venena sunt.

Secundæ qualitates à medicis di-
ctæ, omnes sensibiles sunt, odorú
præcipuè & saporum differentia.

Tertia,

Tertiz, quæ priuatim ad aliquam corporis partem aut morbum facit, propter qualitates, vel propter totam substantiam, & vim aliquam occultam, vnde dicuntur alia

Cephalica
Ophthalmica
Cathartica
Diuretica, &c.

4 Situs, locus natalis totius plantæ. Et partium situs singularum.

5 Tempus

Ortus
Occasus
Maturitas.

6 Actio, sed hanc inter qualitates retulimus, quæ si per verbum aut verbale actuum efferatur, huc pertinet.

7 Vfus, ad aliquid, vt ad

Medicinam

Cibum

Potum

Condimenta & voluptatem

Alia diuerfa, vt olea, &c.

Hominum

Brutorum.

TABVLAE STIRPIVM
DE STIRPIVM DIFFERENTIA
quatenus vel hyemis ferunt inclemen-
tiam, vel non ferunt.

Ex stirpibus sunt quædam, quæ hieme aut
Pereunt, idq; vel

Penitus & totæ, quarum multæ sunt.

Ex parte, idq; aut

Caule tantum, seruatis folijs circa ra-
dicem : cuius generis ferulaceæ
pleræq;, puto sunt.

Folijs tantum, seruato caule, vt ple-
ræq; arborum, fruticum, & suffru-
ticum: Solanum perpetuum.

Floribus tantum: vt Leucoia.

Superficie tota, vt Inula.

Manent, idq; secundum

Totum, præterquam flore: sed consili-
go, elleborus, & pauca aliæ etiam flo-
rent hyeme.

Partibus, vt supra dictum est.

PARTES STIRPIVM AN-
nua & caduca.

Præcipua, & propter quam cæteræ sunt, Se-
men seu fructus, σπέρμα, καρπός. Licet
fructus nomine ferè semen vnà cum am-
biente

biente pericarpio comprehendatur, vt in

Pomis, ὀπώεα

Sine ossibus

Cum ossibus, inter quæ nuclei latent, πυρήνες.

Nucibus, ἀκρόδρυα

Acinis, ῥάξ.

Baccis, Baccæ dispersius rariusq; enascuntur, in hoc ab acinis, qui densius proueniunt differentes. Constant autem acini & baccæ

Carne

Succo

Nucleo.

Vinateis, γίγαρτα, in acinis vitium.

Sanfis, ossiculum oliuæ.

Acinorum congeries in vite vua, in reliquis etiam corymbus vel ræmus, botrys nominatur. Licet ræmus propriè sit, qui & Scapus quod acini fulciuntur.

DE DIFFERENTIA STIR- pium circa semen & fructus.

Semine quædam carent, vt

Adiantum. *

TABVLAE STIRPIVM

* Polypodium

Trithomanes

Asplenon

Phyllites

Filix vtraq;.

Fructum non proferunt arbores infelices,
ob hoc dictæ. Salix Homero ὠλίσιαρ-
πῶ: Similiter tamarix apud nos.

Semina quædam

Præueniunt

Flores

Florum instar paniculæ.

Fouent & tuentur

Folium, φύλλον

Pes

Pericarpia.

Fructus

• Præcoces

• Serotini

Nunquam maturenscentes, vt

Labruscæ, ὄμφακες

Grossi, ἐρεινοί, in caprifico.

DE DIFFERENTIA STIR-
pium circa flores.

Flores, ἄνθη, nam alijs sunt

Duplices, διὰνθη, quod violæ Martiæ tri-
buitur : & floribus illis, qui stamina
quædam

quædam seu crocos, quos & apices vocant, in medio habent, veluti filamenta ab intimo floris sinu: cuiusmodi Plinius in belli flore pætillicantes barbularas dicere videtur.

Multiplici folio, *δασυπρόδα*, gfüllt Blümen: quod arte fit.

Rosæ

Violæ

Caryophylli

Pes corui

Bellis

Malua.

Aquilegia

Bacilli, *Μποσβλῦμεν*.

In pappos (*πάππος*.) id est, lanuginem quandam deciduam abeunt.

Lactariæ multæ, vt Lactucæ

Syluestres

Hieracion vtrumq;

Sonchi

Chondrillæ

Gerontopogon.

Domesticæ.

Cardui omnes, Atractylis, Scolymus,

Chamæleones, &c.

Et aliæ quædam, vt

Senecio *

TABVLÆ STIRPIVM

Gramen quoddam palustre.

Alopecuros quibusdam.

Vnius folij in calathi formam, vt in

Conuoluulo

Maiore : rudimenta naturæ lilia facere condiscantis, Plinius.

Minore , qui Helxine cissampelus videtur.

Iafone.

Solano Romano.

Rapum syluestre. Vuulariæ.

Calathiformes

Plurium foliorum

Diuisorum vndiquaq;, vt lilium.

Continuorū infra, vt rapū syluestre.

Vnius folij, vt conuoluulus.

Quatuor foliorum, violæ matronales.

Pluriū foliorū , vt rosa à quinq; ad centū.

Folij florū crenatis.

Exemptiles,

Borago, Alsine syluatica.

Buglossus,

Cynoglossus

Radiati singuli, per singulos coliculos,

Bellis

Maior,

Minor.

Gerontopogon.

Hieracium.

* Caly-

- Calycibus plurimi includuntur antequā dehiscant, quo tempore in rosis alaba-
stros (à valorum forma) & nymphas,
νεύμφας vocant, quòd recens appare-
re incipiant.

Pendentes à

Siliquis, vt in

Herba S. Antonij,

Maiore,

Minore.

Rhododaphne puto : species filio-
rum ante patrem.

Petiol. s.

Flores, *ἀνθὴν* sunt vel

Florentes

Particulatim

Cū in vna ceu panicula infimi prius
& alij paulatim post florent.

Bellis item particulatim floret.

Vniuersim.

Muscosi, nudi calycibus, multi, parui, con-
fereti, molles. Sunt qui spongiosam
hanc florum congeriem, muscum ap-
pellent: vt Ligustrum, Barba capræ, Ru-
bea, Galion, Cruciata.

Inordinati.

Ordinati & digesti per

Corymbos, vt Androsæmon

TABVLÆ STIRPIVM

- * **Paniculam** (aliqui iubam vel comam vocant.) quæ sublonga vel subrotunda effigie tumet, veluti lanosa coma, in

Milio

Panico

Arundine

Iuncis

Et graminis generibus aliquot.

Muscaria vel **ymbellas** : quæ sunt in orbem radiatæ herbarum comæ: cacuminaque in fascies coacta, à flabii similitudine, cuius ventilatu muscæ à conuiuis abiguntur. Aliàs **Vmbella** floris seminisq; pedamentum est, in plures digestum longiores pediculos, qui simul ex fastigio eodem orti, in lätius continuò radiantur, in orbem circumactum. **Σκιάδιον** ab effigie vmbellæ muliebris, qua faciem à sole & æstu defendunt. Apij genera omnia vmbellas habent, & his ferè longiuscula, simplex & neruosa radix est.

Verticella, **σφονδύλια**, quæ caulium & ramulorum artus ambiunt & coronant, vt in marrubio, clinopodio : ab instrumenti muliebris similitudine,

* quo

* quo fusi vertendi gratia vtuntur.

Spicas, *σπείχες*. Quanquam fortè magis ad semina siue grana hoc ordine digesta quàm flores hoc nomé accomodetur.

¶ In spica, quæ olim specæ, à spe, continentur

Grana.

Grano minus

Summum

Frit.

Vruncum.

Infimum,

Gluma, grani inuolucrum.

Solisequi

Heliotropium, per excellentiam maius & minus.

Seris, cichorium.

Lutei ferè omnes, & aureo colore splendidi, vt calendula, pes corui.

Bellis & radiati pleriq.

Colocassia.

Pilei acuti specie seu cucullati.

Aquilegia, seu Angelica.

Aconitum

Cæruleum

Flauum.

Staphis agria.

TABVLAE STIRPIVM

Flores, *ἄνθη*, sunt vel

Foliati, in quibus lata & distincta folia sunt. Muscoli enim pilei formes, nō propriè foliati dicuntur.

Vngues in rosis & foliatis floribus. Sunt imæ foliorum partes quibus in capite suo cohærent.

¶ Florum colores sigillatim persequi infinitum foret.

¶ Quæ in floribus à figuris dicta nomina vsurpâtur, eadē in seminibus similiter.

Florum instar est panicula, quæ dicitur

Cachrys, *κάρυς*, pilula Plinio, in

Larice

Picea

Platano

Iuglande

Tilia

Abiete.

Iulus, *Ἰούλος*, in auellana, sic fâctile.

Nucamentū, *κύνταρος*, præcipuè in nucibus, deinde in illis etiā, quæ (Græcè)

Canchryn ferre dicuntur.

STIRPIVM PARTES QVAB

semen fouent ac tuentur.

Folium de quo supra.

Pes, petiolus.

* Peria-

* Pericarpium,

Vas, vasculum, theca, loculi, inuolucrum, conceptaculum feminis.

Folliculus, de diuersis pericarpijs dicitur, de calyce, gluma in spica & membranosa cute acini.

Calyx, ἀπὸ τῆ καλῦπτειν, folliculus quo flos primū, mox feminis fœtus clauditur. Sic etiam in glandibus vocatur, vulgò cupula.

Gluma, tenuis grani tunica. Acus purgamentum frumenti leuissimū, pars glumæ inde acerosum.

Siliqua, λοβός, valvulus peculiariter in leguminibus. Aliæ

Obliquæ vel dependentes, vt leguminum, quæ singulæ & longiores visuntur.

Erectæ, breuiores, quinæ ferè, vt Aconiti cœrulei & flauī, & staphis agricæ puto, & Aquilegiæ.

Corniculatæ vt in Cardamomo.

Scutulatæ figuræ.

Lenticularis figuræ.

Folliculus vt in ormino, nomen quod sciam non habet.

Vulga, instar sacculi pecuniarij:

Caput, (vt in papauere, κώστος, fortè

TABVLAE STIRPIVM

- * in carduis etiam, vt cinara, caput dici potest) loculamentis, id est, paruis capsulis distinctum, in quibus absoluta semina sunt. Quædam sine capsulis sunt, vt polemonion, flos lo-uis.

Folliculo

Vndiq; adhærente

Inani, vt

Halicacabus,

Verbitæ fūchle / frutex arbore-
scens.

Echinus, pluribus, vt in castanea.

Murex (in tribulo) paucioribus.

FOLIORVM DIFFERENTIA.

Plantæ aliæ aut

Sine folijs sunt, vt

Spartos

Cuscuta

Adiantum Apuleij.

Habent folia.

Crenata, id est, serrata, per ambitumq;
secta.

Fimbriata, quæ in ambitu in quasdam
fimbrias exeunt.

Laciniata, membratim per flexuras di-
gesta,

- * gesta, vel natiuis segminibus dissecta. Lacinię enim partes sunt extremę de coris causa concisę, orarumque summarum cęsurę. Sic Vetonici sylvestris genus quoddam floribus est laciniatis. Sunt tamen qui laciniolum pro sinuoso vsurpent.

Stellata, quę etiam radiata dici possunt, vt

Rubię

Cruciataę

Aparines

Horum omniũ geniculati sunt caules, folijs genicula ambientibus.

Bina, terna, quaterna, &c.

In vaginis condita, vt graminis, canarię, tritici, iridis, & similia.

Striata seu canaliculata, singulis, vel pluribus canaliculis, vt cyperi, pseudocyperi.

Annua & caduca, vel decidua: non decidua

* Lanuginosa, γναφαλοειδής, vt gnaphalij, dictamni.

Aculeata, vt chamæleontis vtriusque; cinarę,

Hirsuta, vel mollioribus aculeis præ-

TABVLAE STIRPIVM

ditæ, vt auriculæ muris vulgò.

Leuia.

Splendentia, vt aconiti.

Non splendentia.

Aspera.

Pinguia, vt lilij & testiculorum genera varia.

Stipulæ, folia sunt culmum ambi-
entia.

STIRPES ALIIS QVIBVSDAM,
rarioribus partibus differ-
runt, nempe,

Lanugine quarundam folia coliculiq; canes-
cunt.

Mucro est acumen, in quod partes quæcun-
que definit, vt spinæ omnes, folia multa &
quædam siliquæ.

Vmbilicus id in pomis est, quod in eis me-
dium vel prominet vel conditur.

Spinosa.

Semine, vt spanacia, tribulus.

Seminis conceptaculo, vt quæ echinæ
proferunt.

Folijs tantum, spina

Molliore, & figura magis quàm reipsa,
vt asparagus, corruda.

†

Durior.

* Duriore, vt Iuniperus.

Caule tantum, vt geinstella suffrutex.

Caule & folijs.

His omnibus, quæ acanacea dicuntur,

vt cardui, caule, folijs, & pericarpjijs,

(non ipsis feminibus) spinosi.

TABVLA STIRPIVM SEM-
per virentium.

Ex stirpibus semper virentibus, aliæ

Tota superficie semper virent, vt in

Arborum genere

Citrus & cognatæ, Laurus.

Buxus, Hedera.

Coniferæ omnes excepta larice

Glandiferæ pleræque: nam ne nostra

quidem quercus omnino nudatur

folijs. Illicum genera, Coccus, Aquifolia.

Sabina vtraque.

Fruticum genere, pauci puto: an philyca, Iasminus.

Suffruticum genere

Odorati,

Samsucum, Thymus, Rosmarinus.

Chamæcyparissus. Salvia

Lauendula, Spica, Hyssopus

Clematis prima. Veronica altalis & similia.

TABVLAE STIRPIVM

Coronarij plerique omnes, vtpote lignosi.

Herbarum genere.

Αἰάταιθεϊς, vt adiantum, trichomanes, filices vel omnes vel mihi notæ saltem.

Quæ liquorem habent,

Acrem duntaxat, vt tithymalli: qui & florent in exitu hyemis aut prius.

Quibus folia & superficies tota densior solidiorq; est, vt

Chamæpyxus.

Elleborus niger.

¶ Item quæ nullo certo genere continentur.

Coliculis summis.

In fruticibus,

Periclymenum

Cytisus, non tota, sed magna hyemis parte apud me in horto: ruri nondum obseruare potui.

In suffruticibus, Chamædaphne horti mei.

Circa radicem tantum. Herbæ

Quæ liquorem habent

Copiosum, dulcem aut subamarum, Tragopogon, Cichoracea omnia, an sic & Lactucæ.

*

Paucum

* Paucum in ferulaceo genere, & si
quæ alia fortè ἐνοπα sunt,

Olera

Satiua, apium.

Syluestria

Annua ferè ab autumno ad sequen-
tem æstatem durantia.

Bellis, pastinaca sylvestris, arthritice

Bulbi pleriq;, hyeme amittunt superfi-
ciem totam: pauci seruant circa radi-
cem folia,

Lilium album

Crocus, hyeme præsertim viret: æ-
state se oculit, vt & cylvaminus, a-
risara, &c.

Bulbine maior.

Stirpium aliæ

Semestres, à vere ad autumnum.

Annua, & totæ pereunt hyeme: nisi
fortè autumno serantur.

Bimæ, aut longioris vitæ: & harum
aliæ hyeme

Virent

Totæ

Radicibus.

Non virent, sed radicibus integris
superficiem amittunt.

Τριετής, πολυετής.

* immaturus.

Pauciorum æstate, (ὑπὸ πυρονομίαν,
καὶ μικρῶ πρότερον) per messem tri-
tici (vt bryonia puto) panaces in
Syria.

Radices colliguntur

Totæ

Minores tantum, vt in elleboro.

Liquor, ὁπός. Et hic aut fluit

Sponte, vt tragacanthæ.

Sectione (ὀπισμόν vocant.)

Caulium in plerisq; vt tithymalli.
lactucæ.

Radicum, in paucis.

Capitum, vt in solo papauere.

Et horum si succus

Abundet, πολύοπα, vase excipiunt,
vt tithymalli siue meconij.

Paucus sit, lana, vt lactuca.

Succus, χύλισμα, in ijs qui paucum & a-
ridum succum habent. Fit autem suc-
catio, (χυλισμός) vt quæ vrentes, aut
torrentes aquamque infundentes ex-
primunt.

¶ Succus radicum aut est fructu

Infirmior, vt cæteris omnibus.

Vehementior, vt cicutæ & thapsiæ.

TABVLÆ STIRPIVM

DE STIRPIVM PARTIBVS, EA-
rumq̃ differentijs, tabulæ duæ Theophrasti de
historia plantarum libri primi, capi-
tibus quatuor prioribus, adie-
ctis quibusdam ex cap.

17. 19. & 20.

Omnes plantæ humorem caloremque si-
bi insitum quendam possident. Humor
autem vel

Dicitur humor, vel liquor (succus,
ὕψον, ὀπός) & si quidam distinguunt,
vt & lachrymam, δάκρυον. Hic parti-
bus omnibus cōmunis est, nihil enim
est quod careat humore.

Differunt humores vel ratione. Vide
Plin. lib. 13. 28.

Coloris, est enim quidam lacteo simi-
lis, vt fici, papaueris.

Odoris, est enim odoratus, aneso, ce-
drulæ, apio, fœniculo, & similibus.

Saporis, est enim alijs

Vinosus, vt viti, moro, myrto.

Acidus, vt punico & quibusdam malis.

Sed omnes qui huic generi contribu-
antur vinosos putandum

Dulcis, vt fico, palmæ, castanæ.

Acris,

Acris, vt origano, satireiæ, nasturtio,
synapi, thymo.

Amarus, vt absinthij, centaurij.

Pinguis, vt oleæ, lauro, nuci, amygdalæ, pino, larici, abieti.

Aquosus siue dilutus (*ὕδαρής*,) vt pruno, viti, piro, malo, cucumeri, cucurbitæ, lactucæ.

Consistentiæ, (sic nobis diuidere & nominare libet:) vt in abiete, pino, omnibusq; coniferis resinaceus. Huc fortè referri potest etiam lacti similis liquor supra nominatus.

¶ Vnaquæq; planta vt temperamentum proprium, ita succum quoq; peculiarem habet, quo à cæteris omnibus differat. Licet enim pericarpia quarundam stirpium sapore similia videantur, in ipsis tamen seminibus eorumq; tunicis differentia percipitur.

¶ Vniuersæ arborum plantarumq; partes cognationem quandam habent tota cum natura, quanquam odore saporeq; differant, sic vt aliæ odoratæ & benè sapidæ sint, aliæ inodoratæ insipidæq; omninò.

Sunt enim alijs, (ab odore differentia sumpta.)

*

TABVLÆ STIRPIVM

* Flores odorati, folia inodorata.
Contrà, vt coronarijs, quorum folia &
rami magis olent quàm flores.

Neutrum.

Radix, aut alia pars.

¶ Sapor, succúsue ad cibum aptus in
vna parte, in altera ineptus: vt arbo-
rum aliquot fructus hominibus e-
duntur, folia non item. Tiliæ contrà
fructus pecora non attingunt, folia
edunt pleraq;.

TABVLA DE STIRPIVM

partibus secunda.

In stirpibus considerantur

Partes, *μέρη*

Essentiales

Similares, *ὁμοιομεπεῖς*, vbi pars quæ
libet idem nomen cum toto ha-
bet. Harum aliæ

Priores

Nervus, *ἵς*, hic simplex est,
nec diuiditur in ramulos.

Vena, *φλέψ*: hæc crassior est
neruo, humoré continet,
& in ramulos finditur.

Caro, *σὰρξ*, quæ quoquo
versus diuiditur, inter ner-
uos aut venas sita.

*

¶ Hæ

* ¶ Hæ partes sic nūcupantur per analogiam ab animalib. petitam.

Posteriores, quæ ex priorib. constant.

Cortex, *φλοιός*, qui flores ambit & separari potest. Constat aut ex prioribus, vel

Tribus, neruo, humore & carne, ut roboris, piri, populi nigræ.

Duobus,

Humore & neruo, ut vitis,

Carne & humore, ut suberis.

Lignū, *ξύλον*, hoc fissile est, id est, in longū diuiditur. Cōstat è neruo & humore: quædā etiā è carne, ut quæcunq; per etatē durescunt & lignescunt, ut raphani radix.

Matrix, *μήτρα*, ligno ambitur: aliqui cor, alij medullā vocāt. *(καρδία, μυελόν)*.

Sed *καρδία* ppriè est durior matrix, ut *ιγερμάδην* laxior.) Constat ex humore & carne.

Dissimilares, *ἡτοιμομερῆς*, & maiores, ut porcē ex similaribus compositæ, & primæ quod ad sensum: quæ & organicæ dicuntur. Et harū quædā *μορκεδῆς* sunt, ut tibia, cubitus: quarū particulæ nominibus carent. Aliæ *πολυκεδῆς*, ut caput, cuius partes nūcupantur oculus, nasus, &c. Sūt aut.

TABVLÆ STIRPIVM

* Radix, *ρίζα*, quæ alimentum attrahit.

Caulis, *καυλός*, qui in herbis tum promitur (est enim seminis causa.) cum parturiunt, siue eodem anno, siue secundo, siue serius. Hinc in arboribus caudex seu truncus vocatur *σέλεχ* Θ. Caulem alia

Habent, non tamen perpetuò, sed annuum, vt quæ diuturnis radicibus viuunt.

Non habent.

Ramus, *ἀκρέμων*, ὅς Θ, qui è caudice proximo oritur.

Surculus, *κλάδος*, *κλών*, *βλάστημα*: qui è ramis nascitur, vt germina annua maximè.

In stirpibus considerantur

Partes essentielles.

Annua, *ἐπέτειοι*, quæ non propriè partes dicuntur, vt neq; embryon fœtus.

Harum aliæ

Generationi inserviunt, (quæ ferè omnia propter semen sunt.)

Folium, *φύλλον*. Horum aliæ constant ex

Neruo, cortice & carne, vt fici & vitis.

*

Neruo

* Neruo tantum, vt harundinis, frumenti.

Flos, *ἀνθος*. Forum, alij constant ex

Cortice, vena & carne.

Carne tantum, vt qui inter lolia nascuntur.

Pediculus, *μύχρος*: à quo folium vel fructus hæret. Pediculorum autem alij constare videntur

Ex neruo tantum, vt harundinis, frumenti.

Ex eisdem quibus caules.

Plura de pediculis leges infra in differentiis foliorum.

Fructus, *καρπός*: hoc est pericarpium cum semine incluso,

Fructuum alij constant ex

Carne & neruo.

Carne tantum. Nonnulli etiam cute constant.

Carne & neruo, vt pruna, cucumeres.

Humore & cute, vt morum, punicum.

TABVLÆ STIRPIVM

Alij secus distinguuntur.

¶ Omnium (vt sic dixerim)
pars exterior, cortex: inte-
rior, caro: quorundā etiam
nucleus.

Semen, *σπέρμα.*

Aliam ob causam accedunt in qui-
busdam, vt

Muscus, *μύσκιον.*

Capreolus, *καπρέον.*

Proprie quibusdam, vt

Robori, galla.

Viti, capreolus.

Partiū differentię: vel in eo quod quædā,
Simpliciter habent, aut non habent, vt
folia, fructum.

Habent, sed

Dissimilia, *ἀντίμοια.*

Figura,

Colore,

Densitate (spissitate) raritate.

Asperitate, leuitate, & alijs huius-
modi.

Sapore.

Disparia, *ἑτεροειδῆ* excessu vel defectu, se-
cundum

Magnitudinem.

Multitudinem.

Dissimi-

* Dissimiliter, *ἀνομοίως*, id est differente
Situ & loco, vt fructum supra vel
infra folia.

Ordine, vt rami

Inconditi, robori.

Ordinati, abieti.

STIRPIVM ALIA DIVISIO GE-
neralis, secundum differentias suas.

Plantæ differunt

Natalibus seu loco. Sunt enim alia

Terrestres.

Montanæ

In Iugis montium, *Bitterwurcz.*

Ad latera. Estreatium in saxis &
præcipitijs montium. *Flüblumen.*

Et *Flüblumen.*

In planicie.

In vallibus.

In pratis.

Circa oppida.

Circa muros & sæpes.

In ipsis sæpibus.

Circa areas domorum.

In ruderibus.

Locis saxosis.

In muris vel saxis

Naturalibus,

Constructis.

In syluis.

TABVLÆ STIRPIVM

- * In arboribus vel truncis arborum
 - Viscum
 - Polypodium.
- In hortis
- In aruis, vt zizania
- Quiescentibus
- Non quiescentibus.
- Syluestres.
- Cultæ, vrbanae, vel propter
 - Fructum in cibo.
 - Voluptatem in
 - Colore, vt horti penfiles,
 - Odore.
 - Figura.
 - Vmbra, &c.
- Ambiguae vel in vtroq; genere, vt cerasi. Vrbanae verò tantum nulla, aut paucissima, vt etiam inter animalia.
- Peregrinae, vt & aliae quaedam, & omnes nobis Aromaticae,
 - Radice, vt zinziber, zedoaria, cyperus.
 - Semine, cardamomum
 - Cortice, cinnamomum
 - Folijs, vt malabathrum.
 - Liquore, vt balsamum.
 - Duobus vel pluribus istorum.

* Suæ cuiq; regioni.

Aquaticæ: proueniunt enim aliquæ in
Paludibus

Plenis aqua, vt nymphaea, lens palustris.

Resiccatis, adiantum Apuleij.

Fluuijs, potamogeton.

Mari

Corallium,

Fucus,

Alga,

Bostryches,

Ampelides,

Otacides.

Ripis & littoribus, vt sium, mentastrum, sisymbrium, Marinas dixeris, in mari nascentes: Maritimas, iuxta mare.

Tempore differunt plantæ,

Partium anni quibus crescunt, aut vigent, aut fructum ferunt, &c. Sic aliz sunt

Per totum annum.

Vernæ.

Æstiuæ vel alsiôsæ, vt ocymum,

Autumnales, vt caltha.

Hybernæ, vt elleborus niger.

Durationis, vt aliz sunt annuæ, aliz

*

C

TABVLAE STIRPIVM

duobus vel tribus, vt angelica, laſer. Vel pluribus annis durant.

Sexu, ſic aliæ dicuntur

Mares, nigriores, duriores.

Fœminæ, albioreſ, fruticoſioreſ, fœcundiores.

DIFFERENTIAE STIRPIVM

ſecundum partes, (quarum plurimæ ab animalibus mutuuntur nomina.)

Stirpium partes aliæ

Simplices,

Compoſitæ,

Communes

Omnibus.

Plurimis.

Paucis.

COMMVNES OMNIBVS ET

ſimplices partes.

1. Humor natiuus

Expreſſus, ſuccus, χυμὸς.

E vulnere profluens, liquor, ὀπὺς.

Lachryma, δακρύδιον. Eſt autem lachryma humor, qui ſtatim deſectō
↑ caudice

* caudice vel ramo, aut ipso ligno, profilit & apparet.

Lacteus,

Croceus, &c.

Gummi,

Resina.

3. Nervus fissilis est, per carnē & aliam substantiam meat. Fibræ verò seorsim etiam in radicibus procedunt foras, licet pro nervis aliquando accipiantur. Pectines, ut vocant in ligno, nervi esse videntur.

3. Vena maior & crassior nervo, humorem habens & ramulos, in folijs apparet.

4. Interuētū, quod inter venas intercipitur.

5. Caro diuidi potest omnia dimensionibus, cortici subest.

Pulpa in arboribus est, quod in animalibus musculus appellamus.

Tori, *κόνδυλοι*, prominentes partium tori, & in se pulparum modo collecti, unde torosum aliquid dicitur.

6. Tunica est tenuis cortex veluti membranaceus, quo arbor vel radix inuestitur.

Imò pars omnis suam tēu cutim & putamen habet. Cæpe folliculis tunicatum est.

In arboribus librum dicimus. Thallia dicitur cæpæ folliculus: In malo punico putamen, malicorium.

TABVLAE STIRPIVM

partes aliæ ab animalibus dictæ.

Caput dicitur

Infra, vt in bulbaceis, rotunda radice.

Supra, vt in papauere, vbi & *κασιον*
priuatim.

Caput etiam vocant extremam vitis par-
tem, id est vltimum & productissimum
flagellum.

Vertex,

Cacumen.

Frons, vt paulò post dicetur.

Cerebrum in palma.

Medulla pars similis, cor, matrix. *Ηζα-
λις* est

Multa

Pauca

Fungosa & laxa

Compacta & solidior

Nulla, vt buxo, ebeno.

Ceruix, pars à capitis radicibus prodiens,
prælonga teresq;.

Capillamenta, fibræ, acetabula : vel cirri, si
crispentur : in floribus quibusdam croci.

Coma, quicquid hilari venustate, crinium
modo, summa ramorum vel coliculorum
exornat.

Iuba, arundinacea coma effusa, qualis in mi-
lio est, à iubis animalium. *Αλα.*

Alæ, Alarum caua, Sinus, *μαχαλάι*, ex quibus noua semper germinatio prodit: cum adnata nullam habeant certam partem vnde emergant.

Adnata, Adnascentia, Appendices, *παράφυαδες*,
Caulium
Radicum.

Brachia, maiores arborum rami.

Latera.

Genicula, vel **Artus**, in geniculatis vel articulatis.

Caulibus, vnde polygonos & polycnemon dictæ.

Radicibus, vt polygonaton, arundo, doronicum vulgò dictum.

Internodium, inter genicula medium.

Pes, pediculus, petiolus, tenax, *μίσθ*, quo folium, fructus, aut flos dependet.

Pars

Prona ad terram.

Supina, remotior à terra.

Partes stirpium compositz, communes plurimorum R A D I X.

Radix, oris instar, ad alimentum attrahendum, vt planta sit tanquam animal inuersum. Sunt autem aliæ

TABVLAE STIRPIVM

♥ **Bulbaceæ**, bulbosæ, capitatæ. Radices l.
psæ bulbi dicuntur :æq; vel sunt

Tunicatæ, vt

Cæpe

Porrum, &c.

Solidæ, vt aliquatenus tamen distin
cta tubera separentur, vt

Crocī

Liliorum.

Narcissi

Scillæ

Arundinum.

Oblongæ, vt in cartilagineis.

Simplices, (quod ad radicem scilicet, quæ
recta in profundum agitur. & veluti
stirps est) vt olerum.

Multiplices, fibratæ (per excellentiam ni
mirum, fibris enim omnino radicē nul
lam carere putarim) multis adnatis.

Rectæ,

Obliquæ,

Spongiosæ, vt asparagorum, quam radi
culas illigatas & connexas, ac multis
irretitas capillamētis, spongiæ & spon
giolas vocant.

¶ De radicū diuisione plura leges apud
Theophrastum hist. lib. 7. cap. 2. & 3. Et
rursus 7. 11. Et lib. 9. cap. 13. Item in Sca
ligero in plantis Aristotelis, fortè & in

Anticardano. Lib. 16. radices vocat fynecdochicè pro plantis, quarum radices in vſu medico ſunt, &c. Herbas verò, quarum folia.

2. Pars à radice ſurgens in
 Arboribus, ſimplex
 Fruticibus, multiplex,
 Vt ſunt codex, caudex, ſtipes, *φίτερος*,
σίλεχος.

Stolones, *μοχεύματα*, inutilis fructificatio è radicibus : utilis tamen plantandis nonnullis, vt

Corylo
 Meſpilo
 Fico
 Viti.

Herbis,

Caulis, *καυλός*

Scap⁹, in ſtyli modū ſuſſum præreptās,
 à columnaribus ſcapis.

Thyrſus, rect⁹ in virgulæ vel teli modū.

Culmus, *κάλχυς*, in frumento.

E frugibus ſectos, ſtramen, ſtramentum
 vel paleam vocant.

Virgultum ſurculus eſt, qui terræ committitur, vt in arborem inſurgat.

3. Caulis

Mollis, vt amplexi caulium.

TABVLÆ STIRPIVM

Lignosus.

Leuis.

Striatus. Striz partes sunt, quæ protuberant & eminent in longum.

Cauus.

Solidus.

Rotundus.

Angulosus.

Latus. Vnde lactuca, πλατύκαυλος.

Teres.

4. Amplexi caules,

Cum capreolis à capiendo, quibus adminicula complectitur vitis.

Cucumis.

Pepon.

Cucurbita.

Vitis.

Cultina,

Syluestris,

Labrusca, quæ fert ὄμφακας.

Caustica, aliàs Viburnum.

Alba, aliàs Bryonia.

Nigra.

Sine capreolis, clauiculæ.

Periclimenon

Volubilis,

Maior,

Minor.

*

Cycla-

* Cyclaminum alterum.

Cassythia, vulgo cuscutha.

Lupus salictarius.

5 Cortex, cuius.

Partes

Tunica, extrior.

Liber, interior, in arboribus.

Differentiæ

Planus.

Asper.

Hiulcus, quibusdā vel uti squammatus.

Tenuis.

Densus.

Celore etiam, & alijs medijs differunt.

6 Rami, quibusdam nodi dicti.

Maiores, tabulata. Aliqui brachia scribūt esse ramulos.

Minores, ramuli, qui in furculos, furculi in germina desinunt. Vocantur & Asparagi seu Turiones, recentia germina stirpium, & tenerrima, quæ edendo sunt: vt Cymæ olerum, brassicæ maxime, delictiores coliculi, in quibus florum calyces adhuc includuntur.

7 Termes, ram⁹ cū folijs & fructu. ὀφειώων.

8 Spadix in palma.

9 Crada in fico.

10 Viticulæ, ὀδόντες, id est dentes, & flagella

C 5



TABVLAE STIRPIVM

sunt, vt in vitibus & cucurbitis, oblongiores & productiores ramuli, qui longè vagantur & vicina complectuntur, olim flabella dicta, quòd ventis impetantur. Quidam etiam arborù cymas flagella vocant.

11 Frons, pro ramo capitur, sed proprie est, quod ipse ramus circumquaq; producit, multa interdum folia habens, & nonnihil corticis ac velut cauliculi.

12 Virga ex radicibus, aut caudicis laterib; exit, Soboles quibusdam dicta.

13 In vitè palmites, è stirpibus ac furculis quotannis prodeunt, dictæ quod instar palmarum hominis virgulas quasi digitos ædant.

Pampini, frondentium ramusculorum comæ, coliculiq; fructum fouentes, & ab impendente vindicantes iniuria : hinc pampinare.

Sarmenta, prælongæ virgulæ, in quas vitis luxurians spargitur, id est, Vitis ipsius brachiorum & caulium ligna, tam'dù sunt in vite, quam dum execta & exempta sunt.

Malleolus, nouellus est palmes, innatus prioris anni flagello, vbi deciditur ex veteri sarmento, prominens vtrinq;, & malleoli speciem præbens.

Palma,

Palma, maius flagellum, vnde nascuntur
vuz.

Propago grüb:äben/ vitis vetula depres-
sa, atq; in terram per inflexos arcus sub
mersa, vt ex vna plures emergant.

Gemma vel oculus, in vite & alijs etiam,
germinis tuberculum vocatur. Vide Ca-
roli Stephani Vinetum.

ARBORVM DIFFERENTIAE, EX

Theophrasti de hist. plant. lib. I. cap.

5. & deinceps.

*Nota asterisci distincta poterant hic omitti,
(quanquam Theophrastus ponat) quoniã
infra repetuntur. Vt urbana etiam & syl-
uestres in differentijs locorum. Durum, læ-
ue, pulchrum & contraria: corticis ferè
aut ligni vel caudicis differentia sunt. Ad-
ijciuntur autem tanquam obiter, aliarum
quoq; stirpium differentia.*

ARBORVM differentia, quæ cæteris etiã
stirpibus in plurim is accommodari pos-
sunt, sumuntur ex his generalioribus lo-
cis, nempe

- 1 A toto, siue tota substantia
- 2 A locis, in quibus proueniunt.
- 3 A partibus singularibus. Sūt autem
- 4 Caudex.
- 5 Rami.

TABVLAE STIRPIVM

- 6 Cortex.
- 7 Lignum & caulis.
- 8 Medulla.
- 9 Radices.
- 10 Nodi.
- 11 Folia.
- 12 Semina.
- 13 Flores.
- 14 Fructus.

De quibus sigillatim tabulis per numeros distinctis agemus ordine.

ARBORVM DIFFERENTIA I.

*quæ à toto, vel quæ ad substantiam totam refertur, de qua
Theoph. 1. 23.*

Sunt autem arbores aliz

Urbanæ

Syluestres. quædam enim cultu deteriores redduntur, vt abies, pinaſter: & in omni ſtirpium genere, quæ loca frigida niuosaq; adamant.

Fructiferæ, ſteriles.

Germine vel fructu præcoces, *πρωϊ-βλαστῆ, πρωϊκαρπα, ὀψικαρπα.*

Floriferæ, *ἀθνηταί.* Floræ carentes, *ἀνανθη.*

Magna.

Magnæ, parvæ. Itemque alię (quæ huc referri possunt, ex cap. 14.

Excelsæ, vt abies, & quæcunque simpliciore caudice assurgunt, nec radicibus nec ramis multis præditæ.

In profundum descendentes, (suis radicibus.)

✦ In ramos illico sparguntur, vt mālus.

✦ Ramosæ, & molem superiorem grandiore gestantes, vt punica.

¶ Fiunt autem hæc singula vel
Natura

Arte & cultu.

¶ Adhęc plurimum refert alimentum, locus & cultus. Eædem enim si crebræ serantur, excelsæ gracilesq; reducuntur; si raræ contrâ. Et si statim ramos succidas, excelsæ, vt vitis; si relin quas, breues assurgent. Olera etiam nonnulla arboris figuram capessunt. Omnia locis suis melius augescunt. nam & inter congenera, quæ suis in locis manent, enodiora, ampliora, pulchrioraq; extant. Et in totum sylvestris materies pulchrior & commodior & copiosior parte montis aquilonia, quâ meridiana enascitur,

TABVLAE STIRPIVM

Duræ, molles.

Læues, asperæ.

Cortice.

Folijs.

Pulchræ, deformes,

Fructus

Boni

Praui,

Syluestres quidē plura ferunt: sed vrbanæ meliora, suauiora, & in totum temperatiora.

Folia amittentes. Perpetuò virentes.

Plantæ quædam in totum folijs carēt.

A loco, differentia II.

Ex arboribus nascuntur alix in

Aquaticis

Paludibus, τέλμασι. Quædā palustres (ἐλεια) omnino sunt, vt salix, & platanus.

Lacubus, λίμναις.

Fluuijs.

Mari

Minores, in nostro.

Maiores, in rubro.

Plantæ quædam nisi in solo madento nasci non possunt: quædam nascuntur quidem, sed longè deteriores.

Aridis

Aridis

Terrenis.

Littoreis: vt ex minoribus quædam.

Vtrobique, quas amphibias dixeris, vt
myrtum, salicem, alnum.

¶ Addi possunt vrbane, syluestres: & syl-
uestrium aliæ montanis, aliæ planis
gaudent, &c.

A partibus, differentia mul-
tiplex: & primo III.
in genere.

Arbores differunt suis partibus: sunt au-
tem aliæ

Generales: quoniam aliæ aliæ

Habent: sed vel

Plures

Pauciores

Dissimili modo, &c.

Non habent.

Particulares, cuius generis prima dif-
ferentia sumitur, a

A partibus differentia IIII. &c.

4. Caudice: qui est aut

Procerus μακροσελέχη.

Breuis βραχυσελέχη.

Rectus ὀρθοφυή.

Con

TABVLAE STIRPIVM

Contortior, σκολιάτερα.

Simplex, μονοσελέχη.

Multiplex, πολυσελέχη.

Sic in herbis μονέκφυλα, δίφυλα, ἀκφυλα. Cæterum in arboribus μονοσελέχη eadē serē sunt quæ ἀπαλάβλαστο: & πολυσελέχη, quæ παραβλαστη.

Herbis nullus, ἀσελέχη.

Crassus, tenuis.

¶ Olea & oleaster caudicum cauitate, vitio peculiari laborant.
cap. 13.

5 Arbores differunt ramis, κλάδοις, qui vel sunt

Multi, πολύκλαδα.

Pauci, ὀλιγόκλαδα, vt palma.

Crassi, Tenues.

Validi, Infirmi.

¶ Nodorum, qui rami maiores sunt, differentia, inferius habetur.

6 Arbores differunt Cortice

Tenui, Crasso, λεπτόφλοια, παχύφλοια.
Λαυί,

Leui, Aspero. λειόφλοια, Τεαχύφλοια.

¶ Quædam dum adoleſcunt læui
ſunt cortice, cū ſenuerūt, aspero.

Diſſectō, vt vitis, ριζόφλοια, quibus
cortex radicis ſpeciem gerit, Ga-
za. Ego ριζόφλοια legerim.

Deciduo, vt potulaca, arbutus.

Carnoſo, vt ſuber, populus, ſαρκώ-
δει.

Neruoſo & macilente) ἰνώδεις ἢ ἀ-
σάρκων) vt vitis, (arundo, triticum.)

Multipliçi tunicis, πολυλόπων, vt tī-
lia.

Simplici tunicis, μονολόπων, vt fici,
arundinis.

7 Arboreſ differunt ligno et caulibus
idē vel

Partibus. Sunt enim alię vel alia

Carnoſi, vt roboris, fici, ſαρκώδεις.

Macilenti, ἀσάρκοι, vt cedri, cu-
preſſi.

Neruoſi, ἰνώδεις, talia enim ligna
ſunt abietis & palmæ.

Enerues, (In Græco eſt μανὰ.)

Venoſa, φλεβώδη.

TABVLAE STIRPIVM

Venis priuata, ἀολεβα.

Et insuper inter frutices & suffru-
tices caulis quarundam est,

Geniculatus, arundini

Spinofus, rubo.

Inseptus (indistinctus) et equalis,

ἀδιάφρακτος καὶ ὁμαλός, iunco.

Qualitatibus, vt

Duritie, Mollitie.

Lentitia, Fragilitate

Leuitate, Grauitate, &c. Suber

viride statim leue est: salix sicca,

buxus & ebenus ne siccae quidē. Bu-

xus & ebenus graui sunt densi-

tate: robur, quia terrenum.

Item quod alia sunt.

Fissilia, ἑυχίσα, vt abies propter
meatum rectitudinem.

Fragilia, ὑβραυσα, vt olea: pro-
pter obliquitatem & duritiem
materiæ.

Enodia, ἀοζα, vt sambucus.

Nodosa, ὀζάδη, vt abies.

Flexibilia, ἑυκαμπτα, vt rilia pro-
pter humoris lentitiam.

§ Arborcs

3. Arbores differunt Medulla, μήτρα, quoniam alia

Habent, eaque vel

Carnosam, vt vitis, sambucus.

Lignosam, vt abies, pinus : & quidē hęc præcipuē quod tædæ plurimum in se gerat.

Duriorem & spissiore, cornus, ilex, robur, cytisus, morus, celtis. Harum omnium, Medulla nigra est, & durior ligno suo, ideoque flecti non sustinet. In robore priuatim melandryon vocatur à colore nigro.

Solutiorem, μαυοτέραν.

Minus solutam.

Membranis similem, ὑμενώδη, vt

Arundo,

Ferula, & alia inter fruticosa vel suffrutices.

Arbores verò nullæ vel raræ.

Magnam & perspicuam, vt ilex, robur, & aliæ prædictæ.

Incertiorem, (minus conspicuam) vt olea, buxus, haud enim ita in his distincta spectatur. Quamobrem sunt qui eis medullam non in medio, sed per totum lignū dispersam esse affirmant.

TABVLÆ STIRPIVM

8 Nô habât, vt videtur, sambucus & palma.
9 Radicibus differunt arbores. Sunt enim
alijs. Cap. 9.

Multæ longæq̃, vt fico. καὶ μακροῖς.
Paucæ, vt punicæ, malo. πολὺ ῥίζα, ὀλίγη ῥίζα.

Crassiores. Tenuēs omnes, vt viti. Inæ-
quales, vt lauro.

Vna, μονοῖς, vt abieti, pino : ita vt
vna prægrandis in imum descendat,
paruæ aut complures ab ea exeant.
Harum rursus quædam mediā ra-
dicem

Maiorem & profundiorē habēt,
vt amygdala.

Paruam : cæteras verò grandiores
contortioresq̃; ὥσπερ κεκαρκευ-
µέναι, vt olea.

Læues, Asperæ.

Saræ, Spissæ & diuersæ. Omnium qui-
dem radices rariores corpore parti-
bus superioribus sunt.

Nervosæ, ἰνώδεις, vt abietis. Carnosæ,
vt roboris.

Nodosæ villosæq̃; ὀζώδεις καὶ θυσανώ-
δεις, vt oleæ. Tenuiores enim radi-
ces multas & conferetas emittit.

Alte,

Altæ, vt robori, βαθύρριζα. Fico radices profundiores: item omnibus raris & rectâ descendentibus. Stirpes circa vigorem longiores & profundiores radices habent quàm vetustæ. Summæ terræ adhærentes, vt malo, cupressillo, επιπολαίόρριζα. Profundiores quidem & simpliciter longiores fiunt, si solum sit leue, rarum, & facili transmeatu.

Rectæ & æquales. Obliquæ & inæquales, idq; natura, vt lauro, oleæ, non tantum loci obstantis ratione, vt fico & alijs.

Prolem sursum versus procreant, vt vis, ὡς ἀβλαστὶ καὶ εἰς τὸ ἀνω. Non procreant, vt abies, ἀπαράβλαστα.

Radices omnes medullam habent, vt & caudices & rami. Omnes prius crescunt quàm superiora: nec altius descendunt, quàm Sol penetrat.

Suffruticum quoque, herbarum, reliquorumque, eadem ferè differentia sunt: nisi quæ penitus radice carent, vt tuber, fungus, cranium.

In cæteris enim Radices vel sunt Cap. 10. & 11.

TABVLAE STIRPIVM

Numerosæ, vt tritico, ordeo, tiphæ, et huiusmodi. Πολύρριζα.

Paucæ, vt leguminibus.

Singularis, vt maiori parti olerum, sed quædā propagines (ἐπιφύαδες) magnas subgerunt, vt apium, beta: quæ pro corporis sui ratione altius quàm arbores sanè radican-
tuntur.

Carnosæ, vt raphano, aro, betæ, asphodelo, croco, perdicio, vingo in Ægypto: & arachidnæ, &c. silphio, magydari.

Magnæ & carnosæ, vt ferulaceis.

Lignosæ, vt erucz, ocymo: & syluestribus magna ex parte, quibus non protinus plures & fissæ exeant, vt tritico, ordeo, & priuatim dictæ herbæ. (his enim statim finduntur.)

Annua & herbacea omnia radicib, vel Statim fiduntur in partes æquales.

Vnam aut duas magnas emittūt, & quibus prodeunt minores.

Quædam quasi ex carne & cortice constantes, vt raphanorū & raporum (cartilagineæ Plinio.)

Geniculatæ, vt graminum, & omnis generis harundinacci, caulibus seu calamis suis supra terram similes.

Tunicis multiplicibus constantes & corticosæ

ticosæ, λεπυρώδεις ἢ φλοιώδεις
 vt scillæ, bulbi, cepæ. Videntur autem
 hæc omnia, & in vniuersum quæcun-
 que capitata terraque condita sunt,
 (κεφαλοβαρῆ καὶ κατὰ ῥίζα, malim,
 quæcunque capitata sunt, & radículas
 à capite deorsum duntaxat emittunt)
 duplex quodammodo genus radicis
 habere: nempe carnosam illam & cor-
 ticosam: & eas (minores fibras) quæ ab
 illa proueniunt. Videntur enim toto ge-
 nere differre, non crassitie tantum & te-
 nuitate vt in alijs radicibus. Aut fortè
 caput illud quasi cyma seu fructus est:
 non enim omne quod infra terram, ra-
 dix est, vt neque tuber. Fibræ verò tan-
 tum quæ deorsum dependent, propriæ
 radiculæ.

Magnæ, frequentes & validæ, vt capitatis
 iam dictis, item gramine & harundina-
 ceo generi.

Radicibus præterea

Succi omniū insuauiores (λεινότεροι)
 quam in fructu suo habentur, & qua-
 rundam amarè cum fructus dulcis sit.
 Hinc fit vt radices quædam sint.

Medicatæ, φαρμακώδεις.

Odoratæ, θυώδεις, vt iridis.

TABVLAE STIRPIVM

Radices quædam aliquid singulare habent:

Vt quæ prodeunt

Egerminibus, vt in fico Indica (cuius germina ad terram reflectuntur, radicanturnque in toto circuitu, ita vt caudicem non attingant,)

E folijs, vt in herbula quadam circa Opûnta, quæ etiam suavis in cibo est,

Lupinum terram amat, terraque operiri non vult, Plin. 18. 14. Et mox. Tellurem adeò amat, vt quamuis frutectoso solo coniectum inter folia vepresque, ad terram tamen radice perueniat. (Gaza ex Theophrasto, aliter vertit, nec placet.)

Arbores differunt Nodis, ὀζοις.

Sunt enim arbores alie

Nodosæ, ὀζώδες, vt olea, pinaſter, oleaſter, idque vel

Natura. Sic paucos nodos habent sambucus, laurus, ficus, & omnia quibus cortex levis, quæuè concauo & laxo corpore surgunt. Spissæ etiam materiæ arbores, nodosiores, quàm

quàm raræ sunt: item rarius confitæ
nodosiores, breuiiores, contortio-
resq; , quàm densius confitæ.

Loco, nam quæ in vmbrosis & à vento
silentibus & dilutis locis nascuntur,
ferè enodia sunt: contraria verò, no-
dosæ. Montanæ campestribus, & sic-
cæ palustribus nodosiores. Sylue-
stres vrbani; tum simpliciter, tum
congeneres.

Enodes, ἄνοι, id est, paucis nodis præ-
ditæ: nam prorsus enodes stirpes
nullæ sunt in arborum genere: sed
inter palustria, vt iuncus, tipha.

Nodi quibusdam

Inordinati, ἀτακτοι, & vt fortè euenit.

Ordinati, τεταγμενοι, tam interuallo
quàm numero, ob id eas egregias
vocant, δένδρα ἀξιολογώτατα.

Constant enim aliæ nodis

Binis, δίχα.

Ternis, τριόχα.

Pluribus.

Quinis, πεντάχα.

Pares ferè vndiq; magnitudine.

Assiduè grandiores, quo propius cras-

TABVLÆ STIRPIVM.

flori adiacent parte, vt in oleastris apparet, & in arundinibus, quarum geniculus veluti nodus est.

Inuicem respondentes κατ' ἀλλήλους, vt oleastrorum.

Promiscui, ὡς ἔτυχεν.

Recti & quodammodo infixi tum nodi, tum rami, abiecti, ceteris minimè, quam obrem abies validissima est.

Faciebus belluarum similes, malo peculiariter, est enim vnus prægrandis, alij circa eum parui complures.

Cæci, τυφλοί, quibus nullum germen nasci potest, idq; vel

Natura

Læsione.

Fiunt autem cum pars arboris ietu læsa, ad vulnus consolidandum enitens, oris vndique plagis circumactis, callo cicatriceq; tumuerit. Hoc crassioribus ramis potissimū euenit, nonnunquam etiam caudicibus.

Fœcundi, γόνιμοι.

Quibusdam veluti cradæ (nam proprie dicta cradatio, κράδιον, sico euenit, cum rami eius quos cradas peculiariter vocant, arescunt.) gignuntur, ceu vlmo, robori,

bori, & præcipuè platano, quæ si asperis, aridis, ventosisq; locis stent, ita omnino fiat necesse est.

Ramus proximus terræ, & quasi iuxta caudicis caput, senescens crassior redditur.

¶ Nonnullæ gongros à quibusdam vocatos habent, vel simile quid pro arboris natura. Gongrus enim oleæ ferinè peculiaris est morbus, quem alij premnum, alij crotonam, alij aliter nominant. Rectis vni stirpibus minusq; ab imo plantigeris, id aut nullo pacto, aut minus accidere solet.

Ramuli omnium nodosiores semper videntur, quod minimum ijs internodium interiacet: vt ficulnei qui nuper prouenerint, & vitis palmitum sumitates. Est enim gemma in vite, vt geniculum in arundine, nodus in cæteris.

II. Arbores vel plâtes differût folijs, φύλλοις.
Secundum hæc enim Plantæ
Aut semper virent, vt
Arbores

Urbanæ: Olea, palma, laurus, myrtus, pini, (πεύκης,) genus quoddam, cupressus.

Syluestres: abies, pinaster, iuniperus, smilax (taxus Plinio) thuia,

TABVLAE STIRPIVM

phellodrys, tilia, cedrus, picea, myrica, buxus, ilex, aquifolia (ἀγεια) celastrus, phillyra (φιλύκη) acuta spina, apharca (quæ monte Olympo proueniunt.) Item terebinthus, laurus. ¶ Potulaca & arbutus, cacuminibus perpetuò virent, folia inferiora dimittunt.

Frutices, edera, rubus, harundo, rhamnus, cedrula.

Suffrutices herbæq;: ruta, brassica, rosa, abrotonum, samſucum, serpyllus, papauer, & complura syluestrium. ¶ Origanum, apium, equapium, cacuminibus perdurant, amilſis reliquis. Ruta etiam affligitur atq; mutatur.

¶ Omnia quæ perpetuò virent, folijs angustioribus sunt, & pinguedinē quandam suauemq; olentiam reddunt Sed hæc quoq; non semper eadem durant, verum alia proueniunt, alia exarescūt, idq; circa æstiuum solstitium.

¶ Nonnulla quanquam sua natura semper virere nequeūt, tamen ex loci causa folia nunquam dimittunt, vt quæ in Elephantino agro & Memphi proueniunt, &c.

Aut folia abijciunt. Omnes quidem autum. 6

tumno & per autumnum, sed aliæ

Ocyus. ¶ Decidunt sorbo vniuersa,
cæteris paulatim, Plinius.

Tardius, vt quædam etiam ab hyeme
occupentur.

¶ Quædam germinant præmaturius,
& tamen tardius folia dimittunt, vt
amygdala. Quædam ferè germinant,
nec tamen tardius abijciunt, vt
morus.

¶ Regio solumq; madidum ad perdu-
randum conferunt. In siccis & om-
nino tenuibus locis natæ, prius fo-
lia deperdūt, & veteres priusquam
nouæ: quædam & antequam fru-
ctum percoquant, vt piri syluestres.

Folia aut sunt

Sibi dissimilia, vt quæ

Noua orbiculantur, veterata in an-
gulum exeunt (in quod omnium
mutatio desinit) vt populi, cro-
tonis.

Edera contra.

Vertunt partes supinas mox post
solititium æstiuum

Olea

Tilea

Ulmus

Populus,

TABVLAE STIRPIVM

Sibi similia , vt in cæteris arboribus omnibus.

Ampla seu lata: viti, fico, platano.

Angusta, oleæ, punicæ, myrto.

Rara, vt pino, abieti, cedro, *σπανόφυλλα*, Plinius *τριχόφυλλα* legit, vertit enim capillata, pino, cedro. Rara verò inferius, vt sequetur.

Carnosa, quia constant pulpa

In rotunditatem

Cupresso, myricæ, Arboribus,

Cneoro, *στάβε*, Fruticibus,

Sedo, polio, Herbis.

In latitudine, vt betæ, brassicæ, rutæ.

Harundinacea, *καλαμόφυλλα*, vt palmæ, coici, cæterisq; similibus, quæ folijs angularibus constant, vt harundo, gladiolus, butomus, & cætera palustria. Horum folia quasi ex duobus constare videntur, mediumq; veluti carinam habere, vnde & cæteris meatum medius amplius porrigatur.

Omnia folia parte prona supinaq; inter se distant: ac cæterorum pars supina viridior leuiorq; est: neruulos enim & venas in pronis habent, vt manus. Oleaginosaurum verò pars ea ipsa candidior, minusq; leuis. Edera quoq; frondes leues
supernè

supernè habet (Nervos callum & articulos superius habent, incisuras verò subter, vt manus humana, Plin.)

¶ Omnium folia quotidie ad Solem oscitant, interiores (inferiores, pronas) partes tepe fieri valentia, Plin. Theoph. vt sæpè dubium sit vtra pars potius ad rāmulum vergat, &c. Theoph.

Differunt figura

Angularia, γωνιόφυλλα. Vide Harandinaea.

Orbiculata, vt piri.

Oblonga, vt mali.

In acutum producta, & in angulum depressa, vt smilacis, εἰς ὃξὺ προήκοντα, καὶ παραγορεύοντα. Plinius vertit angulosa edera.

Multifida & quasi serrata, εὐχιστα, καὶ οἷον πριονώδη, vt abieti, filici. Insecta pectinum modo, piceæ, abieti, Plin. Vitis quoque aliquatenus fissa, (χιστα) laciniata & (vt ita dixerim) cruciformia σκολον πᾶδ' η.

Insecta, (ἐντομάς ἔχοντα) vt vlmi, roboris, coryli.

Cum extrema, tum lateribus sinuata (πα

TABVLAE STIRPIVM

εγκυρτα, vt ilicis, roboris, smilacis, rubi, paliuri. (Sinuosa toto ambitu robori: spinosa cute, rubo, Plin.)

Extremitate pungentia, pini, laricis, abietis, cedri & cedriæ. (Plinius legit agriæ, id est aquifoliæ.)

Spinas pro folijs arborum nulla habet, sed inter suffrutices *φυλλάκανθα*.

Acorna.

Drypis.

Acanus.

Et omne ferè genus spinosorum. His enim omnibus loco folij spina oritur. Quod si quis hæc folia esse negauerit, carere folijs ea omninò sequetur, vt quædam aculeata quidem sint, folium verò habeant nullum ceu asparagus.

Differunt pediculo, alia enim Habent

Longum, vt vitis, edera.

Breuem,

Tremulum, vt populi folia, quæ & sola inter se crepitant, Plin.

Adnexum, vt platanus, vitis.

Quasi infixum, vt olea.

Carent, vt scillæ, bulbi, *ἀμύχα*.

Prodeun-

Prodeuntia ex

Germine, plerisq;

Ramis

Caudice, vt robori.

(Caule, in suffruticibus quibusdam & herbis.)

Radice illico, oleribus plerisq; vt intybo erratico, cæpe, allio, & bulbofis omnibus, quorum non solum quod primò oritur, verumetiam caulis omnino sine folijs est. Quorundã folijs iam perfectis caulis assurgit, vt lactuce, ocymi, apij & frumentorum. Item nonnulla ex his caulem primò mitem, post horridulum spinis gerūt, vt lactuca & cuncta folia spinosa redduntur. Atq; etiam magis in fruticum genere, vt rubus, paliurus.

Mali quodam in genere parua medijs pomis emicant folia, interim & gemina, Plinius,

Multa, pauca.

Lata, Angusta.

Plinius aliter: Iam densa ac rara, semperq; lata rariora.

Ordinata, Myrto. Inordinata plerisq; alijs, (pomis, Plinius.)

Concaua, in genere olerum, cæpa, gythyū.

E

TABVLAE STIRPIVM

Aspera, Læuia, Aculeata. Sine aculeis.
Fructum interceptum gerentia, vt laurus Alexandrina quæ fructum super folijs gerit.

Ramulosa, vlmo, & cytiso, Plin.

12. Arbores differunt seminibus. Theoph. lib. 1. cap. 18. Plin. 15. 28. ¶ Semen partium omnium postremum est: hoc humorem caloremque insitum in se habet: qui cum desierint, semen infœcundum sicuti vrinum ouum relinquitur.

Quorundam semen protinus post tegmen ambiens subest, vt palmæ, nucis, amygdalæ, quibus ambientia plura utique sunt, ceu palmæ.

Quibusdam caro & nucleus interiacent, vt oleæ, pruni. ¶ Huic distinctioni forte eadē est, * quæ paulò post sequetur: Semina (inquit) quibusdam protinus carnosæ, ceu illa quæ nucum & glandium genere cōprehenduntur. Quibusdam caro in nucleo est, ceu oliuæ, lauro & alijs.

*Hæc sunt
obscura.*

¶ Hæc obscuriora videntur: & nihil tale lego apud Plinium.

Non desunt quibus in nucleo tantum, vel nucleacea & quasi retorrida cōstet, ceu cnico & similibus: nec non & multis oleribus.

oleribus. Palmæ quidem euentissimæ.
Cavitatem enim nullam habent, sed tota
plena atq; persolida sunt: quanquam his
quoq; humor quidam calorq; inest.

Semina quædam

Includuntur

Siliquis *λεβωῖν*, vt

Annua quædam.

Legumina, & syluestriū alia cōplura,

Arbores, vt siliqua, cercis & colætia,
circa Liparam.

Folliculis, *κίβητι*, ex annuis quædam, vt
triticum, milium.

Vasculis, *ἀγγεία, ἰσχυρὰ καὶ λεπτά*, vt papauer
& similia: nam sciamus modus quidam
peculiaris est. ¶ Nullum in vasculo
semen arboris est, nisi conum vascu-
lum dixeris, quod absolui de fructi-
bus potest.

Nuda

Sunt, vt olerum pleraq;, anethum, co-
rianifum, fœniculum, &c. *γυμνοσπέρμα*.
Arborum nulla semine nudo est, sed ob-
ducto aut

Carne

Crusta vel cute pelliculari ceu glâs
& euboicum (id est iuglans.)

Lignosa, ceu amygdala & nux (auel
lana scilicet.

E 2

TABVLAE STIRPIVM

Congesta atq; promiscua, ἀθρόα μετ' ἀλλήλων. Et horum quædam

Putamine aliquo communi aut tunica continentur, vt punicæ, mali, piri, vitis, fici.

Nullò communi (tegmine) includuntur: vt ex annuis spicata, nisi quis spicam ipsam ambiens quoddam esse putarit. Quod si ita sit, racemus quoq; in se habebit, & reliqua quæ racemata æduntur, quæq; vniuersa ob fertilitatem virtutemq; soli prodeunt: quemadmodum in Syria & alibi oleas fructificare affirmant.

Discreta atq; distantia (διεσῶτα καὶ χεδόν:) vt cucurbitæ, cucumeris: & inter arbores, fici, mali. (Sed ficum & malum inter ea etiam numerat quæ congesta aliquo communi tegmine continentur.) ¶ Plinius videtur pro hac diuisione hæc verba posuisse: Quædam inter se densa, vt vux, sorba: quæ ramos circundata ex omni parte vuarum modo degrauant. Alia rara, vt in persicis. Quædam aluo continentur, vt granata.

Dependent alia congesta

Pediculo vno & singulari, vt de racemis spicisq;

spicisq; diximus (.vuz omnes in scapo vno, &c. grana in vna spica.)

Secus, vt grana punici, vbi vnumquodq; semen seorsim acceptum, principium annexus propriū habere videtur. In ficubus id minus euident est, quod earum grana nimio humore conculeantur: Qui quidem humor in eis vnus granis omnibus communis est: in punicis verò su⁹ cuiq; grano peculiaris humor inhæret.

¶ Plinius hunc locum, ita voluisse reddere (aut saltem imitari) videtur. Dependent alia pediculis, vt pira. Alia racemis, vt vuz, palmæ. Alia & pediculis & racemis, vt edera, sambuci. Alia ramo adhærent, vt in lauro. Quædā vtroq; modo, vt oliuæ: nam & breues pediculi & longi. Hæc ille. Sed præter Theophrasti sententiam: fructuum enim hæc potius quàm seminum distinctio est.

¶ Differentiæ secundum figuras totasque formas omnibus ferè exploratæ habentur, vt explanatione nō egeāt. Vnū hoc dicemus, quod fructus nullus rectilineus, neq; angularis.

13. Arbores differunt floribus. Sunt autem alij. Cap. 21. lib. 1.

E 3

TABVLAE STIRPIVM

Lanuginei, *χρυσώδεις*: vt vitis, mori, ederz.

Foliati, *φυλλώδεις*: vt amygdalz, mali, piri, pruni.

Grandes satis, (vt cucurbitis.)

Pusilli, vt oleaginei, quanquam foliati.

Vnicolores Bicolores.

¶ Arborum quidem flores pleriq; vnico-
lores & candidi sunt, punicæ tantum
phœniceus, & amygdalis quibusdam
rubicundi. Ex vrbaniis alia nulla bico-
lor: & si quæ sit, syluestris fuerit, vt a-
bies, cui flos croceus. ¶ Annorum flo-
res pleriq; bicolores exeunt, & dupli-
ces, (*διπλῆς*.) Duplices dico, quòd in flo-
re alterum florem insidentem mediū
gerunt, vt rosa, viola nigra, lilium.

Nonnulli folio vno emergunt (*μονόφυλλα*),
descriptionem tantum plurium osten-
dentes, vt flos iasionæ, &c. Oleæ quoq;
flos penè talis est.

Copiosus & creber est punicæ, & ampli-
tudinem sui quodammodo poni æ-
mulatur.

Plantarum congenerum aliæ

Florent, vt palma mas.

Non florent, vt palma fœmina, quæ pro-
tinus fructum promit.

Simplices & steriles, ceu

Cucu.

Cucumerum, qui postremis sarmentorū
emergunt.

Mali medicæ, illi qui velut colum quan-
dam in medio non habent.

Genus etiam vitis quoddam & punicæ,
fructum perficere nequit, sed ad florem
vsq; generatio tantum peruenit.

Differentes situ, nam alia, cap. 22.

Florem circa fructum ipsum producant,
vt vitis, olea: cuius postremi flosculi
perforati spectantur.

Complura fructū in medio floris tenent.

Super fructum ipsum florem insidentem
emittunt, vt punica, mālus, amerina,
prunus, myrtus. Et in fruticum genere
rosa, maiorq; pars coronariarum: se-
men enim sub floribus habent, quod
potissimum in rosa conspicitur.

Simili modo & herbaceorum nonnul-
la, vt gith, (anthemion.) Et in olerum
genere pepo, cucurbita, cucumis. Om-
nibus enim flos in postremo fructus, &
crescentibus fructibus flos diu infixus
seruatur.

Cum seminibus ipsis flores ædunt, vt aco-
rus, cnicum. & omnia quæ florem folio
numerofo producant. (περί τὰ ἀνθήματα.)

Singulis enim seminibus singulos flo-
res annexos gerunt.

TABVLAE STIRPIVM

Peculiari quodam modo florem in totis fructibus habent, neq; postremis insidentem, neq; in singulas partes ambientem, sed in medijs inculcatum, nisi fortè concerni nequeat propter lanuginem: ceu edera, morus.

14. Arbores differunt fructibus, quos gignunt, aliæ ex

Surculis

Nouellis, vt ficus & vitis.

Annotinis, vt olea, punica, málus, amygdala, pyrus, myrtus, omnesq; ferè similes.

Vtrisque, vt mali biferæ, & si quæ alia bis fructificat.

Caudice, vt morus Ægyptia: quam tamen alij ex grandibus ramis fructificare aiunt.

Grandibus ramis, vt filiqua arbor, quæ ficus Ægyptias producit.

Cacuminibus, ἀκρόκαρπα: plura ex alijs quàm ex arboribus, vt

Frumentorum quæ spicâ pariunt.

Fruticû, erica, piræa, amerina.

Olerum, quibus radix capitata.

Lateribus, πλαγιόκαρπα.

Parte vtraq; tam arborum quædam, vt
olea

olea aliquando, quod copiz indicium
esse fertur: quàm olerum, blitum, attri-
plex, brassica. Palma etiam fructū quo-
dammodo cacumine gignit, vt & folia
& germina.

¶ Fructuum differentias secundum odo-
res, sapores, & consistentiam: quære su-
pra, vbi inter partes similes primas
de humore diximus.

Finis diuisionum in primum Theo-
phraستي librū, de historia plan-
tarum, anno 1552.

TABVLA DE FRVCTIBVS AR-
borum, ex Plinij lib. 15. cap. 24.
potissimum:

Fructus arborum aut sunt foris

Carnosi, vt

Poma in genere dicta, (ὀπώεα.)

Māla tum reliqua, tum cotonea per
excellētiā μήλα dicta: & in alijs
generibus, persicum, medicum siue
citream & punicum: cuius tamen
non caro sed acini, nec foris, sed in-
tus, edendo, sicut & citrei, nō quod
foris est, sed pars interior succo &

TABVLAE STIRPIVM

carne constans, edi solet, &c. Coton-
neorum alia mālīs, alia pīris propiora
sunt.

Pīra, pruna, ē quorum genere & Arme-
niaca sunt.

Mespila, sorba fructus Perseæ.

Ficus communis, Cypria, Ægyptia (an
ad Mora?) Palmulæ & muza dicta.

Myxa (& Sebesten.)

Aliud corpus est terrestribus fragis, a-
liud congeneri eorum Vnedoni.

Cerasa medio inter baccas acinosque
genere.

Mora

Arborū, cōmunia. (An alia Ægyptia?)

Ruborum, communis, chamæbati, L-
dæi duplicis.

Acini, vt vuarum, edera, sambuci, (Ri-
bes vulgò dicti, &c.) Punici mali aci-
ni soli & interiorius sunt & angulosi: nec
cutis vlla singulis, præter commu-
nem, quæ est candida, totisque suc-
cus & caro est, ijs præcipuè quibus
paululum inest ligni.

Baccæ, vt oliuæ, lauri, corni, myrti, len-
tisci. Aquifolij quidem & spinæ (albæ
nimirum hodie cognominatæ) sine
succo. ¶ Baccæ & acini quid differāt

non

non satis explicauit Plinius: sed videntur acini complures simul iungi, minores plerunq; & succulenti: baccæ pauciores & sicciores ferè, &c. Germanica lingua discrimen non habet. De baccis vide plura apud Plin. lib. 15. cap. 28.

Medio inter baccas acinosq; genere, pomis adnumerauimus. ¶ Taxi fructus sui generis est. ¶ Frutices pleriq; acinos ferunt, pauci fortè baccas.

Duri, & cœu crusta operti, testæue.

Nuces

Iuglandes

Auellanæ (Pistacia.)

(Balanus, Myrepfica.) nux muscata vel myristica, simili iugladiũ, operimẽto.

Amygdalę, tenuiore sed simili iuglandiũ summo operimento secundo putaminis (ligni scilicet.) Nucleus dissimilis latitudine & acriore callo. ¶ Persicum fortè inter poma nucasq; ambigere dixeris.

Nuces pini aliarumq; coniferarum: & oxyę vulgo fagi: Nux cupressi, piccę, pinastri, piccastri, &c. conipotius quàm nucas dici debent.

¶ Hæc verè ostracodermis animalium conferri possunt, ob testam duriorẽ. ¶ Nux Indica, Nux vomica.

TABVLÆ STIRPIVM

Glandes : quarú minus dura est crusta, ceu malacostrácis animalium. Glandi ferarum arborum diuersæ sunt species, vt quercus, robur, esculº, cerrus, suber, ilex, fagus veterum Græcorum.

Nuces vocamus & castaneas, quanquã accommodatiores glandium generi.

Armatum echinato calyce vallú, quod inchoatum in glandibus, Plinius.

Balanus cognomine myrepfica, inter nuces est.

¶ Anucum natura haud procul abesse videtur & prædulces filiquæ, nisi quod in ijs cortex ipse manditur, Plinius. vulgò S. Iohannis panem vocant. Huc & filiqua Ægyptia vel atra quibusdam cognominata cassia hodie medicis, pertinet. Arborea quidem tam paucæ filiquas gerunt, de vna & altera tantùm Theophrastus ac Plinius id prodiderunt, nempe Colutea, ni fallor : sed Anagyris quoque & laburnum filiquas habent: & Acacia. Sicut & in pappos abire fructum, soli arborum coggyriz Theophrastus: quod tamen in vite syluestri & in cotino nos obseruauimus.

TABVLA DE IIS QVAE E RO-
bore enascuntur, ex lib. 9. Theophra-
sti hist. Cap. 8. & 9.

Robur, *ρῦς*, arborum omnium præter fru-
 ctum suum alia plurima gignit, vt

Gallam

Paruulam, (& læuam)

Resinosam aliam & nigram.

¶ Galla deterrima ex robore : signum
 eius quòd cauernæ translucent, Pli-
 nius.

Mori specie quiddam durū & fractu dif-
 ficile, id tamen rarum.

Αιδουῶδες, id est, effigie colis quiddam,
 quod cū perficitur, durū quid parte e-
 micâte & perforatū, & tauri caput quo-
 dammodo æmulans profert : id perru-
 ptum nuclei oleæ speciem initium o-
 stendit.

Pilum, *πίλον*. Hic pilula est lanacea, *σφα-
 εῖον ἐλαῶδες*, Plinius videtur legisse
καρυῶδες. Mollis, sed nucleo (*περιπυ-
 ρνήϊς*) durior, qua in lucernarum lu-
 minibus vtuntur. Flagrant enim probe,
 vt galla nigra. (Nascuntur in eo & pi-
 lulæ nucibus non absimiles, intus ha-

TABVLÆ STIRPIVM

bentes flocculos molles, lucernarū luminibus aptos: nam & sine oleo flagrat, sicuti galla nigra, Plin.)

¶ Pilulam comigerā, cætera inutilem, ver-
no autem tempore succo melligeno in-
ficientem tum tactu tum gustatu.

Pilulam aliam in ramorum alis sine pedi-
culo, concavoq; sessilem, peculiarem,
versicoloremq;. Nam eminentes quos-
dam vmbilicos candicantes, vel passim
variantes nigris maculis habet: partem
mediam cocci tinctura infectam splen-
didamq; ostendit. Aperta, nigra & pu-
tricans cernitur. (Φύει δ' ἐν περιώνησιν
τῶν ῥοπαίων μαχαλίδας ἔτερον σφαι-
εῖον ἄμυχον καὶ κοιλόμυχον.) Gignunt
& alæ ramorum eius pilulas, corpore
non pediculo adhærentes, candicantes
vmbilicis: cætera nigra varietate disper-
sa. Media cocci colorem habent. Aper-
tis amara inanitas est, Plin.

Pilulam è folijs cōuolutam, compressam
atq; oblongam.

Pilulā super folijs tergo adhærentē, candi-
cantem, translucidam & aquosam dum
tenera est. Hæc etiam muscas interdum
intus continet, veniensq; ad incremen-
tum

tum iustum, in modum levis paruula
gallæ indurefcit. Sed hæc rarenter adna
fcitur. (Et in folio rubente aquofos nu
cleos candicantes, &c Plin.)

¶ Pilulæ diuerfæ (σφαίρα) quinq; generū
& cachrys sexta. Sed & cætera omnia
(præter lapillum fortè) pilulæ dici poffo
videntur à figura.

Lapillum, pumiceū ferè. (μασσείδην)
fed rarò. (Aliquādo & pumicos gignit,
Plinius.)

Horū quædam Gaza obfcurius tranftu
lerat. Tranftulit & Plin. 16. 7. fed quædā
omifit: in quibusdam differt, vt anno
tauimus.

Ferunt robora & cachryn, (quæ postquā
folia decidere, hyeme durat in platano
quoq; nuce, tilia, picea, larice, abiete.)
Eft autē pilula in medicina vrendi vim
habens, &c. Plin. An cachrys etiam flos
quercuum?

Fungi è radicibus & iuxta radices.

Viscum. Sed hæc duo, fungi & viscum, cū
alijs etiā arborib. cōmunia habēt, Theo.

Item mel & apes teftè Hesiodo. Nafcitur
aut hic melleus humor cælo cadēs, nec
alijs magis infidet frondibus, Theoph.
Videtūr aut drosomeli, id eft, mannam
intelligere.

DE COLLECTIONE

STIRPIVM IN GE-

NERE.

*De colligendis stirpibus ex præfatione
Dioscoridis.*



NTE omnia curandum est, vt tempestiuè legantur & seruentur omnia. Ex hac siquidem obseruatione efficacia sunt aut euanescent medicamenta omnia. Serena itaque tempestate colligi debent. Refert enim magnopere ne à siccitate aut imbribus legantur: & vt è montanis, ventosis, frigidis, nec vliginosi locis, potius quàm contrarijs petantur. Nam quæ in campestribus, vliginosi, vmbrosi nec vento perflatis proueniunt, plerunque ignauiores sunt: Multoq; magis quæ non sua tempestate & importunè lecta fuerint, aut infirmitate distabuerint. Nec ignorandum illud etiam, sæpenumero hæc ipsa loci proprietate & anni temperamento, ocysus aut serius in integram ætatem absolui.

EX EPISTOLA HIPPOCRATIS
ad Cratenam.

F

DE COLLECTIONE

Tu quo ad fieri potest, nobis montanas maximè & in altis collibus nascentes herbas radicitus refeca. Sunt enim aquosioribus solidiores & acriores, propter terrę densitatem & aëris tenuitatem. Nam quod attrahunt frigidius est. Conare tamen vt etiam de his quę circa stagna nascuntur, & de palustribus, fluuiatilibus aut fontanis, flores colligas: quas sanè debiles, & exolutas, ac dulcis succi esse scio.

Et inferius, Sed & herbis multa reptilia venenū immittunt, & hiatu suo internæ ipsarum teneritudini adflictionem pro auxilio inspirant. id quod latet, nisi sanè nota aliqua aut macula, aut odor ferus & grauis, rei factę indicationem fecerit.

DE COLLIGENDIS HERBIS, EX *lib. 1. pharmaco. Iac. Syluij.*

Ex herbis plurimę solū virides in vsum recipiuntur, dum hæ vel harum succi in syrupos coquuntur, & in apozemata, clysteres, fots, cataplasmata, & alia id genus, in quos vsus postremos quouis tempore leguntur. In syrupos autem, vel formam aliam toto anno seruandā, sunt legendę quando sunt efficacissimę, cum scilicet florent.
aut

aut etiam semine iam plenæ sunt, vt fumar-
ria, calaminthe, & aliæ ex sequentibus in
syrupos vel alia composita diu seruanda re-
cipi solitæ. Nam fumariam florentem veris
initio, semine autem plenam veris fine legit
Mesues.

Quòd si herbæ nec caulem, nec florem
nec semem edunt, vt adiantum omne, asple-
nium, legantur in foliorum vigore: quando
scilicet maxima & virentissima sunt.

Quædam dum florent aut sementescunt
quia lignosæ sunt & exuccæ, ante id tempus
in vsum trahuntur, vt beta, brassica, cichori-
um, chondrilla, eupatorium, lapatha, planta-
gines, verbascum, verbenaca.

In quo virium vigore etiam sunt colli-
gendæ quæ siccantur, & in vsus medicorum
varios anno etiam toto seruantur, vt absin-
thium omne, adiantum omne nobis (qui-
bus enim abundat, virens & vogens vsurpa-
tur) anethi coma, betonica, carduus bene-
dictus, cichorium, centaurium paruum, cala-
minthe, menta, chamædrys, chamæpitys,
eupatorium, eufragia, fumaria, hyssopico-
ma, marrubium, maiorana, origanum, po-
lium, pulegium, ruta, rosmaris, saluia, (li-
cet hæ duæ etiam sine floribus sint effica-
ces) scordium, splenium, thymum, thymbra,

DE COLLECTIONE

verbascum. Aut saltem cum vigent folia magnitudine, odore, colore, præsertim quæ cacumini sunt propiora.

Absinthium vere legit Mesues ad succum & aquam inde stillandam, flores eiusdem æstatis initio, hic autem æstatis fine vel etiam autumno. Eupatorium quoque legitur & ex eo succus exprimitur in fine veris, Mesuæ. Siccantur autem in umbra magis, nisi quæ sunt caule crassiore, aut folio humidiores, & ob id apto putrescere. Vbi probè sunt ficcatae reponuntur, vt radices, sed minus diu seruari possunt, ob id quotannis mutandæ, Hæc Syluius.

De herbis colligendis, siccandis, & reponendis ex Matthioli commentarijs in præfatione Dioscoridis de materia medica.

Demetendi tempus, recondendi locus, perdurandi terminus obseruandus est, tum in stirpium, tum etiam animalium partibus, vt in hirci sanguine, lupi iocinere, intestino, ac etiam stercore, vulpis pulmone, apri vesica, anguium senecta, alijsque consimilibus. Assumantur igitur hæc omnia eo demum anni tempore, quo magis suis viribus sunt præditæ.

ditæ, nullo planè modo neglecto temporum ratione, quibus singula decerpi possulant. Neq; enim damnandi sunt, qui in quibusdam plantis colligendis quædam decreta tempora, nonnullosq; errantium syderû aspectus obseruant: quippe quod apud graues auctores scriptum inuenerint, pœoniæ radices contra comitiales non esse euellendas, nisi decrescente luna. Quæ quidem opinio non prorsus reprobanda videtur, nec ad ineptas incantationum, aliarumque vanitatum, quas stultè (vt ait Galenus) prodidit Pamphilus, comparanda. Nam cum inferiora terrestria à superioribus cœlestibus gubernentur, & regantur, fieri maximè potest, vt luna, vt quæ cæteris errantibus sideribus est nobis magis proxima, motuque velocissima, maximam cum plantis omnibus, ac rebus quibusuis alijs habeat rationem, tum cum augetur, tum etiam cum minuitur singulis mensibus. Quamobrem non temerè à Galeno proditum est, alyssum herbam tantum Sirio ardente ad canum rabiosorum morsus esse euellendam, sicuti etiam fluuiatiles, cancos ad idem peridoneos. Quo etiam tempore captamus scorpiones, atque anchusa radice constat sanguineo succo madente. Quemadmodum & stirpes,

DE COLLECTIONE

quibus facultas excalfaciens infit, perpetuò in locis calidis ac siccis demerere conuenit. Quocirca Hippocrates ad Crateuam scribens: Adnitere inquit, quantum potes, vt nobis montanas maximè, & in altis collibus nascentes herbas à radicibus reseces: quandoquidem hæ firmiores, atque acriores sunt ijs, quæ aquosioribus nascuntur locis: idque quod in montibus terra sit densior, & aër tenuior, nam quod attrahunt, frigidius est. Quin etiam dabis operam, vt flores ex his herbis etiamnum decerpas, quæ circa stagnantes aquas, paludes, fluuios & fontes prodeunt, quas sanè debiles & exolutas, ac dulcis sucti esse scio. Hæc Hippocrates.

Herbæ similiter atque radices, legendæ sunt, siccandæ ac asseruandæ, his tamen demptis, quæ tum in medicinæ usu, tum in cibis, tum etiam in obsoniorum condimentis quotidie virentes vsurpantur, veluti lactuca, intubus tam domestica, quàm agrestis (cichorium appellant) portulaca, buglossum, beta, atriplex, blitum, brassica, viola nigra, malua, helxine, linozostis, ocinum, apium, hyosciamus, sedum, plantago, asparagus, acanthus, & aliæ complures. Atq; non solum refrigerantibus herbis, verum etiam excalfaci-

cienti

cientibus recentibus utimur: plerumque enim ex calida potestate præditis, virides siccis præponimus, præsertim ubi minus calfacere sit opus: siquidem humor in virentibus exuberans earum calorificam facultatem haud parum demulcet. Cuius quidem classis habentur, amaracus, cruca, nasturcium, menta, absinthium, thymus, satureia, ruta, calamintha, sisymbrium, pulegium, abrotonum, & id genus permulta.

Sunt præterea & alia, quæ demetiri expetunt, cum primum floribus ornantur, ut centaureum minus, viola purpurea, origanum, symphytum petraeum, pulegium, serpyllum, amaracus, polium, thymus, chamedrys, chamæpithys, anthemis, chrysanthemum, stoechas, hyssopum, fumaria, aliæque consimiles plantæ, quas ne longior, quàm par sit, esse videar, ex industria prætereo. Hæc igitur omnia serena cœli constitutione, non nubibus, non imbribus infestis imprimis colligantur oportet. Deinde terra expurgata, atque alijs aduentitijs excrementis amotis diligenter in umbra siccentur. Nisi ex eo genere habeatur, quæ caulis crassitudine, ut in acantho: vel foliorum lentore, crassitie, & humoris exuberantia, ut in portulaca, & crithamo, omnino insolari expetant, quandoquidem si

DE COLLECTIONE

eiusmodi herbæ in vmbra siccandæ reponantur, dubio procul situ obducentur, & putrescent. Cæterum vt rectè exiccatæ fuerint, decusso puluere, in sacculis ex corio, velligneis capsulis, recondantur, ac diligenter claudantur, ne earum vires euanescant. Quæ in re errant seplasiariorum pleriq; , qui herbas iam siccatas in fasciculos digerentes ad officinaria laquearia suspendunt, vbi non solum breui viribus destituuntur, aëris ambientis exuptione, ac ventorum perflatu, sed etiam puluere, & aranearum telis obsiduntur, quin etiam muscarum stercore, quæ illis die noctuq; insident, labefactatæ nigricant. Neque verò planè laudibus efferendi sunt ij, qui in linteis sacculis, ipsisq; textura admodum raris eas trabibus appendere consueuerunt: quippe estiuus aër in ipsos penetrans, quicquid boni inest, absumit & abolet, quin etiam puluere obsitæ corrumpuntur, & contabescunt. Idcirco vt tam herbæ, quam radices suas integras asseruent facultates, nihil quidē præstantius, quàm eas capsulis tiliaceis, vel piceis, vel fictilibus, diligenter clausis reponere, vt docet Hipp. ad Cræteuam his verbis scribens. Omnia medicamenta, quæ succi & liquoris fluidi sunt, in vitreis vasis ferantur: quæ verò folia, aut flores,

res aut radices sunt in fictilibus nouis probè obturatis, vt ne ventis perflata, medicamento vigorem, veluti in animi deliquium collapſa, amittant. Quod ſi Hippocrates in recentibus obſeruandum præcipit, id maxime in ſiccis fieri operæ præcium erit. Haftenus Matthiolus.

Sunt quæ in menſis alicuius initio aut fine potiſſimum florent aut fructificant, quæ nos tamen in tabulis duodecim menſium ſimpliciter enumerauimus. Ita; cogitandum eſt non rarò fieri vt quæ in menſis alicuius initio florere ſolent, circa finem aut medium etiam menſis præcedentis appareant: & rurfus vt quædam à præcedentis menſis ſiue ad principium aut medium ſequentis differantur.

Pulmonaria tota æſtate in quercu arbore & ſaxoſis locis inuenitur.

Succus ex herbis colligendus in noua caulium productione, eodemq; modo ex folijs: liquores lachrymæque ſectis integra ætate caulibus excipiendi, Dioſco.

DE FLORVM COLLECTIONE

& repositione ex eodem Matthiolo.

Flores non ſecus atque reliquarum plan-

DE COLLECTIONE

tarum partes, eo tempore colligendi sunt, quo magis suo in vigore consistunt, non autem cum iam flaccescentes decidui euanescent. At capparum flores muria asseruandi antea quàm se explicent, decerpuntur: rosarum verò cum non planè exciccati visuntur: cæteri deinde cum omnino expansis folijs patent. Verùm cum maiori ex parte omnes flores ferè sint herbis fragiliores, molliores & tenuiores, idcirco tantum abest, vt in sole siccandi sint, vt ne quidem in vmbra, si calida vel eminentia fuerint loca: quippe, vt solis feruore, sic & aeris calore nimio exoluuntur. Siccentur igitur in locis temperatis, quo tempore sæpius reuoluantur, ne situm contrahant, adhibita etiam cura, ne sicci natiuum colorem perdant, quandoquidè certum est flores, qui inter siccandum à proprio colore degenerant, nullius esse in medicina vsus. Siccantur autem probè vbi substratis linteaminibus sparguntur, & ijsdem lenibus operiuntur. Flores itaque in vniuersum sicci ad annum duntaxat edurant, etsi anthemidis, centaurij, chrysanthemi, millefolij, spartij, & rosarum flores etiam longiori asseruentur tempore, si ligneis arculis optimè inclusi diligenter recondantur. Matth.

De floribus legendis ex Syluio.

Flores

Fores legantur cùm maximè vigent, cœlo sereno, vt capparisi in gemma, rosa expandi cœpta legatur : reliqui ferè aperti, sed haud ita pridem : & ex quibus vis nondum exhalauit, nec folia tenuentur, & sint decidua.

Siccantur sole vel aëre calido, magis, minus, pro varia ipsorum natura, quidam siccandos volūt donec ex ponderibus decem vnicum superfit, minus autem ex montanis floribus quàm ex campestribus minuitur, Sylius.

Flores legi debent priusquam decidant, Dioscorides.

De differentia florum ratione temporum anni, locorum, &c.

Plantæ plerunque pro peculiari aut loci, aut anni clementia maturius nunc, nunc verò serius, vt adolefcunt, ita etiam florent : sic in Germania omnia vno aut altero mense tardius florere, quàm Neapoli, aut alijs locis calidioribus videmus. Sic ex Fuchsij monumentis Geranij speciem primam, quam acum muscatam appellari vulgò ait, Aprili mense florere : in agro tamen Neapolitano ineunte Martio, singulis annis eandem florentem obseruauit Maranta.

DE COLLECTIONE

Anni etiam constitutio eandem rebus affert diuersitatem : Sic brassicas mense Decembri caules edidisse vidit idem Maranta, ac in flores erupisse : cùm vt plurimum vix Februario florere incipiant.

Quædam per hyemem flores & folia proferre solent : quædam bis per annum etiam florere, Dioscor.

Anni parte maiore florent multa quæ coluntur, hoc est verè, æstate & autumnò, & quædam inclusa etiam hyeme, vt Caryophylli, leucoia, violæ dasypodes.

Menses omnes videntur aliquas in ipsis florentes proprias habere, excepto Octobre: & hyemalibus, Nouembre, Decembre, Ianuario & Februario, si tamen Februarius in alijs Germaniæ partibus mitior sit quàm Heluetiæ nostræ, proprios ei flores dixerim leucoij bulbosi, tussilaginis, thymelææ maioris quàm zylandt dicimus, quòd Februario florere incipiant licet in Martium extendantur.

Calendula & bellis minor locis calidioribus, toto fermè anno florentes inueniuntur.

Sunt quæ vno tamen mense florent.

Alia non vno aut altero mense tantùm, sed diutius, vt pentaphyllum, rhododaphne pu-

ne pumila siue herbacea.

Ocimoides, capsicum, bursam pastoris hyems superueniens diutius florere prohibet.

Quæ apud authores æstate florere legimus, aut fructificare, ad mensem Iunium & Iulium apud nos potissimum referemus. Maius enim aliqua ex parte vernæ, vt Augustus autumnalis constitutionis est, hic suo fine, ille principio.

Tota æstate florent.

Anagallides à Maio vsq; in autumnum.

Fraga vere & tota æstate, inque maximam autumnæ partem. Hyoscyamus ferè per totam æstatem, præcipuè Iulio.

Phu. Ranunculi secundum & tertium genus apud Fuchsum.

Saxifraga pimpinellæ similis æstate in autumnum vsq; floret.

Sideritis prima Fuchsi, folijs marrubij, Iunio floret vsq; ad autumnæ finem.

Symphytum magnum.

Autumnus velut alterum quoddam ver est, & multæ in eo florent, sed parcius incertiusque, quæ vere copiosius non solum herbæ, sed etiam arbores apud nos aliquando: hæc dum scriberet Gesnerus anno 1553. initio Octobris pyri arboris flores ad eum al-

DE COLLECTIONE

lati fuerunt, vt ipsemet scheda manu sua scripta, testatus est.

De florum differentia, ob cultum.

1 Anno 1556, cū apparuisset cometa, ver fuit satis calidum, & flores pleriq; duabus aut tribus septimanis præuenerunt.

2 Stirpes vetustiores, quæ in locis subter raneis, aut cellis vinarijs, aut alioquin locis tepidioribus aut hortis per hyemē seruantur, multò citius flores edunt, quàm recens & modò sata plantæ.

3 Flores multiplices, *gefüllte Blümen*, an & prius incipiunt flores emittere & durant diutius in suo genere? & hortensia multà quàm syluestria prius diutiusq; ob alimenti copiam, si frigus & vmbra, & loci natura nō prohibeat.

4 Nota, Quædam anno primo non flores, vt olusatrum, sceniculum nostrum: nam dulce floret primo.

5 Quæ primo anno florent, eodē pereūt.

6 Herbæ floribus multiplicibus, *gefüllte Blümen*, plerunq; steriles.

7 Herbæ aliquæ abscisse, vel aliter læse, de nuò postea crescunt & florent, sed tardius.

8 An vbi in eodem genere albi, & aliorum colorum flores sunt, albi præueniunt: in ros, ca-

sis, caryophyllis, cyano, aquileia, ocimoides. &c.

9 Quę feruntur, alia prius, alia tardius florent, prout vel autumnō vel verno, vel veris initio aut fine aut etiā æstate sata fuerint.

Eorum quę in hortis quotannis feruntur, vel citius vel tardius, maior ex eo ipso varietas est: & præstat scire quoto tempore a satione eorum vnumquodque floreat aut semen ferat. Cnicum Nouembri florere vidi, erucam etiam, nasturtium, fœniculum, sed rara.

10 Multum refert in vasis, vel in arcis plantari: hæc ferè proceriora fiunt, vel citius florent. In vasis tutiora sunt ab animalculis infestis.

De nonnullis, quę florent, semen verò non gignunt.

Sunt ex plantis quędam, quę florent quidem, semen verò non proferunt, vt omnes ferè stirpes, quę florem multiplicem emittunt, Chamęleuce quibusdam dicta, Arthritica, Viola Martia dasypus, Sambucus aquatica, Ranunculus, Cerasi genus vt sequitur: quoniam vis omnis consumitur in florem. Aquileia tamen, Calendula, & paucę alię, semen ferunt.

DE COLLECTIONE

Acer maius apud nos, *ahorn*: cuius generis arbores quædam etiam florem non ædunt.

Cerasi genus in sylvis prope Scaphusiam ut audio flore magno, multiplici. *Gfülle te wilde Fricse.*

Erica. *Scid.*

Fraxinus in quibusdam locis.

Arbuscula quædam innominata in ripis fluuiorum quorundam, (*Elzbeebre*) odore nucleorum, perfici ferè in folijs & cortice.

Pseudomomum sæpè apud nos. Nam in Gallia & Italia fructum maturat, ubi in hortis colitur. Nascitur apud nos sponte circa ripas & alibi, folijs ut ribes vulgaris frutex, quem etiam magnitudine ferè æquat. Pseudomomum autem esse, non piperis genus, ut quidam putant, ex veterum descriptione conijcio.

Salicem Homerus *oleficarpon* à sterilitate nominauit. In syluestri tamen latifolio genere pappos à flore auolantes loco seminis esse *Tragus* obseruauit.

Tamarix.

Thymus, cui flos pro semine.

Tilia syluestris.

Viola dasypus, *gfülte vionle.*

Quæ

Quæ semen fructumue ædant flore non antegresso (aut nucamento floris loco) nulla aut quàm paucissima sunt, vt mali quædã apud nos (vt audio) & filix fortè. Omnino quæ nec florem nec semen (aut semen non manifestum) gerunt, toto anno virent pleraque, nimirum quod succus plantæ natiuus non consumatur in semen: quæ verò semine abundant, vt ferulacea, & quæcunq; umbellulas gerunt in herbarum censu, hyeme ferè omnia intereunt, vbi semel fructum copiosè protulerint: quòd quædam primo statim anno faciunt: alia in secundum aut tertium annum caulis germinationem & fructificationem differunt, vt in angelica nostra obseruatum est.

Sabina apud nos alicubi nec florem nec fructum ostendit.

DE SEMINVM COLLECTIONE.

Semina cùm siccare inceperint, legi debent antequam delabantur, Dioscorides.

Semina deligantur matura omnia, bene habita, plena & corpulenta, & quæ naturæ suæ vires proprias habeant efficacissimas, & odorem, saporem, colorem, sui generis

DE COLLECTIONE

perfectissimum, si odoris, saporis est particeps. Sint præterea recentia, aut his proxima. Quæ enim diutissimè fuerunt reposita semina, & alia, vires habent imbecilliores, Syluius.

De seminum collectione & repositione ex Matthiolo.

Non minori studio colligenda sunt semina tam ea, quæ suis in stirpibus nuda innascuntur, vt lithospermi, fœniculi, anethi, & cari: vel vasculis, aut capitulis inclusa, vt papaueris, nymphææ, melanthij, hyoscyami, & ocimoidis: aut siliquis tecta, vt fabæ, ciceris, phasioli, dolichi, & lupini: aut corniculis recondita, vt fœnigræci, sertulæ Campanæ, sinapis & erucæ: aut varijs inuolucris contenta, quàm ea quæ circa medullam quorundam fructuum intus conduntur, quale est mali medici semen, aurantij, limonis, pyrorum, cydoniorum malorum, peponum & melopeponum, cucurbitæ & cucumeris. Veruntamen hæc assumere oportet, cum fructus, à quibus eximuntur, suam maturitatem planè senserint: illa verò vbi herba iam sicca, non amplius virent. Et quamuis multa reperiantur semina, quæ ad annum ultra suas afferuent vires, ea tamen quotannis

annis renouare satius ac tutius erit, siquidē pauca sunt, quæ inueterata rancorem non redoleant: quo fit vt calorem nanciscantur extraneum, & sibi non cōgenitum. Vbi igitur sicca fuerint semina arculis ligneis reponantur in locis siccis: facillē enim cōtrahunt locorum humores. Hæc Matthiol.

Quæcunque fruticosa (*ἰφύλλοι*) sunt, qualis stichas est, trixago, polium, abrotonum, absinthium, seriphium absinthium, hyssopus, aliaq; his similia suis seminibus prægnantia legi oportet, Dioscor.

DE COLLECTIONE ET CON-
seruatione fructuum ex Matthiol.

Cæterum fructus, quemadmodum pruna, serica, myrti baccæ, cydonia mala, cerasa quæ vulgò maraschas vocant, corna, sorba, ficus, punica mala, & alia id genus, quæ in medicinæ vsum reponuntur, operæpretiū est, vt maturi ex arboribus decerpantur: quamquam sorba, vt siccentur, immaturā decerpere conueniat. At animaduertendum est, quod vbi astringente, & repressiōe sit opus, fructus astringentes vt paululū potius immaturi, quàm secus, demetantur oportet. Porro iuglandes, amygdalæ, pistacia, nuclei pinci, & auellanæ non prius ex arboribus

DE COLLECTIONE

excutiantur, quàm planè vltimum maturitatis gradum senserint. Id autem rectè cognoscitur, cùm extima inuolucra sponte sua dehiscunt, & arbore concussa vnà cum fructibus decidunt, alioquin insolatu contrahuntur & sidentur. Ex his igitur, qui siccati asservantur, capsulis ligneis potius, quàm fassis recondantur, ne extraneos humores concipiant. Qui verò per annum recentes reponuntur, aut maiori ex anni parte perdurant, in locis siccis, minimè asperginem redolentibus appendantur, vt assolet de vuis, pyris, malis cydonijs & punicis: aut super paleas expandantur, vt sit cum malis, sorbis ac mespilis: aut hordeo vel milio sepeliantur, quemadmodum medica, & aurtia mala, Matthio.

Fructus legi debent, inquit Dioscorides, maturi.

Lentiscum arborem quæ mastiché fert, & triplici fructu tria tempora monstrat arandi, Germaniâ ignorat.

Malus medica regionibus calidis per totum ferè annum, si cura adhibeatur, floret atq; fructificat. Citronen/limonen/vnd pomeranzen.

Seminibus & fructibus omninò carent apud nos December, Ianuarius, Februarius & Mar-

& Martius. Aprilis paucissima nec solita colligi (vt hepaticæ terrestres & cyclamini for-
tassis) profert.

DE RADICIBVS COL-
legendis.

Radices quas seruari oporteat, radicum-
que succos, & cortices, incipiente in plantis
illis foliorum defluuio erui, excipi & aufer-
ri oportet: & per se puras locis sine humo-
re, vt erunt, siccare: lutosas verò aqua prius
lauari, Dioscor.

Et paulò antè, Sciendum ex herbarum
medicamentis durare ad multos annos so-
lum candidum & nigrum veratrum, reliqua
ad triennium tantum habere vsum.

*De collectione radicum
ex Syluis.*

Radices omnes incipiente foliorum de-
fluuio legendas, & cælo sereno, censuit Dio-
scorides, cui in quibusdam Galenus & Aui-
cenna & Mesues consentiunt, in alijs diuer-
sa sentiunt. Sunt contrà quibus placet ma-
gis, radices esse legendas priusquam in cau-
lem, folia, florem, fructum, semen, vis plantæ

DE COLLECTIONE

propè tota erumpat. Deſluentibus autem folijs, eas eſſe fœtis animalibus ſimiles, hoc eſt, velut ſemianimes ac multum imbecillas, niſi ſi quæ tantum habebant virium, vt etiam earum ſatis retineant arefacto caule, vt ſcilla quomodo valida animalia etiam fœta adhuc robuſta permanent, niſi dicas etiam in illis quæ viua & veteri radice repullulant ſaliuam vitalem plantæ velut ſanguinem per caulem priuſquam areſcat, in radices, licet non totum, reſluere, vt in arboribus ſit.

Quouis tempore colligi poſſunt, quæ hominum cultu & ſatione crebra in omnem anni partem vegetæ incidunt, quales ſerè ſunt hortenſes, alimentofæ, vt apij vulgaris, bugloſi vtriuſq;, betæ, lactucæ, intybi, oxalidis, raphani, napi, paſtinacæ, ſifari, cari, panacis, cepæ, porri, allij: & præter has erraticæ, dauci, gingidij, caucalidis, ari, dracunculi, cyclamini, periclymeni, cotyledonis: nam hæc quinq;, vt bulbofæ quædam aliæ, etiam æſtate ſiccatis folijs, plenæ ſunt, & frequenter autumno regerminant, alimenti pinguis & craſſi copia.

Quæ verò ſolius naturæ ſponte creſcunt, aut ſemel à nobis tempeſtiuè ſeruntur aut plantantur, ſerè ſunt optimæ ſolo aut vere,
aut

aut (vt dixi) autumnno, paucissima æstate
aut hyeme.

Quin & hæc quas multis anni partibus
communes diximus, sunt præstantiores
cùm tempestiuè satæ adoleuerunt & vi-
gent: alijs verò tēporibus ignauiores, quan-
do vi quadam & holitoris opera & irriga-
tione coguntur adolescere sub cœlo sibi pa-
rum propitio, quale æstium est ac autum-
nale & hyemale.

Sic vèrè ipso quando primùm germinare
incipiunt, nobis leguntur in annum inula
(Augusto, paulò post) althæa, iris, acorus,
symphytū, ruscus, (Ellebori albi radicē vers
colligit Aëtius) asparagus, petroselinum, a-
pium, fœniculum, bryonia, cyperus, rubia,
saxifraga, valeriana, eryngium, tormentilla,
pæonia utraq; polypodium, gramen, lilium:
nisi recentibus aliquando sit opus, sed quæ
omnino erunt imbecilliores, quàm si quo
tempore recentes colligi debent, in vsum
venissent. Hæc omnia Syluius.

Et rursus, Radices autem legendas cū m
folia cadunt, etiam censet Auic. canone 2.
& Platearius in Aristolochia: quædam ta-
men alijs temporibus Saladino leguntur,
veris fine, aut æstatis initio, acorus, gentia-
na: aut mense Augusto, quando etiam spina

DE COLLECTIONE

alba vulgò bedegar, ruscus, bryonia, cyperrus, iris, enula campana, dictamn⁹ vulgaris, pæonia, glycyrrhiza: vt Septembri peucedanum: Octobri cyclaminus recens & siccus efficax: Decembri eryngium, ijsdem leguntur. Hæc ille.

*Quo tempore radices eruendæ, & quo pæsto ad vsum reponendæ sint,
ex Matthiolo.*

Radicum vires, sicut & aliarum stirpium, partium, non eodem anni tempore æquè in omnibus reperiri: quandoquidem alia hoc tempore, alia verò illo humore prægnantesprehenduntur. Tametsi non desint, qui haudquaquam infirmis rationibus innixi, radices à terra eruendæ asserant semper autumnino, cùm videlicet folia decidunt, & caules cõtabescunt: alij verò incunte vere, priusquam folia concrecant: siquidem hisce temporibus radicibus maior vis inest, quàm ceteris partibus. Sed vt ingenuè in hac re fatear, quid sentiam, crediderim: ego omnino maiorem succi vbertatem inueniri in his qui vere effodiuntur, quippe quòd plantæ nondum caules, folia, neque flores emiserint,

emiserint, à quibus omnis radicum succus exhauritur. Sed & rationi consonum mihi videtur, autumnales radices omnes, tum paucioris, tum imbecillioris esse succi, quàm vernaes; quod scilicet pauco ante tempore & caules, & folia, & fructus ediderint. Non tamen inficiari velim, quod quæ vèrè leguntur, copiosiore, quàm par sit, humore redundantes, illoque longè minus concocto eo, qui in autumnalibus habetur, putredini & corruptioni non sint magis obnoxia, præsertimq; si longo asseruentur tempore. Quare à Dioscoride animaduersa, is sanè iussit stirpium radices effodiendas esse, cum stirpes ipsæ folijs exuuntur. Quod cum varijs anni temporibus eueniat, pro natura diuersarum plantarum, curam impendere oportet, vt suo tempore vnaquæque radix integrè, si fieri potest, cum omnibus suis adnatis euellatur, & in ijs locis, atq; sub ea cœli constitutione, quam maximè familiarem habent.

Porro radices abundè nutritæ sint oportet, ac omni putredine, & labe vacantes: non ita tamen, vt præ nimio alimento ex pingui solo, vbi nascuntur, accepto, debitam & humoris copiam, & corpulentiam metam excedant, neque vt eiusdem alimenti inopia ina-

DE COLLECTIONE

nes, & rugosæ reddantur. Quod cum maximè perspexisset Galenus de iridis radicibus differens libro primo de antidodis: In vniuersum (inquit) ex omni medicinarum genere illæ radices inutiles habentur, quæ inanes sunt & rugosæ. Atque illæ quidem deteriores sunt mediocriter nutritis, & mediocrem magnitudinem nactis, quæ crassitudinis modum excedunt, & plus humoris in se continent, quam illis vsu veniat. Hæc Galenus.

Cæterum vbi radices à terra fuerint exemptæ, primum quidem tandiu aqua clara elui debent, donec omni vndique terra, vel limo penitus abstergantur: mox deraditum à fibris, tum capillamentis omnibus, quibus vniuersim ferè omnes comantur: postremo siccare eas conuenit omni adhibita cura. Quod si fuerint quales fœniculi, apij, asparagi, rusci, polipodij, rubiæ, intubi & consimilium, in vmbra, vbi orientales ventii respirent, diligenter siccentur. At omnino cauendum est, ne sole feriantur: quippe quoniam potior earum pars ab eis procul dubio euanesceret, utpote raris & tenuibus. Verum enimuerò si ex eis fuerint, quæ natura crassæ sunt, veluti gentianæ, he-

nij

nij, mandragoræ, bryoniæ, & id genus alia, & aer sit nubilus, & hyems, ne in umbra situ tabescant, ac proinde marcescant, in sole ac vento tutò siccati possunt. Quod commodius fieri potest, si frustatim dissectæ, ita tenui funiculo traijciantur, ut partes non se contagant, aut cratibus impositæ quotidie sæpius manibus reuoluant. At qui curandum est, ante quàm siccentur, ut lignea matrix, quæ omnibus ferè radicibus includitur, ipsis in longum fissis, integra eximatur: quippe omnino inutilis est, nullamque vim obtinet, etsi gentiana, cyclaminus, aristolochia rotunda, iris, bryonia, centaurium maius, nymphaea, aliaque complures absque matrice suas præ se ferant radices.

Siccatis radicibus, quòd planè constet eas sine tabe, & teredine, per tempora asservari posse, ijs reponantur in locis, ad quæ solares radij non penetrent, neque fumo pateat aditus, & quæ neque vliginosa sint, neque puluerulenta. Sit igitur locus eminens & siccus, ad Septentrionem verges, vel etiam ad meridionalem plagam, quando scilicet radices ipsæ non prorsus exiccatae reconderentur: adhibita tamen cura, ne eo tempore austri humidissimi status admittantur. Ita do-

DE COLLECTIONE

nique recondi ac seruari possunt tot annis, quot ab inanitate, teredine, & tabe vindicari valeant. Nam etsi quæ tenues sunt, vt asari, phu, asparagi, rusci, & id genus aliarum anno duntaxat perennent, veratrum tamen utrunque, quamuis radicibus constet tenuibus, ad 30. annum vsque perdurat. Hæc ex Mathiolo.

Videtur sanè radix quæque melior ante herbam vere, vel autumno herba denuo marcescente: deinde ante caulem, tertio ante florem, quarto ante semen aut fructum. Quamobrem utile fuerit scire quo tempore quæque herba floreat, aut semen maturet. Videntur enim quæ autumno florent & semen maturant, aut paulò ante maturaerunt, illarum radices colligendæ uere: contra quæ vere florent aut fructificant, autumno: aut certe vere antequam florent, cum primum scilicet germinare apparent. Porro quæ media æstate florent aut fructificant, harum radices vere autumnouæ colligas parum referre puto. si tamen propius autumnum flos fructusue earum accesserit, vere potius radices colliges, & contra. Denique nunquam florentium, radices vere autumnouæ colligi possunt, vt filicum: herbarum autem ipsarum earundem, mense Maio potissimum

mum carpendē. Filix quidem (vt Tragus docet) circamediam æstatem semen habere videtur.

Radices stirpium quæ florent colligendæ sunt aliàs

Citius, Augusto nempe vel autumno, vt artritice, ellebori nigri, consiliginis.

Tardius aut diu: vt species gentianæ, saxifragæ pimpinellæ similis, vèrè.

Sed utroque tempore (vèrè & autumno) quædam à principio, aliæ medio, aliæ & fine. Vt in fine veris, quæ autumno florent, & germinat tardius: in fine autumni, quæ æstatis medio aut fine floruerint: initio autumni, aut in fine hyemis, quæ vèrè aut initio æstatis florent, Gesnerus.

De radicum tempore collectionis, exiccationis modo, & loco conseruationis siue repositionis, vide plura apud Nicolaum Præpositum lib. I. cap. 3.

DE COLLIGENDIS ET

asseruandis corticibus ex

eodem.

Cortices, qui fructibus auferuntur, vt cytrijs, punicis, & cucurbitis, quique arboribus decerpuntur, veluti thuri, ligno gua-

DE COLLECTIONE

ſaco, ſambuco, ac fraxino : qui item herbarum radicibus detrahuntur, vt capparum, mandragoræ, thapſiæ, alypiæ, pytinſæ, ac aliarum, non ſecus ſunt ſiccandi, atque radices: quin etiam ſimiliter reponendi, Matthiol.

Cortices, quæ ex radicibus ſtirpium colliguntur, colligi debent eodem tempore, quo radices legi debere modò dictum eſt, quæ verò ex ſeminibus aut fructibus, colligantur tempore ſeminibus aut fructibus præſcripto, & eodem quoque modo reponendi ac ſiccandi. Durant verò tanto tempore, quanto ea ipſa à quibus illi ſunt collecti: niſi quod fructuū cortices, vt citri, aranciorum, granatorum, ſeoſim à fructu diutius integri viribus conſeruari poſſunt,

ob ſuperflue humiditatis exiccationem. Nicol.

Præpoſ.

TABVLA

TABVLA STIRPIVM

PRIMA, ALPHABETICE ENVMER

*rans tum florendi, tum fructificandi initia &
fines: nec non etiam alia, quæ ad ea-
rum cognitionem sunt non
inutilia.*

A Bietes omnes Maio & Iunio folia ve-
tera nouis succrescētibus abijciūt.
Abrotonum mas, stabwintz, floret Au-
gusto.

Absinthium commune floret Iunio: in
horto verò meo vmbroso, medio & fine Iu-
lij floret.

Absinthij species, vt quidam non rectè
putant, welsamen, flosculis luteis, qui sili-
quis suis præfiguntur, vt in filio ante patrē,
floret Maio.

Absinthium in hortis floret Augusto.

Acer maius, chein, huius generis arbo-
res quædam Maio florent: aliæ nunquam
florent, omnes quidem steriles sunt.

Acer minus, id est opulus, vt ego inter-
pretor, in planis semen maturat mæsis tem-
pore, hoc est Iulio mense: in montibus Se-
ptembr.

Aconitum cœruleum, napellus, in hor-

DE COLLECTIONE

tis floret Iulio, & in montibus tardius fertur, nisi aprici fuerint. Semē fert Iulio in hōrtis.

Aconitum luteum, medio Iunij incipit florere. In horto meo Augusti principio, flore subalbido ē luteo. Semen fert, Augusto.

Aconitum flauum in hōrtis, floret post cœruleum, & in fine Iunij.

Aconitum quod Lupariam vocamus, flore palido, wolffwurtz floret Iulij medio, vel in fine, nisi loco crescat aprico.

Acorus vulgaris floret Iunio: semen fert Septemb.

Acorus falsus officinarum, floret Maio.

Ægolethros vere floret: herba venenosa capris & iumentis, Plinius. Hanc ego in Boue cap. 3. descripsi, & ostendi esse illam, quam vinitores nostri malum Heinrichum vocant, aliqui hundts blūmen, Saxones Schuppenwurtz.

Ægolethros nigra rotunda, semen fert Maio.

Alcali ē semine natum, floret Iulij medio.

Alcea Sigmaro wurtz, floret Iunio, Iulio & Augusto.

Algæ palustres & fluuiatiles (wasser völer: & Ampelos fluuiatilis) itē hydrolapthi folio & flore quædam in lacu tantum putro, flo-

to, florent principio Iulij.

Alismatis genus, quod Fuchsius Ophryni nominat, Alysson Plinij, simile rubiæ, maius & minus, wald meyster/flein vnd groß/florent Maio.

Alisma Italorum, & centaurij floribus purpureis, principio Iunij floret.

Alliaria floret Iunio mense.

Allium alpinum radice reticulata: foliorum eius forma refert allium vrsinum, floret Maio.

Allium montanum radice oblonga, rubescente, folijs angustis, floret Augusto.

Allium vrsinum, wald knoblauch/ramseren/lac exprimitur ei ex pericarpis eius triangulis, floret in fine Aprilis, & Maij principio.

Allium hortense & syluestre, florent Iulio.

Alnus vide etiam in Betula. Alnus suis iulis, qui ei non decidunt, floret in Vere. Sed autumnno appetente semē maturat circa No uembrem.

Alfene hennentarm vulgaris, flosculis albis, floret Februario.

Alfinæ species in vineis, folijs crassiusculis, angulosis, flosculis cœruleis, flores Februario.

DE COLLECTIONE

Alsinę species duę, flosculis cęruleis quas pingit Fuchsius: quarum altera folijs est sub rotundis, angulosis, carnosis, pilosis, in vineis. Altera folijs parvis, serratis. Item Alsinę quędam recto caule, pilosa, flosculis candidis, minimis in corymbis, insipida: Cęteris sui generis sicciior, florent Martio.

Alsinę maior & minor florent Septem. & Octob.

Alsinę species glutinosa, flosculo concavo, per summum multifido, floret Iunio.

Alsinę semen profert Iulio.

Althęa floret Iulio & Augusto.

Althęa peregrina, luteo flore, floret Octobri.

Alysson Ruellij, pseudalysson in pratis, floret Maio. Alysson Ruellij, quę ego quidē herbam inutilem & minime Alysson arbitror, floret Iulio. Alysson pratense seu Ruellij, flasse fruct / crepitu seminum maturorum intra clypeos concussos, semen fert Iunio.

Alysson quorundam, floret Augusto. Sed aliud Patauio nuper ad nos missum est.

Amaracus, maiorana, samfuchum, floret Iulio, Augusto & Septemb.

Amaranthus communis minor, flos amoris

moris, quibusdam, folijs bliti ferè, spica purpurea, fòlbly, floret Augusto. Et alius flore non vt reliqui, sed herbaceo quodam verticillo floris loco, folij pars media ad pediculum, punicea est. Maior cuius folia nigram maculam habent, paniculis longis, ramosis, Augusto itidem.

Amaranthi Pliniani species procerior, rarior, longissimis paniculis, lange fòlbly, floret Octobri.

Ammi, floret Iulio & Augusto.

Ammi cuius semen simile est semini petroselini vulgaris, floret Septemb.

Ammi in hortis nostris satum¹, floret Octobr.

Amomum falsum, pseudamomum, floret Aprili.

Amygdalus cum persico floret in vere, Aprili: fructum fert Septemb.

Anacampseros, fnabent frut. vide Telephium. Semen fert Iulio.

Anagallis, morsus gallinæ, floret Maio & Iunio.

Anagallis rubro flore, floret Iunio, Iulio & Augusto mensibus. Semen fert etiam Iulio.

Anagallis purpurea, in vitibus, floret Iulio.

DE COLLECTIONE

Anagallis aquatica maior, floret Maio & Iulio.

Androsæmon, floret Iunio. Vide Bellis.

Androsæmon maius, caule quadrangulo cum eminentijs foliosis, & aliud caule rotundo, florent Iulio.

Androsæmon minus, perforata, floret Iulio.

Androsæmon, id est perforata, & androsæmon Fuchsj, cui paucioria, maioraq; sunt folia quàm perforata, ffinrat, ego posteriorem ascyroides dixerim. Sed sunt omnino congeneres herbæ. Vtræq; Iulio & Augusto florent.

Anemone lutea quædam, trollblûmen/ floret ad finem Aprilis.

Anemone montana, semen profert Augusto.

Anethû floret Iunio, Iulio, & Augusto.

Angelica odorata, principio Maij floret.

Angelica odorata laser Gallicum, floret Augusto.

Angelica inodora, quæ vulgò Aquileia, floret Maio.

Angelica aquatica, floret Iulio & Augu.

Anguria in horto meo, folijs in cucurbitarum genere maximè diuisis, fert fructû Iulio.

Anisum,

Anisum, floret Iulio.

Anonis, floret Iulio.

Anthemis, flores Iulio.

Antirrhinon folijs hyssopi: & aliud aruense, flosculis purpureis, folijs perangustis, floret Iunio.

Antirrhinum folijs oblongis maius & minus, vel purpureum & album, floret Iunio.

Antirrhini genus, paruis folijs, floribus albicantibus, floret Iulio.

Antirrhini genus flore cœruleo, floret Aprili.

D. Antonij herba, sic dicta, quod igni sacro medeatur: aliqui Lysimachijs adnumerant, vt Fuchsius. Sunt qui filium ante patrem vocent, quod semina in exilibus & oblongis siliquis, antequam flos apparet contineantur. Plures huius sunt species. Floret Iulio.

Aphace Fuchsi, genus vicæ sylvestris, floret Maio.

Aphacæ vel vicæ, aut potius orobi species, floribus flauis in caule recto spicatim digestis: folijs è viridi candicantibus, quorum bina semper eminent cum capreolo medio, floret Iunio.

Apios quorundā, erdnuß/ floret Iunio.

Apium, floret Iunio.

DE COLLECTIONE

Apij genus palustre folijs cicutæ latioribus, floret Aprili, & Maio. Vide ne seseli.

Apijs cognata herba umbellifera è semine nata anno 59. in vasis, folijs saxifragæ hircinz, olens petroselinum, floret Iunio.

Apij genera, hortense & montanum Eucherij, à quo ille petroselinum vulgò dictum nihil quàm cultu differre conijcit: apium verò hortense veterum id esse quod vulgò apium, Eppich vocant: ego neutram eius sententiam probo, sed partim experientia mea, partim doctorum Galliz Italizq; consensu, apium vulgò dictum, cleoselinon facio, id est apium palustre: petroselinum verò, vulgò dictum, veterum hortense. Vide quid Belonius. florent Iulio.

Apium, semen fert Septem.

Aquilegia, in fine Aprilis floret, & Maio.

Aquilinz vel Aquilegiæ genera omnia, florent Maio, gßilt/myß/Blauw.

Arbutus in calidis regionibus per Galliam & Italiam, fructum fert Septemb. Germania arbuto caret.

Argemone altera, genferich, vulgò Potentilla, floret Maij medio, & Iulio.

Argentaria, quæ species herbæ stellæ existimari potest, floret Iunio.

Argen.

Argentaria alpina, floret Maio.

Aristolochia longa, floret Iulio.

Aristolochia phragmites, vt sic vocem, quam nostri hætenus falsò pro rotunda habuerunt, purpurea & alba, floret Martio & Aprilis principio. In fine Aprilis semen fert: siliquæ etiam virides factæ statim dehiscunt: semina nigroresplendent.

Aristolochia crematis, floret medio & fine Maij, & Iunio.

Aron, Iulio & Augusto semen fert, floret Martio.

Arthemisia, floret Iulio.

Arthemisia tenuifolia, vide *Mellefoliū*.

Arthritica communis syluestris, pallida floret Februario.

Arthritica pallida, quæ singulis pediculis singulos flores sustinet, Curia Retorum, incipit autem florere Decembri si tepor sit, & in Aprilem se extendit.

Arthritica die gfulst, floret Maio.

Arthritica præcipuè odorata, & tardius ea montana in rupibus, quam aliqui *Lunariam*, aut folium montanum vocant, floret Aprili, & species illa Curia missa, tota ferè hyeme floret.

Arthritica alpina lutea, odoratior est floribus, rubra folijs, Aprili floret.

DE COLLECTIONE

Arthritica alpina, gälc/rote/wyse in mō
tibus iuxta Thunum, floret Iunio.

Arthritica, schlüssel Blümly, sed pallida,
inodora, preuenit odoratam, Martio floret:
& locis tepidioribus etiam Februario emi-
cat. Montana saxatilis propter loci frigidita-
tem tardius floret.

Arthritica odorata

Montana, petrza, gäl/rot; in hortis
floret Aprili.

Pratensis

Hortensis, gfült/und yngfült

Arthritica inodora

Pallida

Cœrulea

Species est illa Curia missa, cui singuli
flores in singulis coliculis breuibus.
Omnes Martio florent.

Minor arthritica flore purpureo, sed
parum odorato, in horto meo, me-
dio & ad finem Martij floruit.

Arundo, floret Augusto.

Asarum, floret Februario. Aliquando
in fine Martij, vel etiam eius principio & me-
dio, itemq; Aprili. Alicubi Augusto. Circa fi-
nem Maij & Iunio semen fert.

Asclepias, quam vulgo hirundinariam
vocant, circa medium & finem Maij floret:
itemq;

itemque Iulio & Augusto.

Ascyron Fuchſij, hyperici ſeu perforata
ſpecies, maius eo, Iunij medio & Iulio.

Asparagus, floret Maio & Iulio.

Aspergula herba repens in terra ſuper
muris (ciuitatum præſertim) rubiæ cogna-
ta, folijs per genicula quaternis, ſuperius bi-
nis: plurimis ab vna radice coliculis, floſcu-
lorum albicantium corymbis, qui vt pluri-
mum foris puniceo vel roſeo colore ſunt,
floret Iunio & Iulio.

Asphodelus Germanis hætenus falſò cre-
dit⁹, goldgulgen. Ego omnino lilij genus fa-
cio, videtur autem lilium cynorrhodon di-
ctum Plinio. floret Iunio.

Asphodelus marinus in Vere ſatus, flo-
ruit in Autumno & ſemen perfecit in Vere
ſequente demum, in cella ſeruatus, ac rur-
ſus flores emiſit, partim eodem caule, par-
tim à radice media, medio Aprili.

Aſter Atticus Fuchſij, floret Auguſto &
Septembri.

Aſtrantia, floret Maio.

Aſtrantia, quam aliqui Laſer Germani-
cum vocant: Ego non hanc, ſed Anglicam
odoratam Laſer Gallicum aut Germani-
cum dixerim, floret Iunio.

Aſtrantia nigra in horto noſtro, floruit
Iunio.

DE COLLECTIONE

Astrantia nigra in monte Pilati, Augusto floret.

Astrantia vel imperatoria nigra, maior & minor, floret Iulio.

Attractylis vtraq;, Kardobenedicten Bergam vnd der wild/ Augusto florent.

Atriplices florent Iunio.

Atriplicis sylvestris species, Bonus Heinrichus, floret Iunio.

Atriplex sylvestris, floret Iulio in aruis & alibi: semen fert Octobri.

Avena, floret Iunio.

Auicularia, Syluij, vide Viola.

B

Bären rüben, *Spica celtica falsa*, floret in fine vel medio Iulij.

Ballote, in fine Iulij floret, & Iulij initio: Purpureo flore, in medio Iunij. *Ballote* floret etiam Septembri.

Ballote rarior, floret Augusto.

Balsaminæ pomifera herba, Augusto & Septembri floret simul & fructus profert.

Barba caprina quæ in syluis nascitur, floret Iunio: radice magna, lignosa, flore magno, muscoso, albo, odorato. Diuersum ab hoc genus locis humidis nascitur, Vlmaria quibusdâ dicta, nostris Ymbentraut, quod & Iulio floret.

Barba

Barba caprina, floret in fine Maij & Iun.
aliquando citius. Fructum facit Iunio.

Barba senis, vide Coronopodem, *Bebero*
març.

S. Barbaræ herba, quam Galli carpentariam vocant, crucæ vel nasturtio congener. Maio & Iunio floret. In hortis Maio mense ferè defloruerat etiam eius initio: & siliquas ostendit. Italis herba sancta.

Beinhülzen frutex, floret Maio: semen fert Iulio.

Bellis vrbana & syluestris, Galli Pasquetam vocant, quod tempore Paschatis floreat, floret Aprili. Syluestris maior & minor floret Nouem. itemq; Augusto.

Bellis maior, quam vulgò à tempore quo floret Diui Iohannis florem nominant, (vt etiam Androsæmon seu perforatam, quæ Iunij tempore florere incipit) floret Iunio circa 24. diem.

Bellis maior, floret Maio.

Bellis maior syluestris & hortensis, floret Iulio.

Bellis maior & minor, floret Septemb.

Bellis minor hortensis, floret Maio & Septembri.

Bellis hortensis, floret Augusto; & Decembris initio.

DE COLLECTIONE

Bellis minor, quæ cælo & regionibus tepidioribus hyeme etiam non deest, floret Martio, eadem hortensis alba, purpurea, Martio.

Bellis albus & ruber in hortis: itemq; sylvestris, floret Iunio.

Bellis semen fert Septemb. floret etiam nonnunquam Februario,

Betz duo genera, florent Iulio.

Betonica, floret Maio, Iunio & Iulio.

Betonica Pauli Turnero: quæ & Aprili floret & Maio: & fortè toto anno, si in loco aprico sit, flosculis parvis, subcæruleis, herba pulegio vel nummulariæ potius similis est, & similiter repit, (alijs puto, *Steinpoley* est illa betonica.) floret Martio.

Betonica Pauli pulegio similis, quam Turnerus describit. Similis est nummulariæ, sed flores exiguos albicantes ædit: seminum conceptacula, ut alysson vel bursa pastoris, floret Iulio.

Betonica altilis, floret Octob.

Betonicum altile, floret Septemb.

Betonicum altile, flores caryophylli vulgò dicti, *Steinnâgele/wilde grasnâgele/* florent Iulio. In cellis verò domuum vel canis etiam Decembri floret.

Betonica altilis, caryophyllus flos, medio Iunij

Iunij incipit, albus puto prior, wyß/root/
lybfarb/treußf.

Betonica foetida vocetur, herba foetida,
caule quadrangulo, cubitali, flore betonicæ;
pericarpis leniter aculeatis, vt & betonica,
folijs oblongis, angustioribus quàm beto-
nica, floret in fine Iunij.

Betonicæ species minor, Friesen engle/
root vñnd wyß / principio & medio Maij
florent.

Betonica Eginetæ Turnero, floret Apri-
li & principio Maij.

Betonicum montanum quoddam, flori-
bus multum dissectis, purpureis, in pratis
siccis montis Melam, floret Augusto.

Betonicum aliud montanum locis saxo-
sis vbi ferrum eruitur, innummeris ab vna
radice cauliculis, flosculis albis, radicibus
longis, subruis, floret Augusto.

Betula suis iulis floret in vere, qui simili-
ter vt alno ei non decidunt, donec autumno
semen perficiant: sunt enim illi loco semi-
nis, vt alno quoq.

Bistorta maior rugosioribus folijs, & mi-
nor lenibus, Maio & Iunio florent. Limo-
nium interpretor.

Blattaria Fuchsj, verbasco similis, aut po-
tius species verbasci, floret Iunio.

Cyrsson esse coniunctum, floret Iunio.

Buglossus Italica, floret Maio.

Bulbine, Blauw meyen rôgl., floret April.
li. Primùm minor, postea maior, quæ toto
anno viret. Bulbine maior, puto circa finem
Martij floret.

Bulbus syluestris, flore luteo, instar cala-
this, quæ Codiaminũ dixerim, floret Mart.

Bulbina minor, flores ostendit Martio,
sed aperit Aprili demum.

Bulbus ille Kyburgo, floret Martio.

Bupthalmus, siue cotula non fœtida, Iu-
lio & Augusto carpitur, & durat vsq; ad au-
tumni medium.

Bupthalm⁹ von Augspurg, floret Iun.

Bupthalmus ex Gallia missus, *richt wie*
die cotula nõ fœtida, vel vt bellis maior suo
flore, floret Iulio.

Bursa pastoris, floret Martio, Iunio, Iulio,
August. Septemb. Octob. Nouemb.

Buxus, semen fert Septembri, floret Fe-
bruariq.

C

Cacalia lutea, vnser frauen schûle, flo-
ret in Maio.

Calamunthæ genera tria Fuchsio: sed
quam ille tertium genus Calamintha facit,

DE COLLECTIONE

ego conyzæ genus tertium dixerim, iudicet eruditi, florent Iulio.

Calamintha aruensis, sisymbrio cognata specie & odore, floret Augusto. Item aquatica similis aruensi, sed in summo etiam florens: floret Augusto.

Calamintha, incipit florere in fine Iunij.

Calamintha montana, floret Iulio: in collibus passim circa Badam, Augusto & Septembri.

Calathiana verna, Brendel blümle / Junckheres blüm / April. Blauw, in fine Aprilis: alias enim autumnales trium generum noui: floret Aprili.

Calathianæ, autumnales violæ cœruleæ, ex quarum genere Petilium florem Plinij dixeris, radicibus amarissimis, de genere gentianæ, floret Septemb.

Calceoli diuæ Mariæ, folijs ellebori, principio Maij florêt, & Aprili.

Calendula vel Caltha, floret Maio.

Calendula, floret Iunij medio, Septemb. Octob. Nouemb. Tota hyeme floret locis tepidioribus, & in domo condita.

Caltha siue Calendula, floret Iulio & Augusto.

Caltha palustris, maaßblümen: mas ranaulis rubentioribus, flore magis tincto: femina mi-

na minor, albioribus, flore luteo minus tin-
cto, floret Aprilis medio.

Campanula siue vuularia, halß Fraut, Iu-
lio & Augusto floret.

Campanula cœrulea, jäpfle fraut/ vide
Vuularia.:

Cannabis, floret Iulio.

Cantabrica quorundam (sed non est, cum
radicem habeat inutilem) caule vno, iun-
ceo, cubitali: folijs vt polemonium ferè al-
bicantibus: calycibus elegantibus, pentago-
nis, calathi forma, è quibus flos quinq; fo-
liorum roseus prodit. Sponte in aruis nasci-
tur, & floret Iunio. Lychnis quorundam.
Cartheüser Blümle.

Capsicum siue Cardamomum Arabicum
(non placet) Indianischer pfäffer/ rooter
vnd Brauner Calecutischer pfäffer/ cuius a-
liquot differentias, ex figura siliquorum Fu-
chsius describit: quidam hanc herbam sili-
quastrum nominant. Atqui capsicum con-
stat herbam non ita pridem ex nouis regio-
nibus aduectam esse: siliquastrum verò Pli-
nij tempore in vsu fuisse, de qua ille lib. 19.
cap. 12. sic prodidit. Panax piperis saporem
reddit, magis etiam siliquastrum, ob id pipe-
ritidis nomine accepto. Et mox: Libanotis
seritur semine, &c. eadem & siliquaastro satio

DE COLLECTIONE

(Tarchon non feritur semine, sed propagatur) nec alibi aliud quicquam apud veteres (quod sciam) de siliquaastro traditur, & quamquam à siliquis nomen habere videatur, non tamen est necesse, quoniam id veterum nemo scripsit. Potuit enim aliunde hæc vox detorqueri, vt fortè à Salicaastro, quæ omnino clematis altera est (vt nos obseruauimus) amplexi caulis planta, & vrens, piperis scilicet sapore etiam ipsa. Ruellius costum hortensem vulgò dictam siliquastrum facit, quæ & ipsa siliquas non fert. Sed hæc amariuscula, & quanquam acrimonia non careat, pipere tamen longè inferior est. Itaque quoniam tam angustis descriptionibus adhibendæ sunt coniecturæ, Siliquastrum esse dixerim herbam. Tarchon (Tarch) Arabibus & Symeoni Sethi vocata: quæ duorum generum est, vna syluestris, pyretro recentioreū quidam adnumerat, altera hortensis. Vidi enim in Sabaudia in hortis & piperitum vocari, ad cōdimenta laudatam, aiebant autem semine feri: aliqui draconem acetarium vocant. Vetus quidem nomen aptum, nemo adhuc imposuit.

Capficum, cardamomum Arabicum, floret Augusto.

Caput monachi, halicacabus puto Fuchsij, floret Iulio.

Carda-

Cardamomum Arabicum, vulgò piper rubrum, floret Septemb. In nostris hortis florere ante hyemem (Octobri) non desinit, fructus interim maturans. In fine Septemb. vel Octobri potius fructum edit.

Cardiaca, quam Lupi pedem Ruellius vocat, lycopodem: floribus hirsutis, mediocriter amara, floret Iulio & Iunio.

Carlina noctu se claudit, ad Solem aperit: in horto meo floruit Iulio.

Caros, vulgò Carui, *fūmich*, floret Aprili, & Iunio. *Carus albus* & *purpureus*, *wyffer vnd roter fūmich* / floret Maio.

Carduus asininus communis, floret Augusto. Et alius quidam procerus in sylvis angustioribus folijs.

Carduus asininus, in nullo medicinæ usu, floret Septemb. & Nouemb. fert semen Octob. & Nouemb.

Carduus aruensis maior purpureo flore (qui flore nondum nato moschum olebat,) floret Iulio.

Carduus aruensis, *Baberdistel* / floret Iunio.

Carduus benedictus, de genere *Cnici agrestis*, sed apud nos & cæteris mihi cognitis regionibus satius tantum, floret Iulio & Septembri.

DE COLLECTIONE

Cardui genus maculis albis, quod à pleuride vulgò cognominatur, floret Iunio.

Carduus palustris, id est, humidis pratis nascens, flore purpureo, &c. nitt basen fòl. floret medio Iunij.

Caryophyllata floret Iunio: fert semen Iulio.

Caryophyllata vrbana & syluestris, floret Maio.

Caryophyllata syluestris illa, quam aliqui Lychnidem putauerunt, locis saxosis, & apricis, floret Iulio.

Caryophyllatæ syluestris genus, mütwillen, flore valdè dissecto, floret Maio & Augusto: dicta mütwill, à laceris & dissectis vestibus, quas referunt flores variè diuisi.

Caryophyllata aquatica, floret medio Aprili.

Caryophyllus Indicus vel Portugallia minor, floret principio & medio Iulij. Caryophylli Indici domi inclusi, vsq; ad natalem Domini florent.

Castanea iulis, floret vere: maturescunt verò Septembri.

Caucalidis species puto, multis caulibus, folijs paruis, dissectis vt in Dauco hortensi, tota læuis, radice vt apij, alba, subamara, umbellis albis, Caro similis est specie & radice, eiusq; sapore, floret Maio. Cen-

Centaurij maioris species minor & degener, in campis, flore puniceo, calyce squalido, & squammatim compacto vt cyanus: folijs indiuisis minor, in pratis, heuwbliumen: diuisis folijs maior, calyce magnitudine auellaneæ, in collibus, florent Iulio. Vide Rha ponticum.

Centaurium minus, flore rubro: & quod rarius est, albo, floret Augusto.

Centaurium minus, circa finem Iunij floret. Item *Feine rha pontische* principio & medio Iunij.

Centimorbia, nummularia *Fuchsis*, nater *Frant/pfenningfrant/* fortè *Echios* altera *Plinij*, pulegio similis, floret Iulio.

Cepe, floret Iunij medio & Iulio.

Cerasus omnis, floret Aprili.

Cerasa duracina, *Knellfrieße*, quoddam crepēt sub dentibus edentium, minora cæteris, sicca, cum puncto eminente in summo: Dulcia etiam in alpbibus, maturescunt Aug.

Cerasa dulcia diuersorum generum maturam habem⁹ Iunio & Iulio: acida verò tūm rubentia dilutiōra, amarella vocant nostri, tūm nigricantia solidiora, quæ visula dicūt, Iulio. Sed omnium postrema maturescunt.

Cerifolium, *chærephyllon* *Knellfrieße*, floret medio Aprilis & fine, itemq; Maio.

DE COLLECTIONE

Chamæbuxus, vt nos vocamus: suffrutex multis à radice cauliculis pedilibus per terram stratis, folijs buxi, floribus vt viciarum dulcibus, sed colore partim ex albo, partim flauo. Nascitur collibus apricis & siccis, floret Aprili.

Chamæcyparissus, floret Maio.

Chamæcyparissus, *Cyprieffenfrant*/quam aliqui abrotonū fœminam putant: ego verò aliam abrotonum fœminā noui, floret Iulio.

Chamæcyparissus, flosculis, qui se in ambitu capituli aperiunt, veluti galion habet, colore & figura, floret Iunio.

Chamædrys vera, floret Iunio & Iulio.

Chamædrys fœmina Fuchsj, cuius apud veteres quod sciam, nulla mentio, floret Iul.

Chamædryi similis herba, quā aliqui Teucrium putant, flore cœruleo, duorum generum, floret Maio.

Chamædryi similis folio, alpina herba, semine lanuginoso, semen facit Augusto.

Chamæleontis genus, quod nostri vulgò radicem apri vocitant, floret in horto meo Iulij medio.

Chamæleuce Ruellij (quam vulgò moesblumen / id est, florem palustrem dicunt) hortensis, cui folia florum multiplicia, floret Aprili.

Chamæma-

Chamæmalum, floret Iunio, Iulio & Augusto. Floret autem bis in anno, vere inter segetes, & autumnò in agris rapitijs, Septembri.

Chamæmalum nobile repens, floret in fine Iunij.

Chamæpithys, floret Iunio.

Chamæpithys in horto meo, stirps anni superioris, floret Maio & Iulio.

Chamæsyce in aruis, floret Augusto & Iulio.

Chamæsyce, flosculo singulari minimo, vix apparente in hortulo nostro, floret Maio.

Chelidonium minus, floret Aprili: & maius quoq; tempore calidiore.

Chelidonium maius, floret Iunio & Augusto, itemq; Maio.

Chelidonium minus locis apricis, floret medio Ianuar. & Feb.

Chondrilla, floret medio Maij, Iunio & Augusto.

Chondrilla minor propè Curiam, floret Iulio.

Christophoriana, cost' niger, floret Maio.

Christophoriana acinos nigros profert, cum calidius est ver, floret principio Aprilis.

DE COLLECTIONE

Chrysanthemum Fuchsi, ranunculo simile, floret Maio & Iunio.

Chrysanthemum verum, vnum magis flavum, alterum minus, floret Iunio.

Cicer, floret Iulio.

Cicer sylvestre floribus albis, radice polycari ferè, foris nigra, intus alba, dulci, cicerum sapore, grad wie käsen, floret Iulio.

Cichorium, vide Intubus.

Cichorium sativum in horto meo, Augusto floret.

Cichorium vel Sonchi genus, flavis floribus, in muris ferè nascens, folijs herbæ S. Barbaræ, lactescit id, nec abit in pappos, milofen, floret Octob.

Cichorium, cuius flos cæruleus, Iulio mense ferè defloruit: frequentius verò floret illud cui flos luteus, quod Chondrillam eruditi quidam vocant.

Cichorium sylvestre, floret Septembri, Nouembri.

Cichorium, id est, intybus sylvestris, maior & minor, floret Augusto.

Cici, floret Augusto.

Cicuta, floret Iunio, Iulio & Octobri. Et Maio etiam: & ea quam suspicabar Cicutam.

Cicuta aquatica, Bärzenfraut, floret Iulio.

Cicuta

Cicuta maior semine magno aspero, Septemb. semen habet.

Cicuta 8. Iunij incipiebat florere *Zur-zachi*: herba cinericei coloris, odore graui, hyoscyami ferè (lacte nullo) puniceantibus per caulem & ramos maculis.

Cicutæ similis minor in prato, seminibus oblongis, quæ in fine Maij apparent, geminis, non grato odore aut sapore, radice simplici, foris fusca, *cicutaria* minor appellatur, floret Maio.

Cicutariæ quædam calidæ inter vites duæ, florent Iunio.

Clematis Ægyptia, vulgò *Peruinca*, cærulea & punicea, floret April.

Clematidis Ægyptiæ genus, quod in hortis colitur, puniceis floribus, sed flores rari, vt & violæ hortensi nigræ, dasipodij, floret Octob.

Clematis Ægyptia in siliquis binis vel singulis, vt in hortensi obseruaui, fert semen Iulio.

Clematis purpurea, floret Maio.

Clinopodium, floret Augusto.

Climenum vtrunque *Scrofularia* alba & nigra, vt *Conyza collina*, floret Iunio.

Cnicus, vulgò *Cartamus*, floret Augusto.

DE COLLECTIONE

Codiaminum, codianon, floret in fine Februarij.

Colchicum, herbſt blümen, Septembri erumpunt.

Colchicum circa finem Auguſti floret, & prius etiam calidiori cœlo: & ſemen fert Iunio.

Colchici plantæ paucae, quæ alioquin autumnò tantum florere ſolent, anno 1563: cum Februarius tepidus eſſet, florebat.

Colytea Fuchſij, welſch linſen Baum/ floret Maio.

Conſiligo, leüß frauz/ floret Februario, Martio, Aprili, Iunio: Maio per paucos amplius flores oſtendit. Sed & Nouemb. & Decembris initio.

Conſolida regia minor & maior, floret Auguſto.

Conſolida media, Buglz, gunſelen/ floret Aprili.

Conſolida regalis vulgaris minor, wyß/ Blauw/ lybſarbw: & alia magna cœrulea tantum mihi viſa, floret Iul.

Conyza muralis, ſic enim vocare libet, quod in muris circa patriæ noſtræ mœnia naſcatur: herba acris, fruticoſa quodammodo, folijs per caulem digeſtis ſine petiolo, ad duos digitos longis, ſimplicibus, anguſtis,

gustis, caule cubitali, striato, fungoso, floribus per summos ramulos in ambitu subcæruleis, foliolis minutis, cum pappis in medio, qui mox ab initio apparent, radice alba cum paucis fibris, flor. Julio.

Conyza palustris quædam floret Julio.

Conyza aquatica flore calendulæ, floret Augusto.

Conyza aquaticæ species indora, insipida, folijs oblongis, serratis, lanuginosis, floret Junio.

Conyza species, ut videtur, quam Lani floram dixerim, floret Nouemb.

Conyza genus flore luteo, latiore, minus cæteris, odoratum, floret Octob.

Conyza utraq; Dürrenburg Trago, floret Augusto.

Conyza species in aridis nascens in horto meo: item aquatica longis & serratis folijs, flor. Jun.

Conyza species alia, caule cubitali, singulari (puto) à quo singula folia tres aut quatuor digitos longa, angusta, alternis per caulem sine petiolis prodeunt, flos in summo luteus totus ut *Chrysanthemis*, radiculis minutis, rufis, acribus ut in ptarmice no-

DE COLLECTIONE

stra, nascitur collibus apricis: floret Iunio.
Vide vtrum Dürrwurtz esse possit.

Conyza alia, quam in horto habeo, in colle nascens, floret Iunio.

Conyza alpina in horto meo, flor. Mai.

Conyza montana, 6dny / floret Augu.

Conyze genus tertium, vide Calamintha.

Conyzoides quædam in collibus siccis puto, in hortis viuax, flore calendulæ, floret Augusto.

Conyzoides cœrulea, dételiariam puto aliqui vocant, flos subcœruleus, mox ab initio pappos ostendit: calida, acris & sicca herba, in muris ciuitatis: & in quibusdam syluis in montis Tigurini superiore ad dextram parte, floret Aug.

Conuoluulus maior, semen fert Septembri.

Conuoluulus maior, cui flos totus albus, & minor alternis purpureis & albis in flore partibus: qui & helxine cissampelos vocatur, & a sine vel iasione Theophrasto, vt nos obseruauimus, floret Iulio. Nascitur propè aquas, sed fluentes ferè, vt solanum perpetuum circa stantes.

Conuoluulus maior, itemq; minor, quæ & Cissampelos, floret Augusto.

Con-

Conuoluulus minor (helxine *Cissampelos*) sine lacte, vel potius paucissimo in venis foliorum: nam maior lac habet: & sepiarius rarior adhuc, floret Iunio.

Conuoluulus peregrinus, hirsutus, flore cœruleo, lactis nihil habet, saporem betæ vel cyclamini, floret August. Granum nil vocant in horto.

Conuoluulus aruensis & sepiarius, floret in fine Maij.

Conuoluulo similis præter quam flore, quam Galli tineam vocant, Germani *spyn/oder schwarz winden*, Ruellius & Tragus *Orobanchen* esse suspicantur, sed nos aliam *orobanchen* nouimus, floret Iulio, & Augusto, fert semen Octob.

Corchorus ille, genus apij degeneris & vitiosi, floret Iunio.

Coriandrum, semen fert in fine Iulij.

Cornus interdum Februario floret, frequentius Martio tantum.

Cornus fœmina, virga sanguinea, capris grata, vnde nomen apud Gallos, floret Maio.

Cornus medio & fine Augusti, itemq; Octobri fructum fert.

Coronopus, cornu cerui vulgò, floret Iunio.

DE COLLECTIONE

Coronopus quidam flore cœruleo, calyce ceu squammis, multis tenuissimis, aridis, floret Iulio.

Coryli ante folia ædunt flores rubros croci staminibus brevissimis similes: nam iuli, quos nonnulli flores putant, colore luteo sunt, flor. Feb. & Martio suis iulis.

Corylus sativa, cui nux oblongior, fructum fert Augusto: sylvestris nuces fert Septembri.

Costus hortensis minor, floret in fine Iunij.

Costus hortensis, floret Septembri & Octob. Semen habet Nouemb.

Costo hortensi cognata, herba Iulia dicta, Septemb. floret.

Costi hortensis genus minus, quod aliqui herbam B. Mariæ vocant, in hortis nostris satum, floret Augusto.

Cotula foetida, Parthenium Brassauolæ & Fuchsio, floret Maio, & Iunio.

Crocus Vergiliarum occasu floret, id est Septembri, neque ultra mensis spatium flores durât, qui postquam deciderint, mox folia prodeunt, virentq; tota hyeme.

Crocus montanus, in fine Februarij floret: aliquando medio.

Crocus montanus in partis circa Curiam

riam copiosè, cœruleus, candidus, & ex utroque mixtus, principio Martij, in horto meo Martij medio. Vnus tantum ex plurimis bulbis mihi floruit.

Cruciata folijs per genicula quaternis, herbula hirsuta, flosculis luteis, florere incipit Aprili.

Cruciata rubia congener, floret Maio.

Cruciata Gallio cognata, floret Maio.

Crucis flores, dicti à Festo, quod crucis hebdomadam vocant, albi, cœrulei, purpurei, medicis in nullo vsu, floret Aprili.

Cuculi flos, mûtrillen/ floret Maio.

Cucumeres, florent Iulio.

Cucumis anguinus, floret in fine Iunij.

Cucumis anguinus in hortis nostris, floret Iulio, vel ex superiore anno, si planta hyeme seruata fuerit in cella vinaria: vel quod nobis rarum est, ex planta eiusdem anni, vere sata.

Cucumis erraticus, quem aliqui asininum cognominant, floret Augusto, & mihi relictus ab anno priore, medio Maij floruit.

Cucurbitarum genera, florent Iulio, Augusto, & Septembri: maturescunt Septemb. & Octob.

Cumini sylvestris genus, quod vulgè

DE COLLECTIONE

consolidam regalem vocant, Ritterspödy,
floret Iunio, Iulio & Augusto.

Cyanus, fo: nblumen, floret Iunio.

Cyanus albus, cœruleus, puniceus, flo-
ret in fine Maij, & Iulio.

Cyanus montanus, floret in fine Apri-
lis, & Maio, in Iunio ferè defloruit.

Cyanus in aruis & hortis, floret Maio.

Cyclaminus, floret principio & medio
Augusti, & Septemb.

Cyclaminus, ex floribus autumnalibus
semen fert Aprili.

Cyclaminus prima in hortulo nostro,
floret Iulio.

Cyclamen puto tardissimè suum semē
maturat, quod super terram iacet, nescio an
in fine Iulij adhuc maturuerit, cum florem
Aprili amiserit, aut Martio fortè.

Cynoglossus minor, flosculis cœruleis,
wie vergiß min nitt, propè Curiam Rheto-
rum, floret Decemb. initio.

Cynoglossus puniceo flore, floret in fi-
ne & medio Maij.

Cynoglossus, floret Iunio.

Cynocrambe Fuchsj: Est autem genus
Mercurialis sylvestris, floret Martio & Apr.

Cyperus, floret Iulio. In horto meo Au-
gusti principio & medio.

Cytisus

Cytisus suffrutex ligno duro in colle
prope Schaphusiâ floribus luteis, wie tran-
ben fröpple/floret Iulio,

D

Daphnoides Fuchſij, Thymeleæ potius
species, 3yland/floret Aprili.

Cassutha, id est cuscuta, floret Iunio.

Daucorum & Apiorum genera confi-
nia videntur: sed fortè apiorum genera um-
bellas nudas habent, daucorum vero foliola
subnexa eis in orbem radiata. Ité illa fortè
diuturniora sunt, hæc ubi semen tulerint, in-
tereunt. Iulio ferè florent,

Dauci umbellis albis sunt, aliqui etiam
roseis puto.

Daucus palustris in horto meo, floret
in fine Iulij.

Dauci genus paruum asperiusculum,
quod circa sepes & muros nascitur inutile,
floret Iul. semen facit Augusto.

Daucus sepiarius floret Iunio.

Dauci genera tria, & inter alia, vnum ge-
nus cuius femina hirsutiora sunt & multò
maiora, quam in alijs generibus, flores ex-
tremi in umbella medijs latiores, locis cul-
tis nascitur, floret Iunio.

K

DE COLLECTIONE

Dauci inutilis genus in aruis, folijs cori
andri, glyssen/ semen facit August.

Dauci genus in fossa ranarum, in cuius
ymbella media nihil purpurei, flor. August.
Vide Pastinaca syl.

Dauci genus aruense, magnis, latis &
hirsutis seminibus: floriflus latioribus in ym
bellæ ambitu, flor. Aug.

Dauci syluestris species folijs non hirsu
tis in prato, flor. Iul.

Daucus quidam syluestris, flor. Apr.

Daucus creticus vel alpinus, *βάρμυρξ*,
Meon vt aliqui conijciunt, alijs tordilion:
nec multum interest, quando vires (ni fal
lor) eædem ferè omnium, flor. Iul.

Daucus syluestris maior, (quæ Matthio
lus pastinacam syluestre appellare mauult)
macula in medio ymbellæ plerunque alba,
aliquando purpurea, in collibus apricis. I
tem minor inter segetes & alibi, florent
Iulio.

Dentelaria quam aliqui Irionem vocat,
flor. Iun.

Dentelaria *σινιστική*, humilis herba, à
Textore medico missa, flor. Iul.

Dentelaria *κορυμβοειδής* petræa, Vide cony
za muralis.

Dictamnus vulgo dicta, flor. Maio.

Digitalia

Digitalis Fuchſij, incipit Maij medio florere vel in fine, itemq; Iunio.

Digitalis duplex, flore minore, albidior: & alia, flore maiore, pallidior & intus varius, florent Iun.

Digitalis minore flore, vulgaris, albicans & maiore flore, tum aliâs luteo, tum purpureo circa Coloniâ, folio minus lævis, florent Iunio.

Digitalis lutea & purpurea, florent in principio Iulij: & albicans in montibus.

Digitalis vtrâq;, ſemen fert Auguſt.

Dipſacus albus & purpureus, flor. Iun.

Dipſacus floret Iulio. Et ſimilis ei herba carduo exiguo, echinato, rotundo.

Dipſacus flor. Septemb.

Dipſacus minor, floret Auguſto: & ſemen fert Nouemb.

Doronicum in alpibus, flor. Aug.

Doronicum vulgò dictum, in horto noſtro, circa Aprilis finem, in montibus: propter niues tardius, *gemenwurtz/graſſoy*/ floret Maio, & Octob.

Dorycnium quorundam, floret particulatim Aug.

Dorycnium Monſpelij putatum, ſculis albis per ſummos ramulos, veluti in orbem diſpoſitis: figura quæ piſorum vel

DE COLLECTIONE

loti, sed paruis, floret Septembri.

Doricnium quibusdam falsò dictum, toto Iulio floret.

Draco hortensis, medio Iulio & fine. Item aquaticus, Iulio medio floret serratis folijs.

Dulcis radix, Iunij fine floruit mihi in horto.

E

Ebulus floret in fine Iunij, medio & fine Iulij: baccas fert Augusto.

Echion floret toto Iunio, itemque Septemb. Fert quoque Septemb, semen.

Echion verum, quod Fuchsius triplex facit, floret Iulio.

Echinopus meus, crocodilium quorundam, floret Iulio.

Echinopus carduus, in cuius capitibus flores nulli ferè apparent, sed aculei albicantes vndiquaque in diuersum tanquam in echinis rigent, folia puto scissa, angusta, & albicantia, anno 57. defloruerat omnino Aug.

Elleborus albus, floret Aprili: niger quoque eiusdem principio.

Elleborus albus circa lacum nostrum ultra Albium montem, floret Iulio.

Elleborus albus, itemque niger, flor. Apr. initio.

initio. Mas maior & durior : & fœmina maior, & mollior, ex locis ad Larium habui.

Elleborus Agyrtarum , folijs abrotoni ferè, flor. Apr. & Mart.

Elleborus niger, locis tepidioribus, circa natalem Domini , vnde nomen ei apud nos Frist wurtz/floret Decemb.

Elleborus niger noster & ex Italia allatus, flor. Febr.

Elleborus niger, Martio.

Eiusdem genus à Trago exhibitum (Anemones species potius) folijs nigellæ, flore ranunculi, magno, luteo, ad solem se conuertente, quo defluente semen etiam vt in ranúculis subnascitur, Aprili mense, &c. flor Mart. fine erumpit.

Elleborus niger noster mas, floret Mar. & fœmina, quam ex Italia habui, non tamen purpureus.

Elzenbaum/floret in fine April.

Elzèbère ad ripam Silæ, acinis nigris, magnitudine piperis, osse duro, singulari intuitus, &c. fert fructum medio Iulij.

Enneadynamis Polonorum, läberblümle/in fine Iul. flor. & Septemb.

Erica vel Solago, heid/floret Augusto & Septemb.

Eruca vera, floret Iunio, Iulio & Augst.

DE COLLECTIONE

Eruca hortensis, floret Maio.

Eruca sylvestris, flor. Iun.

Eruca sylvestris nostra, flor. Maio.

Eruca sylvestris non foetida, tenera, floret Iulio.

Eruca sylvestris foetida, florebat Maio, pallidis, tanquam in spica, flosculis.

Eruca sylvestris Fuchsi, quam sinapi album sylvestre interpretatur, flor. Maio. Itē *eruca sylvestris nostra*.

Eruum sylvestre minus (nam maius in monte Albio reperi) folijs binis, longiusculis cum capreolo per medium: floribus in corymbo pulchris, luteis, loti genus, quod ab *ingluvie columbina* denominamus, referentibus, flor. Iul.

Eruum Fuchsi, flor. Iul.

Eryca montana Glarona allata, floret ut aiunt rupibus adnata, toto anno, (siue reuera, siue quod flores etiam siccati fortè colorem retineant) aliàs Feb. & Martio.

Eryngij id est cardui cuiusdam odorati species, *raddistel/mansthrüw*/ flor. Maio.

Eryngium marinum in horto Argentinensi, ad finem Iul. flor.

Eryngium alpinum caeruleum, *edler Distel*/ flor. Aug.

Erysimon Fuchsi, quod interpretatur sinapi sylvestre, flor. Iun. Erysi-

Erysimon hortense, cruca nobilis vel
vel minor, flor. Iun. Iul. & August.

Erysimon, aliquando Maio incipit flor.

Erysimi sylvestris species, vide in Ver-
bena.

Erysimon hortense, parcè florebat O-
ctobri.

Esula tria genera, flor. Iul.

Esula, pityusa, flor. Apr.

Esula (pityusa Dioscorid.) sed infre-
quens, flor. Aug.

Esula dulcis, Congener Militari Plinij,
florete Aprili.

Esula rotunda, peplos, flor. Iul.

Esula, flor. Maio.

Esulam scabiosam nunquam florere pu-
to: & fortè seminis loco ei sunt asperitates il-
læ in folijs supinis, vt filici, polypodio &
alijs.

Euphrasia, eugentrost/ flor. Iul. & Aug.

Eupatorium, Augusto florete sed rarius,
ferè enim iam defloruit.

Eupatorium Græcorum, agrimonia,
florete Iulio.

Eupatorium Auicennæ vt aliqui pu-
tant, quod iuxta aquas nascitur, manifestè
floribus ferè origani communis, Iulio, &
Augusto.

BE COLLECTIONE

Eupatorium Mesue secundum quosdam, costo hortensi cognatum, flor. Aug. Eupatorium aquaticum, manserafft.

Eupatorium aquaticum. Vide in Iulio.

F

Faba, floret Maio & Iunio.

Fagus suis iulis circa diem D. Georgij, in Aprili.

Fagus, fert glandes Septemb.

Fagus sepium apud nos dicta, *hagene bünd*/cuius lignum durissimum, fructum Septemb. fert.

Ficus principio & medio Septébri mihi in horto maturuerunt, licet loco umbroso plantata.

Ficus, in Italia fructum fert Augusto.

Filipendula, floret Maio: principio Iulij ferè defloruerat.

Filius ante patrem maior & maximus, qui rododaphne cognatus videtur; hîc iam in Augusto ferè defloruit, & canos in filiis hiantibus ostendit.

Filius ante patrem maior & minor: *vnnnd das feur fraut*/ id est maximus, floret Iulio. Species vna mollibus & lanuginosis folijs *am Farzen see*/floret Iunio.

Filij

Filij ante patrem species maior ad aquas,
floreť Iunio.

Filius ante patrem minor, in muris ciui-
tatis, floreť Iunio. Et tertia species sylueſtris
maxima, rhododaphne folijs, floreť Iunio.

Filius ante patrem maximus, rhododaph-
ne cognatus fortè, ſemen fert Auguſto.

Filix in nocte, quæ diem D. Ioannis ſa-
crum præcedit, vide Tragum, quo tempore
ſemen faciat.

Filices effodiuntur vergiliarum occaſu.

Flos Iouis, incipit florere Maij medio: flo-
ret etiam Iulio.

Flos Iouis purpureus & albus, florent Iu-
nio Auguſtoque. Die hirmel blümle, Sep-
tembri.

Flos Portugallicus vel Indicus minor, flo-
ret Iunio & Iulio.

Flübirle/propè Curiám, florebat Decem-
bri 63. anno, & fructus naſci incipientes ha-
bebāt.

Fœniculum floreť Iunio, Iulio, Auguſto,
Septembri & Octobri; ſemen habet Sep-
tembri.

Fœnogræcum floreť Iulio.

Fragaria floreť Aprili & Iulio; ſemen fert
Iunio,

Fragaria vere, & tota æſtate, floreť in-

DE COLLECTIONE

quam maximam autumnii partem.

Fragaria minor sterilis ad sepes apricas (mas) quaternis folijs florum inter se discretis, principio Martij aut prius floret.

Fragaria sterilis, hirsutior, minor, marem dixeris, Feb. floret.

Fraga in altis montibus, Augusto semen ferunt.

Fraga rubra, alba, principio Iulij habentur.

Fraga in fine Maij florent: quædam in medio, pauca. Fructus *fragariæ*, æstatis initio, ante cerasa, & aliquandiu cum cerasis inveniuntur, montanis quidem locis, & frigidis, tardius quàm contrarijs. Alba Maio & Iunio florent.

Fraxinella, vide *Dictamnus*.

Fraxinus aucuparia, floret in fine Maij.

Fraxinus, fructum fert Septemb. supra Tigurum ad 4. milliaria copiosè in montibus: apud nos non fert fructum. *Bey Walslistatt*: fructum fert Octob.

Frumentum Turcicum, floret Iulio.

Frumentum Turcicum Fuchsj, quadruplex, granis rufis, purpureis, luteis, subcandidis, florent Augusto.

Fumaria, sed rarissima, floret Febr. aliàs Maio, Iunio, Iulio, aliquando & Nouemb.

Fungo.

Fungorum genus præcipuum, & cibo gratissimum gignitur verno tempore, ab Aprilis mense, usque ad Maii principia, hoc Germani vocant *Moschlen* (suillos) pileoli instar, foraminulentum foris, hinc dictum pro uerbium, *Su nimmest zu wie die Moschlen im Meyen*,

Fungi vulgares, qui vulgò coqui solent, *Heiderling* dicti, Iunio mense primùm cernuntur, & ab eo tempore ad Augustum usque mensem, pileolis rotundis, & latis similes.

Fungi genus magnum, quod à figura vocant *hasenrötle*, cinerei ferè coloris, Augusto mense reperitur in syluis propè radices quercuum.

Fungi etiam esculenti vulgò *Rödling* dicti, frutetis & arbustis cæsis, exustisque, & terra frequentibus pluuijs humectata nascuntur per sylvas, Augusto mense.

G

Galiopsis secundum aliquos, *Braunwurz*. floret Iulio & Augusto.

Gallion, *Gälber augentrost*, floret Iunio & Iulio.

Genista maior, floret Maio, aliquando autumno.

Genista minor non spinosa, circa Pente-

DE COLLECTIONE

costen floret, mense Iunio, vt plurimum, inde nomen apud nos, Pfingstblumen/ serbblumen: Flos tinctorius Fuchsj, Iunio & Iulio floret. Spinosa & foliosa citius floret.

Genistella, genista minor spinosa, Maio, sed copiosius Iunio circa Pentecosten, Stehend pfrimmen.

Genistella aculeata, & altera caule foliato, semen facit Augusto.

Gentiana floret Iunio.

Gentianæ species, madelgâr dicta vulgò, floret in fine Iunij.

Gentianæ species quam cruciatam aliqui vocant, madelgâr, ab incisione radicis cruciformi, floret Iulio.

Gentiana cruciata, à dissecta crucis instar radice, semina minima, subrussa, subrotunda, cum gentiana magna lata habeat semina, profert Aug.

Gentiana minor in alpibus, floribus magnis puniceis, caule cubitali, radice pollicis vel duorum crassitudine, amariore quàm gentianæ maioris, wachst höher vnd wilder/ floret Augusto. Item die groß Bitterwurz in alpibus. Item Gentiana palustris florent Augusti medio & fine.

Gentiana pumilla, flosculo cœruleo instar calathi, in pratis humidis, radiculis albis, rara,

bis, rara, floret Octobri.

Geranium primum, Storckenschnabel, floret Aprili.

Geranij genus secundum, folio maluacio tertium & quartum, quæ vulgò dicuntur Taubenfuß, Rüpfedtrant/ Aranetohals Fuchse, floret Maio.

Geranij genus, quod gratiam Dei vocât. floret Iunio. Et eiusdem genus montanum, quod radicem sanguinis appellant.

Geranium maius seu montanum, floret in fine Aprilis.

Geranij, vel sideritidis species, quæ vulgò gratia Dei dicitur, floret Augusto.

Geranij species, apij ferè folijs, floret Decemb. princ.

Geranium montanum, Blutwurz, medio & fine Maij floret.

Gerontopogon vel herba illa quam aliqui Tragopogona vocant, habermarck, luteo flore, & alia species puniceo, ex Italia, Girasole, vel barba de becco, floret Maio.

Geum, benedicta, caryophyllata, floret Augusto. vide Caryophyllata.

Gladiolus seu Xiphium, floret Iunio.

Gladiolus aquaticus, Maio floret.

Glycyrriza, dulcis radix, floret Iulio, & semina fert Septembri.

DE COLLECTIONE

Gnaphalij genus, sed mollius, *Βασίλινος* etc, cuius flores non decidunt, candidi rosei, subpurpurei, floret April.

Gnaphalion, *Kürfraut* / floret Iulio.

Martenflaße / cuius flores non obseruui, & nescio an villos habeat, pappi eius instar lanæ xylinæ dependent, fert fructū Iun.

Graminis genera diuersa, florent Maio.

Gramen Fuchsi, floret Maio.

Graminis genus radice geniculata, denticulata, culmo cubitali, flosculis albis, p. spica puto ceu folijs floret Iulio.

Gramen collinum, panicula vel spica florum pallida, dodrantali coliculo, *ευροχία* est foliorum, per transversum, radiculae albæ; floret Maio. Vide an Schoenantho cognata herba?

Gramen vulnerariū, floret in fine April.

Gramen in arenosis & muris minus plerisque in genere graminis, radicibus denticulatis (sunt autem dentes initia germinum) & articulatis reptat, floret Iun.

Gramen quoddam duriusculum, floribus sublauiis, Martio.

Graminis vel auenæ sylvestris genus, radicibus nodosis vt in xiphio, sed pluribus interdum nodis, in fine Iun. fructum vt auena ostendit. Radicum sapor puto nitrosus.

Grami-

Graminis genera varia fructum faciunt
Iunio.

Granum nil, vide conuoluulus.

Granum Nil, cuius flores noctu se ape-
riunt, in meridie pereunt, floret Septemb.

Gratiola quam centaurium aquaticū di-
xeris. Hoc fortè est polemonium palustre
amarum, cuius meminit Hippocrates vete-
rinarius, in Hippiatricis Græcis ca. 32. inter
remedia hepatica, equo per nares infundi
iubens cum vino colatum. Sic autē inquit,
ἢ ὅ γινωσκὼ διαθήσασθαι διὰ τὰ πολυμήναι· ἐν τῷ ἐν ἡλίου τιμώμεναι, κα-
λαμίνθη ἰοικὸς, ποιότατα ἔστιν πικρὸν Hoc est, aut pole-
monium, quod in paludibus nascitur, & ca-
lamintham refert, amarū gustu, vino perco-
latum dato. (Incipit aliquando Maio flore-
re.) nisi de Hydropipere Ruellij sentiat,
quod & ipsum pro Eupatorio (Auicennæ)
à quibusdam accipitur: floret Iul. plerunq.

Gratiola minor, floret in fine Iunij. Sic vo-
co herbulam fruticosam, etsi subdulcem: se-
mel tantum mihi visam.

H

Hæsenföhl/ Floret Iulio.

Hedera terrestris vulgò dicta, gundelrüb
floret Martio, Aprili, & Maio.

DE COLLECTIONE

Heliotropium minus, folio ocimi, odore graui, floribus albis in se retortis *lanceolatis*. Semen quidam commendat ad quartanas puto, floret Iulio.

Heliotropij genus quoddam, vergiß *minut*, floret Iulio & Iunio.

Heliotropio congener, aut scorpioidi herba, flore cœruleo, in palustribus nascens vergiß *nit meiu*, floret Aprili.

Helxine, parietaria, floret Iulio & Octob.

Helxine in horto meo, floret Aug.

Helxine cissampelos, vide conuoluulus.

Helxine cissampelos, floret Aug.

Helxine semen fert Octob.

Hepatica terrestris, trinitas, circa initium Aprilis ferè defloruit, & post florem folia noua producit, hyemalibus amissis.

Hepatica terrestris vulgò dicta, Italis trinitas, guldin *lâberfrut* vel aurea, floret Martio, hæc per hyemem etiam florum calyces ostendit, & cùm primū calor inuitat, aperit.

Hepatica terrestris, semen fert Aprili.

Heptaphyllon, Tormentilla, principio Iunij floret.

Herba Iulia, vel S. Mariæ, vt aliqui vocât, costo hortensi congener, floret Octob.

Herba Iudaica, floret Iulio. Cognata ei quædam ex loco vmbroso, vsq̃ dem *hard* in horto

horto meo, caule quadrangulo, graui odore, floribus purpureis, tanquam vrticæ mortuæ, dilutioribus.

Herba nascens in aruis, similis ferè folijs herbæ Iudaicæ (vide ne sit illa ipsa: videtur sanè) vel tetrahit dictæ, dodrantalis, graui odore, floribus albis vna, altera purpureis, semine nigro, quaternio vt in vrticæ mortuæ speciebus, flores & semina Augusto mense profert.

Herba S. Antonij, Augusto semen fert.

Herba Trinitatis cœrulea sex plerunque folijs florum, alba, id est, albo flore, folijs nouem, vt in meo hortulo apparet: audio etiā purpuream inueniri, floret Martio.

Herniaria de anno superiore, floret Iul.

Herniaria, floret medio August.

Heydenhysop, floret Iulio.

Hieracium vtrunq;, floret Aug.

Hieracij genus in pratis, floret Iunij fine & Iulio, herba pauci succi, folijs molli lanugine, &c. & in muris ciuitatum.

Hieracium pratense asperum, quod & in muris ciuitatis, floret Iulio.

Hieracium syluestre in pratis, herba aspera lanuginis, caule striato, folijs tres aut quatuor digitos longis, integris ferè ambitu modicè angulosis: horum quæ inferiora versus

DE COLLECTIONE

radicem sunt, initium habent angustius, & in latius abeunt: superiora verò contrà è latioribus contrahuntur. Caulis simplex, flos luteus, floret Aug.

Hieracium minus, vulgò dens leonis, floret Aprili.

Hieracium minus, sed rarius. Item procerum in pratis, floret Maio.

Hieracium minimum, calyculo nigrante, floret Septemb.

Hieracium quoddam radice satis magna, sed folijs quàm in còmunì minoribus, Martio floret.

Hieraciũ alterũ, Ròzlefraut, floret Octob. & semen profert Octob.

Hipposellinum, olusatrum, floret Iul.

Hippuris vtraq;, floret Iulio.

Hippuris lacustris quædam, folijs mansu-
arenosis, in fine Iulij floret, vt puto.

Hirci barba, herba dulcis lactaria, habere
marcẽt, alia quàm Tragopogon veterum,
floret Iunio.

Hirundinaria, vide Asclepias.

Hordeum Iun. fine fructum fert.

Hordeũ meritur alibi Agu. alibi citius.

Hyacinthi siue bulbi sylvestris, floribus
cœruleis genera quatuor, florent Martio.

Hydropiper, persicaria acris, semen fert
Aug. Hydro-

Hydropiper, id est, persicaria sine maculis, floret Aug. & subinde semen profert.

Hyoscyamus tota æstate, sed præcipuè Iulio floret.

Hyoscyamus vulgaris, floret medio & fine Maij.

Hyoscyamus communis & Syriacus, floret Iunio.

Hyoscyamus è sylua semine luteo, floret Iul. medio.

Hyoscyamus Syriacus, semen fert Aug.

Hypericon Fuchsi, perforata, floret Iul. (species maior, caule quadrangulo, folijs nõ perforatis.)

Hypericon, vel androsæmon perforata, floret Augusto.

Hypericon minus, floret initio Iunij.

Hypoglossis vel laurus Alexandrina, floret initio Decemb.

Hyssopus, floret Iulio.

Hyssopus alba, floret Iulio.

Hyssopus rara, floret Nouemb.

Hyssopus in horto meo, floret Aug.

I.

Iacea, Iunio floret.

D. Iacobi herba, floret Iun.

D. Iacobi flos, floret Iul. & Aug.

Iasminum, medio Iunij incipit florere, & Iulio.

L. 2

DE COLLECTIONE

Iberis, gaudblumen, genus nasturtij syl-
uestris, floret Maio.

Iberis Matthioli, floret Aug. & Octob.

Ibiscus, floret Iunio, Iulio & Augusto.

Herba ignota, Lepidion vel Iberidi cog-
nata, puto, flosculis albis, priusquam se ape-
riant puniceis, folijs serè nasturtij maioris,
ramulis multis distortis, bipedalis: radice al-
ba, simplici, intus nervosa, acri, cum superfi-
cies insignem acrimoniam non habeat, flo-
ret Septemb. Est autem Iberis Matthioli.

Ignota circa lacum Felium, flosculis cœru-
leis, vt in hederâ terrestri, geminis semper,
& c. floret Iul.

Herba ignota, quam heliotropium puta-
bam, folio ocimi, læui, Corchorus vocari po-
test, floret Iulio.

Innominata quædam fœtida, pinguis, fo-
lijs vt botrys, floribus senecionis, floret
Iulio.

Ilex aquifolia, *Stechend palmen*. Fructû
Septemb. fert.

Illecebra, vel Telephium sedi genus mini-
mum, floret Iunio.

Indici flores crocei, Caryophylli Indici
dicti: minor & maior specie, floret Septerm.
(Sed maior nunc primum incipit florere:
minor Iunio) simplices & cōfereti in vtroq;
genere.

Intubus

Intubus satius Iunio & Iulio floret. Cichorium etiam, id est, sylvestris intubus eodem tempore incipit florere, in autumnum vsq; durans.

Intubi genus quoddam luteo flore, scabrum, subtenerum, ex amaro subdulce, floret Iunio.

Intubus, vide supra Cichorium.

Inula, floret Iulio, Augusto.

Iouis flos, *Dondernägele/himmelrösle*, floret Iulio.

Iouis flos, floret Octobri, purpureus & albus.

Iouis flos rarissimus, floret Nouemb.

Irio non fœtidus (dentelaria quibusdam) acerrimus, in horto meo fructum ferebat Octobri.

Iris, floret in fine Aprilis, Maij principio & medio.

Iris minor sylvestris in horto meo, floret Maio.

Et satiua itidē in horto meo Maio floret,

Isatis sylvestris, floret Maio.

Iua illa aruensis, fortē arthemisia heptaphyllos: quæ & pro scordio videtur substitui posse, paulò minus efficax amarore, simili flore, toto similiter viscido, floret Iulio.

Iulia Italis dicta, sub finem Iun. incipit flo

DE COLLECTIONE

rere. An Iulia à mense Iulio dicitur?

Iuniperus Maio mense, cum pluuium fuerit cœlum, luteam è cortice sudat lachrymā, quæ magna in copia tanquam fungi exigui arberi adhærent, nec admodum adorata est.

Iuniperis, Maio mense tenuissimus, ac luteus puluis in auras auolat: quod semen illi esse animaduerti, quanquam & è nucleis lapidosi, quæ baccis continentur, nouæ iuniperi plantulæ fructificant, Tragus.

Iuniperus cuius baccæ altero demum anno maturescunt, Septemb. fert.

Iuniperus, baccas fert Octob. maturas.

L

Lactucæ, florent Iulio & Sept.

Lactuca sylvestris, qua pro endiuia hactenus vsi sunt Pharmacopolæ, Fuchsius: floret Iulio.

Lactucæ sylvestris genus in muris, flosculo cœruleo instar calathi exigui, florot Sep. & eodem semen fert.

Lactucæ sylvestris genus quoddam procerum, flosculis exiguis luteis, pappis nullis, floret Iun. Lactuca sylvestris Galeni in muris sæpe nascens, rote bletter, floret Iun.

Lactucæ sylvestris genus læuis, floribus lauis, in area mea, floret Aug. La-

Lactucam syluaticam, quæ cœruleum flo-
rem apud nos fert, in altis montibus, vidi
melino flore, mensis Augusti fine florere.

Lactucæ syluestres semen habent No-
uembri.

Lagopus, aruense trifolium, floret Iunio,
Iulio.

Lagopus, fâzle fle, floret Aug.

Lampfana, floret Maio.

Lampfana, flore luteo vel **Lapsana**, (& al-
bo flore puto rapistrum) floret Iunio.

Lancea Christi, quæ locis riguis prouenit,
folijs oblongis, dissectis, quadratis caulibus,
verticillatis, vt in marrubio, flosculis albis,
cum exiguis parpureis punctis, floret Iulio.
Sideritin primam facit Matthiolus.

Lantana vulgò *Italis dicta frutex*, virgis
lentis, floret Maio & Iun. dictus fortè à len-
tis ramulis: *fleiner mälbaum*.

Lantana frutex rubros potius adhuc aci-
nos habet, in Iul. qui Aug. demum puto ni-
grescunt, & Sept.

Lappa maior, vide *Personata*.

Lapathi genera quatuor, florent Maio.

Lapathi leu rumicis genus, quod vul-
gò bonum *Heinrichum* vocamus, Buchsius
tertium genus *Lapathi* facit, floret Sept.

Lapathū, cuius radicis vsus est ad scabiē,
floret Octob.

DE COLLECTIONE

Lapathum hortense magnū, floret. April.

Lapathum aquaticum, hydrolapathum, folijs angustis, parum lanuginosis, ad fossas aquarum. Hydrodracuntium Aldrouando à floris similitudine cum bistorta, floret Iul.

Lapathi genera semen faciunt Iulio.

Lapathum, oxalis, fructum fert Iunio,

Lathyris floret in fine Maij & Iunio.

Lathyris, cataputia minor, floret August.

Lattoris Plinij secundum aliquos, in orto meo, genus lactuæ sylvestris, floret Octobri.

Lauendula floret Iunio.

Lauendula Iulio mense ferè defloruit.

Lauendulæ paucæ, florent Septemb.

Laureolæ illud genus, quod vulgò *Syland* vocant nostri, ante folia floret Feb.

Laureola vulgaris, *Syland* in alpibus semen fert Augusto.

Laureolæ puto species in monte propè Curiam, parua, angustis folijs, paulò maioribus quàm roris marini, flosculis purpureis, odoratis, vix am *Syland*. Cauliculus lignosus, sed valde lentus est, non vltra septem digitos altus, floret Iunio.

Lens palustris flosculis tripartitis, floret Maio.

Lens floret Iunio & Iulio.

Lenti-

Lentibularia, vide Meon aquaticum.

Lepidium Æginetæ, in horto meo floret Iulio.

Lepidium folijs lauri, semen profert Octobri.

Lepidium Æginetæ folijs laurinis maioribus, floret Iunio.

Leucoij genera tria, florent Maio.

Leucoia, florent Septemb.

Leucoium, keiri, Martij principio emergens, statim floris rudimenta ostendit, integer apparet ad finem eiusdem.

Leucoium, keiri: & Strasburger nägely puniceum, & Roseum, odoratius, rariusque: & album, flor. Maio.

Leucoiō bulbosum, weißho:nung blumen/violas subolet.

Leucoium bulbosum, Theophrasti, floret Mart.

Leucoium, floribus violaceis, in horto Didymi, flor. Iul.

Leucoion luteum, & album, floret Aprili,

Leucoia medicorum, florent Aug.

Leucoium purpureum, Strasburger nägely/ flor, Octob.

Leucoium sylvestre floribus luteis, parvis, flor. Iul. Argent.

DE COLLECTIONE

Leucoia, rara, floret Nouem.

Libanotis, coronaria, rosmarinus, floret
Septem. & Octob.

Libanotis Italica vel Ferula, floret Iu-
lio.

Libanotidis species ex Italia, floribus
luteis in umbellis, &c. flor. medio Iul.

Libanotidis ferulaceæ genus, ex Italia
missum, his annis, in hortis nostris satum nō
potuit semen perficere ante frigora, etiam
Octob. Perfecit postea anno 57. circa medi-
um Octobrem pauca, eadem planta, quæ
iam annos durauerat circiter octo, & fortè
diutius durat, quod seminibus maturandis
non exhaustiatur & radices, validas ac li-
quore plenas habeat.

Lichen, hepatica, flor. Iun.

Lichen, flosculis stellatis, loco humido,
Gym rad (non videntur odorati, vt in lapidi-
bus) flor. Iul.

Ligustraria, qua pro elleboro nigro qui-
dam vtuntur, flor. in fine Apr.

Ligustrum, incipit florere Maij medio.

Ligustrum, vel (vt aliqui putant) philly-
rea, Iunio plerunq; floret.

Ligustrum, Weinbülzen / Ferngerten/
fructum fert Sept. Octob. & Nouemb.

Ligustrum aquaticum, faulbaum / 34
pfenn

psenbaum/in medio medicinæ vsu, Septem.
fructum habet.

Lilium Mariæ, quod quidam narcissum
putant: mihi non videtur, vnser frauen gil
gen/flor. April.

Lilij genus quod pro Asphodelo vsur-
pant, floret Maij medio & fine.

Lilium rubrum flor. Maio.

Lilium album in fine Iunij: & croceum,
vel rubrum, medio eiusdem floret.

Lilium aquaticum, vide Acorus fal-
sus.

Lilium conuallium, cui & nomen a-
pud nos ab hoc mense. Meyenryß / floret
Maio, & aliquando April.

Lilium conuallium, fert semen Iulio.

Limonium Fontanoni, in horto Didy-
mi, flor. Iul.

Limonium nostrum, vide Bistorta.

Limonium, bistorta rara, floret Au-
gusto.

Linaria, floret circa finem Iunij, aliàs me-
dio eiusdem: itemq; Iul.

Linaria, quam aliqui veterum osyrim
putant, flor. Aug.

Lingua herba, Natterzung/ flor. Maio.

Linum, floret Iun. & Iul.

Linum syluestre, flor. Iul.

DE COLLECTIONE

Lithospermi florum principia Decem.
se ostendunt locis tepidis.

Lithospermon, vnicaule locis cultis, flo-
ret Aprili.

Lithospermon minus, aruense, vnicaule & multi caule, Maio florent.

Lithospermon, floret Iun. & Iulio.

Lithospermum, milium Solis, semen
fert Augusto.

Locusta herba, *WüßleFraut* / in acetarijs
grata, floret Iulio & Maio & præterea No-
uembri.

Lotus vrbana gäl *stund fraut* / id est, Tri-
folium caballinum, floret Aug.

Lotus vrbana, floret Octobri & sylue-
stris, aliquando, pro sationis diuersitate.

Lotus syluestris, floret in fine Iunij, *das
gmein stund fraut mit wyssen blümen* / Vr-
bana eiusdem generis, eodemque odore, flo-
re tantum luteo, & siliquis differt, tardius in
horto meo, ex Italia nuper missa, floruit Au-
gusto, Septembri, & Octobri mensibus, Ita-
li veram melilotum putant.

Lotus syluestris, id est trifolium caballi-
num, floret Iunio, & semen fert Augusto.

Lotus syluestris, *ziger fraut* / principio
Iul. ferè defloruerat.

Lotus inodorus floribus luteis, crispis,
flor. Iun. Loti

Loti vel Meleloti quædam species inodora, gälē DubenFröpfle / primo quo nascitur anno, florem edit Iulio. Itemq; species alia maior, am Farzen see.

Lunariæ species folijs oblongis, asperis, albicantibus, crispis plerisque: flosculis ceu in umbello subflauis, singuli flosculi foliolis constant quaternis, reflexis. Seui initio veris, & Octobris nono primum, in vna stirpe flores apparuerunt: in alijs nulli dum.

Lunaria Græca, toto Aprili floret.

Lunaria montana circa stabula pecorū, Böni / floret Maio.

Lunaria Græca, quæ siliquas latas producit, vna rotundiores, altera oblongas, Augusto semen fert,

Lunarea lutiæ Alyssos quorundam, floret Aprili.

Lunaria Fuchsi, Non Fraut, alia quam lunaria arthritica, floret Iunio.

Lunaria in horto meo flüblumen / gäl / audio & albas inueniri circa Vefam. Græca, siliquis argenteis. Alia à Gratorolo missa, siliquis scabris, flosculis luteis, in planta à superiore anno relictæ, florent Maio omnes.

Lunaria Græca fert semen Iulio.

Lupinus floret Maio, & Iunio, & in horto meo Iulio.

DE COLLECTIONE

Lupus salictarius flor. Aug. & eodem mense semen habet.

Lyfimachij genus secundum quosdam, quod herba scilicet Antonij vocatur, & filius ante patrem. Habet autem cum flore, semen quoq; partim maturum, partim etiam elapsum Augusto mense.

Lyfimachium luteum & rubrum radice lignosa, weiderich/ flor. Iul.

Lyfimachium flauum, incipit Iunij sine florere, paulò post purpureum lyfimachiũ.

Lyfimachij genus, in quo flosculus purpureus exilibus siliquis extremis enascitur, flores & semina profert Aug.

Lyfimachij genus flore rubro: & alterum luteo, floret Augusto.

M

Mahaleb ad Vuesam semen facit Iul.

Maiorana, flor. Iul.

Malux tria genera Fuchsis: quorum primum vocat hortense, Ernrosfen/ nobis dictum quod messibus floreat, flore magno, & patulo rosarum instar, & similiter aut multiplici, aut simplici flore, purpureo, vel candido: hanc Apuleius videtur hastulá regiam dicere: (malua maxima,) Sed hanc veteribus

bus pro hortensi, & sativa in cibis vsitatam fuisse, non est veri simile: quin potius vulgarem maluam: siue punilam siue maiusculam (quam Fuchsius arborescentem vocat. Non longè aliam dendromalachem id est arborescentem maluam cognoscimus) sativam olim fuisse crediderim. Hortensis (inquit Fuchsius) floret Iulio, & Augusto præcipuè, flos ei diuturnus. Sylvestris minor per totam ætatem & in maximam autumnii partem durat: maior Iunio, & Iulio mensibus in primis floret. Est & aliud malux hortensis genus, paruum, pulcherrimum, quod Tragus depingit, & alceam peregrinam seu Venetam vocat, id quoque Iulio floret: Item aliud flore flavo, folijs integris in acutû desinentibus, sativum.

Malua maxima, hastula regia Apuleij
Fuchσιο, Ernrosen / gfült / einfach / weiß / vnd
rot, flor Iul.

Malua hortensis maior, cui nomen a-
pud nos à messe, flor. Aug.

Malua magna hortensis ernrosen / flor.
in fine Iunij.

Malua vulgaris, flor. Aug.

Malua quædam domestica, item Die ern-
rosen / Septemb.

Malua crispa, magna, magnis & crispis

DE COLLECTIONE

ambitum folijs, floribus paruis, floret Augusto.

Malua crispa in horto meo, Septembr. floret & Octob.

Malua sylvestris, flor. Maio.

Malua sylvestris maior, Iunio & Iulio in primis floret. §

Malorum genera initio Maij ferè florent.

Mala diuersorum generum, Augusto & Septembri maturescunt.

Mali vernæ, Theophrastus meminit Iunio fructum facere.

Malus præcox, paradysæcæum, fructû Iunio fert, & Iulio.

Mala quædam in primis cotonea, & sylvestria (quæ sint ex malis priora, quæ tardiora) Octob.

Mala insana maturantur Augusto: herba personatæ ferè folijs, & caule.

Malum insanum Fuchsij & aliorum, flore cæruleo, apicibus luteis, flor. Augusto.

Malum insanum, in horto meo 59. Septemb. florebat, nullum ostendebat fructû, neq; Augusto.

Marrubium floret, Iunio, Iulio, & Augusto.

Marrubio similis herba, verticillis suis aculea

aculeatis, purpureis floribus, folijs mercurialis, &c. Veteres quidam huiusmodi alysson describunt, flor. Aug.

Malua crispa, flor. Iul.

Medica duplex. Satiua flore violaceo, Iunij fine floret : crescit ad duos cubitos, & vix iam sustinet seipsam : tertio anno altius crescit, hominis statura, & citius floret. Altera sylvestris, medio & fine Iunij floret, corymbis flosculorum luteis: sapore eodem & reliqua specie similis : folia vtrisque modicè mucronantur : & versus mucronem {margines leuiter exasperantur. Calidæ sunt in secundo gradu, inodoræ. Crescit hæc ad murum & in muro, & albi ad margines aggerum, & fossarum siccis.

Medica sylvestris & hortensis, flor. Iun.

Medica ex Italia floribus violaceis, floret Aug.

Medica cœrulea in fine Maij flor.

Medica, vide inter Trifolia.

Melampyrú vel Myagrus in horto meo, floret Maio.

Melampyrum, vide Myagros.

Melissa Fuchsij, flor. Maio & Iun.

Melilotus albus, flor. Iun.

Melissophyllon flosculis albis, & peregrinum (quod foetidius & magis cimices

DE COLLECTIONE

refert) cœruleis, floret Augusto.

Melissophyllum floribus pallidis, flor. Julio.

Melilotus, lutea & alba, guldiner fleck / eine guten geruchs / (sunderlich so er dñr ist als Theophr. lert. Medica quibusdam credita, vtraque flore coloris violacei, & altera apud nos vulgari (locis saxosis) flauo, meliloto nostro similis inodora, &c. flor. Iul.

Melilotus lutea, & alba, odorata, florent Augusto.

Melilotus inodora folijs ternis à caule remotis, & ad caulem binis, gälte duben fröpple Lotus puto Fuchsj, flor. Iun.

Melilotus crispa, flore crispo, inodora, semina conuoluta habet cochleatim ferè vt medica, sed minus & minora, floret Iunij initio.

Meliloti inodori species in muro fossæ ciuitatis, in fine Maij flores habet in corymbis luteos. Calida est in secundo gradu, subacris, tenuium partium: non reperiò in Tragò. An Medicæ species?

Meliloto similis inodorata, capitulo florum rotundo, flauo, stein Flec. Medicæ species aliquibus, flor. Aug.

Meliloti inodori species stein Flec, quæ Me dica syluestris dici potest, flor. Iun.

Meliloti

Meliloti syluestris species humilis, binis
 ē regione foliolis, cuius lutei flores, suauem
 quendam & ferè lactis odorem referunt: in
 prato infra turrim in *Serd* / floret Maio &
 Iunio. Siliquas curuas & vnguium specie
 profert Iunio adulto, vel in fine Iunij.

Melilotus agrestis, flor. Iun.

Meliloti loco quidam herba trifolia flo-
 ribus luteis, sed inodora vtuntur: *stentia*.
 Sed est alia quoque saxifraga lutea, quam
 sic nominant, in Germania inferiore, fo-
 lijs ferè aquilegiæ, radice lutea, floret Iu-
 lio.

Melo, vel Melopepon, floret Augu-
 sto.

Menthæ genera, flor. Aug.

Menta, flor. Iul.

Mentastrum florere incipit initio Iunij,
 Iul. & Aug.

Meum quorundam, alijs species seselis,
Geerwurtz, flor. Iun.

Meon aquaticum circa lacum felium,
 folia enim vt Meon *Geerwurtz* exilia & si-
 militer diuisa habet, ijsque adnatas passim
 bullas quasdam *maxceles*, floret Iulio
 dentibularia nominetur (nam Meon alijs a-
 liud ostendunt) sine radice floribus fla-
 uis, &c.

DE COLLECTIONE

Mercurialis, floret Maio, Iulio, August.
Septemb. Nouemb.

Mercurialis fœmina, flor. Iun.

Mercurialis syluatica mas & fœmina,
sed ille rarior nobis, Martij medio floret.
Mercurialis syluatica, teste Trago, se occul-
tat vel interit Maio vel paulò post.

Mercurialis mas & fœmina semen ferūt
Augusto.

Mespilus nostra, in fine Aprilis, quando
que in Maio floret: fructum Octob. profert.

Millefolium vulgò dictum, garben/ al-
bum & rubens, flor. Iul. & Aug.

Millefolium flore rubro, floret Iunij
medio.

Millefolium luteis floribus: item pere-
grinum vel odoratum, flor. Iul.

Millefolium aquaticum quoddam, flo-
re albo ranunculi, insipidum, &c. floret
Maio.

Milium, flor. Aug.

Milium Indicum vel Æthiopicum, an-
no 58. in horto meo flor. Iul.

Mießbeere fructum ferunt ad finem
Martij, sub niuib. maturescunt, Sim fa-
gen see.

Morsus diaboli, flor. Aug. & Sept.

Morus fructum fert Augusto.

Musca-

Muscateſſa Cordi (Ophiogloſſ.) Maio
interit vel ſe potius occultat.

Myagrſus aliquando, relictus nimirum à
ſuperiore æſtate, Feb. flor.

Myrica floret medio & fine Maij & Iul.

Myrica Iunij initio ferè deſloruerat.

Myrrhis, id eſt cicutaria, vt quidam pu-
tant, flor. Maio.

Myrrhis cerefolij ferè ſapore, dulcior,
floret anno ſecundo, medio & fine Apr.

Myrrhidis (ſic nominemus vel cicuta-
riæ, vel Paſtinacæ ſylueſtris) ſpecies in vijs
inter vites verſus Sollicken. Item Peregri-
na quædam ſatiua: vna olet folijs cuminum
Romanum, alia veluti raphanum ſylueſtrè,
habent radices magnas & validas, flor. Iun.

N

Nardus vulgaris, pſeudonardus floret
Iun. Iul. deſſoreſcit.

Narciſſus ille quorundam, & Tragi ve-
rus, qui mihi potius anemone limonia vi-
detur, noſtri Lilium diuæ Mariæ vocant,
cuius floris odor ſuauiſſimus ſed lenis, flo-
ret Apr. & Maio.

Naſturtium floret Iun. Sept.

Naſturtium pratense, gaud Blumen/

DE COLLECTIONE

floret April. Itemque hortense anni superioris.

Nasturtium palustre, floribus melinis, parum acre, flor. Maio.

Nasturtium aquaticum, floribus flauis, circa lacum, flor. Iul.

Nasturtiolum petræum, herbula omnium minima, flosculis candidis, floret April.

Nigella, flor. Maio.

Nigella flore luteo, flor. Iul.

Nigella coronata calyce, fatiua, maior, foliosa. Minor syluestris puto flore è luteo subuiridi: prior cœruleum florem habet, floret Iunio.

Nigella fatiua, flor. Octob.

Nigella, *Σφάβας* semen edit Iulio, Augusto.

Noli me tangere, flor. Iulio, & Iunio: locis verò frigidioribus & vmbrosis, medio, & fine August.

Nummularia floret in fine Maij (& genus minus acutius erectum in syluis) floret & Iunio.

Nummularia Fuchsj, Vide Centimorbia.

Nux Juglans, iulis verè floret: Augusto & Septembri maturescit fructus & excutitur.

Nux

Nux vesicaria, pimpernůßle, floret Maio: maturefcit Septemb.

Nux Methel, Vide strammonia.

Nymphæa vtraq; apud nos Maio, Iunio que floret.

Nymphæa lutea floret Iulij principio in lacu nostro.

O

Ocimũ basilicũ fl. Iun. & Aug. Basilien.

Ocimi duo genera, flein vnd groß Baslien/florent Iulio.

Ocimum, basilicum medium, album & purpureum, & ocimum citratum, odore mellissæ in horto meo, flor. Aug.

Ocimi folijs herba circa sæpes nascens, flosculis albis, post quos verrucæ relinquuntur, flor. Aug. Heliotropij genus aliquando putabam.

Ocimum Tragi, heidenfo:n: quod aliqui erysimon Theophrasti putant, flor. Iun.

Ocimoides, flor. Sep.

Ocimoides album duplex, rubrum duplex, & flauum, quod semel tantum vidi Lindauix in horto Matthiæ Burtz mercatoris, flor et Iulio.

Ocimoides rubrum, quod floret in Iunio, in hortis consitum.

Ocimoides rubrum, rarum inuentu:

EE COLLECTIONE

& facilius in montibus quam alibi, floret Augusto

Ocimoides rubrum alpinum, Maij medio floret: & mox etiam album, quod tamen aliàs Iunio primum floret. Huius flores in sole flaccescunt, vesperi & nocte redintegrantur: rubri semper integri manent, minusq; odorati sunt. Videtur & Ocimoides quoddam album minus odoratum esse in horto meo.

Ocimoides albo flore, calyce purpurascente vel viridi: vnum, medio apicem exerit: minus odoratum: alterum non, odoratius, quod eodem die marcescit: eadem differentia est in purpureis, floret Iunij fine.

Ocimoides albis floribus odoratis, quod aliqui non rectè ben album vocant, vt alij polemonium, Lidweich mit linden/ harschten Bletteren/ gestaltet wie die großen Basilien/ vt ego interpretor, flor. Aug.

Ocimoides purpureum floret in fine Apr. & Octob.

Ocimoides purpureum dilutum albo cognatius odoratiusq; alpino, etiam die se claudit: at album alpinum non clauditur, flor. Maio.

Ocimoides croceo flore, floret Iunij medio. Vocari verò sic potest propter flo-

ris speciem, omnino inodorum tamen.

Ocimoides peregrinum maius perenne;
& minus, quod eodem anno floret, floret
Augusto.

Ocimoides peregrinum minus, floret Se
ptembri.

Ocimoidis species peregrina minor, Au
gust. semen profert.

Ocimoides iam rarum, circa finem No
uemb. mensis floret.

Oenante herba filipendula, floret Iunio.

Oleæ plantula, in calidioribus locis Ger
maniæ, vt circa Rhenum, floret circa S. Ioan
nis diem, in Iunio.

Olusatrum in horto nostro floret Maio
anno secundo puto à satione.

Ononis floret in fine Iunij & Iulio.

Ophrys Fuchsi, quæ alismatis species vi
detur, Maio & Iunio mensibus floret, dein
de euanescit circa festum D. Ioannis Ba
ptistæ.

Orchis, vide Satyrium.

Orchis, genus bifolium ante caulem, cum
& bulbum vnicum ostendit, postea caulis ac
cedit, flores è viridi pallidi, & foliola alia in
caule, floret Maio.

Orchis genus illud rarius & elegans, quod
in flores habeat albicantes, minutos &

DE COLLECTIONE

punctis rubicundis aspersos, capitulum ostendit puniceum, quod floribus nondum apertis constat, floret in Maio.

Orchis gen^o illud quod *Tufels angsticht* vocant, flore albo, item flore purpureo, vel communi, floret Iunio. In genere testiculorum, odoratiores sunt, quibus flosculi minores.

Orchis, id est, testiculi herbæ genera quædam: ex quibus id quod *Serapiadem* vel *triorchin* aliqui esse putant, in fine Maij, & initio Iunij apparet, deinde nusquam inveniri potest.

Oreoselinum aliud circa *Basileam*, floret Iulij princ. pio.

Oreoselinum von *Baden*, floret Iul. & alię species duę oreoselini.

Origanum vulgare, floret Iunij fine, Iulio & Augusto.

Orminum hortense & pratense *Scharlach*, floret Iulio: ferè enim tardius floret satiuo. Sed *Fuchsius* orminum vtrunq; Iunio mense floribus & semine prægnans esse scribit.

Orminum hortense, id est, *Gallitricum*, vt recentiores multi putant, *Scharlach*/vel potius *alecto: olophos*, id est, gallicrista, à folijs cristę gallinacę instar ferratis, vnde & galitrici vox corrupta videtur, floret Iunij

Iunij principio & medio.

Orminum syluestre, floribus purpureis, nunquam prius mihi visum, floret 8. Iunij.

Orminum syluestre, vel schlarea syluestris, flore albo: & commune cœruleo, floret Maio.

Orminum syluestre, quod & cœruleum & album inuenitur, floret Iunio.

Orminum vel gallitricum syluestre, flore cœruleo, semen fert Iulio.

Ornithogalum, floret April.

Ornus, grosser māl boum/wielāsch, vt ego interpretor, floret Iunio.

Ornus aucuparia, wielāsch, Aug. fructum fert, & Sept.

Orobanche nostra, quam nonum satyrj genus Tragus facit, floret Maio.

Orobanche Ruellij, floret Aug.

Oxalis, floret Maio.

Oxyacantha, Berberis, Erbglan. Sed aliqui spinam albam vulgò dictam oxyacantham potius esse asserunt, quibus assentior: vtraq; floret Maio, fructum facit Aug. Sept. & Octob. Augusto autem collibus & locis calidioribus.

Oxylapathum vulgare, floret Aug.

Oxys, alleluia, floret April. & Maio.

DE COLLECTIONE

P

Panaces Chironium, herba Doria, ni fallor, quorundam, nonnulli Limonium Matthioli vocabant, quod tamen non probo: in horto meo floruit Iunio, aliàs Iulio, primo gradu amara.

Panicum, floret Iunio.

Papauer sativum, floret Iunio, & Iulio.

Papauer cornutum, floret Iunio, Iulio & in fine Maij. Semina fert Nouembri.

Papauer erraticum, floret in fine Maij, Iunio, Iulio et Augusto: semen fert Septembri.

Paris herba, quam aliqui non rectè aconitum pardalianches faciunt, floret Maio.

Parthenium, matricaria, floret Maio, Iunij medio vel principio potius, & quandoq; Iulio.

Pastinacæ genera tria, radicum colore distincta, florent Iulio.

Pastinaca maior, Pastaney, semen fert Augusto.

Pastinaca erratica purpureo apice in medio umbellæ candidæ, vogelnâst, floret Iunio & Augusto: semen profert Septembri et Octobri.

Pastinacæ genus erraticum umbellis luteis, elaphoboscus quorundā, floret Iunio.

Pastinaca sylvestris, umbellis luteis, Bren
Fraut/

fraut, diuersa à Dauco syluestri, quem Dioscorides Pastinacam syluestrem vocat: floret Iunio & Iulio.

Pecten veneris, floret Maio, in aruis, qui post flores albos relinquit filiquas tanquam acus: & Iulio.

Pelecinus floret Octob. Securidaca.

Pelecinus syluestris, herba & frutex in colle propè Scaphusiam, floret Maio.

Pentaphylli, id est, quinq; folij, tria genera, florent Maio.

Pentaphyllum, floret Iulio.

Pentaphyllum minus, quod locis apricis & siccis nascitur, præcipuè collibus, floret Mart. aliàs Septemb.

Pentaphyllum petræum, in saxis iuxta aditum fodinæ Ferrariæ in monte supra Sergans: sed plantæ erant paucissimæ, floret Augusto.

Pentaphyllum erectum, magnum, candidum subdus, trib⁹ aut amplius à radice caulibus, floret Iunij initio.

Peplus, esula rotunda, floret Iulio.

Peplus, floret Maio.

Perfoliata, *Surdwache*, floret Iunio.

Perfoliata alia, quam aliqui ineptè centaureum maius vocant, floret in fine Iunij in colle vbi calamentum gegē der sylbrugg.

DE COLLECTIONE

Flores in corymbis sunt lutei, folijs octenis conditi, subamari, bono sed leui odore. Item in colle ob der Spitzaler wyfen.

Perfoliata rubra, Iunio floret.

Perforata, vide Androsæmon.

Periclymenon, caprifolium, incipit flores Maij medio & fine, Iunio & Iulio: item-
que Augusto, semen Septembri producit.

Periclymenon, Specf gilgen, principio Septembris floret. Bis floret in anno eadem æstate, sed fructum post secundum florem non potest perficere.

Periclymenus minor, gemellis acinis, rubentibus viscosis, Iulio fert acinos.

Perficus cuiuscunq; generis (trium generum) floret April.

Perficus Armeniaca, Scrilcle, floribus albis, odoratis, floret Mart.

Perficus, fructum Sept. profert.

Parfica duracina, carne rubenti, matura sunt Octob.

Perficaria maculata, quam aliqui molybdænam vocant, flore purpureo & albo, floret Iulio, & Iunio.

Perficaria, vide hydropiper.

Personata lappa maior, floret Iulio & Septembri.

Personata

Personata, Lappa maior, cuius seminis ad calculum vsus laudatur, semen fert Octobri. —

Pes anserinus Tragi, & Fuchsj, Sewtod. nimirum Chenopus Plinij, floret Iulio.

Pes leonis, Sinnar, floret Iuni o.

Petasites, pestilentz wurcz, floret Martio, Aprili, & quandoq; Feb.

Petroselinum Fuchsj, si in hortis feratur: putat autem id esse quod officinæ vulgò amomum vocant: nesciens fortè Galenū scripssisse petroselinum, verum & Macedonicum propriè dictum, adeo amarum esse, vt amarore suo totam Theriacam inficiat, quod amomo vulgò dicto non conuenit, id ego igitur potius ammi verum, aut cuminum Æthiopicū esse suspicor. Pro vero autem petroselino astrantia nostra, vti consulo, donec verum adferatur. Iam enim ex Macedonia & Cōstantinopoli nuperrimè quosdam detulisse audio.

Peucedanum Fuchsj, floret Aug.

Peucedanum in horto meo, caule dodrantali, folijs crassiusculis per terram sparsis, vmbellis albis, floret Maio.

Phalangitis, gräßgilger, asphiodeli fœmina quibusdam: Et eiusdē species maior mondana, odore & sapore in flore radiceq; lilij albi, floret Iul.

DE COLLECTIONE

Phalangium vel phalangites Kentmanni, in fine Iunij floret, Sic milden gras gylgely.

Phalaris folijs arundinis, flore gramineo, pallido, spica elegante & conferta, latiuscula. Olingerus Norinberga misit, floret Iulio.

Phillyrea nostra, Ferngerren/ floret Maio.

Phoenix, roten milden haber. Iunio floret.

Phu tota æstate floret. Fuchsius, qui Phu in maius, hortense, & minus, vulgare distinguit. Est & saxatile quoddam montanum, & palustre minimum, quod Aprili floret.

Phu hortense (& sylvestre in horto meo) circa finem & medium Maij floret & semen fert Iulio.

Phu (maius) Dioscoridis, floret Iunio.

Phu saxatile, & phu parvum saxatile, quod in vmbrosis & humidis montium saxis crescit, floret Aprili.

Phu minimum sylvestre, geniculatis radiculis, floret Aprili.

Philosella maior & minor. Maio & Iunio florent.

Pimpinella, floret Aprili, Maio & Iunio: Maior in pratis humidis Iulio: semen facit Iunio & Iulio.

Pimpinella, quæ & sanguisorba, Maio & Iunio floret.

Pirus plerumque cum ceraso, floret Aprili.

Pirorum

Pirorum genera diuersa maturefcunt Auguft. & Sept.

Pira quæ à fœno denominamus *heerwbyren*, quod hæc fola immatura etiam fœno obruta & calore emollita, edantur, Iulio maturefcunt.

Pira præcocia, & fuperba, *Mufcat byrle*, Iulio maturefcunt.

Pira quæ noftris *heerenbyren*, maturefcunt Aug. medio.

Pira quæ *fchûrbyren* à nobis, maturefcunt in fine Aug. & Sept.

Pira quæ noftris *Grauwengftler* dicuntur, à calore nomen habent, boni faporis, & fucco mediocri prædita, id eft, non ficca aut friabilia, maturefcunt medio Auguft. & poft.

Pira quædam, præfertim ftrangulanea & fylueftria, matura funt Octob.

Pirola vulgò dicta, *wintergrün*, quam quidam limonium putant, floret Iunij principio: ego bifortam pro limonio femper habui, nec dum muto fententiam.

Pifum, floret Iunio.

Plantagines florent Maio & Aug. Iulio item, quo & femen edit, itemq; Auguft. Nouemb. & Sept.

Plantago maior vel media potius, floret Iun.

N

DE COLLECTIONE

Plantago minor, floret Iul.

Plantago aquatica, quam aliqui alifina veterum esse putant, floret Iunio.

Plantago aquatica semen fert Iul.

Pœonia, floret Maij principio & medio.

Pœonia, floret circa finem April. Mas in principio in horto meo, alias in fine, loco umbroso & hyeme longiore.

Polemonium, floret Maio & Iulio, præsertim eius principio.

Polemonium Dioscoridis, floret Iul.

Polemonium petræū, floret Iulio: & hoc & Dioscoridis dictum, suauius olent vespere in meridie flos ferè euanuit, vt hesperides dici mereantur, vtriq; ferè idem odor, suavis, non plenus.

Polemonium: quod duplex esse puto, vnum maius & longioribus folijs, nisi natalitij soli differentia est, floret Iun.

Polemoniū, *Widerstoß*, vt ego interpretor quod aliqui ben albū nō rectè vocitant, vt aliqui ocimoides album, in quo genere etiam rubrum habetur. Polemonium verò album tantum, floret Aug.

Polemonium Fontanoni in horto meo, floret Iunij principio.

Polemonium viscosum vel saxatile, floret Iunio.

Polemo-

Polemonium palustre, vide *Gratiola*.

Polemonium petraeum, floret Maio, semen fert Iunio.

Polium nostrum Maij fine & Iunij principio floret.

Polycnemon, *langer de st.* floret Aug.

Polycnemon, origano simile, floret Iulio & Septemb.

Polycnemon origano vulgari simile, sed rarum, *Lunariæ* speciem refert, folijs oblongis, asperis, albicantibus, crispis plerisque: flosculis ceu in umbella subflauis, singuli flosculi foliolis quaternis constant. Seu initio veris, & Octobris nono primum flores apparuerunt, in alijs verò nulli dum.

Polycnemon origano simile, quod & *Clinopodion* fortè appellari posset à figura: nam verticillum florum, aut seminum in summo caule impositum habet, veluti capitulum, vna hæc herba, quod sciam, semen Octob. facit.

Polycnemon vel *Clinopodion* maius semina gerit rotunda & subrufa, Nouembri.

Polygonatum, *Weyßwurtz* vtrumque, initio Maij floret, vel medio: alterum tamen prius sæpe Aprili.

Polygonatum erectum, semen fert Aug.

DE COLLECTIONE

Polygonon, wāgtritt, floret Aug.

Polypodij radix colligenda est in fine Augusti.

Polytrichum Apuleij, vt quidam vocant, guldinwiderthon, floret Iun.

Populus suis iulis, floret Mar.

Populi nigre gemme turgentes colliguntur mense April.

Populi nigre gemme, mensis Sep. 19. turgere succo suo flauo vidi: & fortè is hoc tempore vtpote sicciore melior est, & minus aqueus quàm vere.

Porrum, floret Maio & Aug.

Porrum sectium sylvestre in rupibus ripæ Rheni zu Lausenberg, floret Iun.

Portulaca, Iunio & Iulio floret.

Potamogeton, Samfraut, floret Iul.

Prunella vulgò dicta, floret Maio, Iunio, Iulio, August. Septemb. Octob. & Decemb. mensibus.

Prunus plerunque cum ceraso, floret April.

Pruni genera quædam urbana, inter quæ tardissima sunt minima, cerea ferè per maturitatem. Zipparten, maturescant Septe. & Octob. Alia verò cerea magna sunt, quæ Augusto, si benè memini maturantur.

Pruni genus, maturescit fructibus circa finem

finem Iulij, cui fructus parui cœrulei dulciores, Blaw frieden.

Pruna cerea vel cereola, magna subdulcia, minima subcœrulea, acida, parum humida, Wynn frieden, maturescunt Aug.

Pruna nostra maturescunt Augusto.

Cœrulea, Blaw frieden.

Haber frieden kleiner dan die anderen.

Weyn frieden / kleine sure, subcœrulea ut & Haber frieden.

Wyß frieden / tardi⁹ aliquando matura gar und gar wyß.

Bockshöde halb wyß / halb rotlecht / aluum puto magis soluunt: & hæc alique alba vocant, sed minus propriè.

Prunus sylvestris, in fine Martij floret plerunq; & April. principio.

Prunus sylvestris, spinus, Schlehenbaum, Sept. & Octob. maturus est fructus.

Pseudamonium, floret April.

Pseudochamædrys, Schaaffrant der wild, caule puto simplici & longiore, floret Iunio.

Pseudochamædrys, gamanderle, floret Maio.

Pseudocyperus corymbis fortidis, semen fert Iulio.

Pseudomelanthium, Ratten, floret Iun. •men fert Augusto.

DE COLLECTIONE

Pseudonardus, vide *Nardus vulgaris*.

Pseudorhaponticum, folijs oblongis, florere puto mense Iunio circa finem.

Psyllium, Iulio & Aug. floret.

Ptarmice, floret Iunio & Augusto, quam *Ruellium* quidam sequuti *pyrethrum palustre* esse putant. Ego verò aliam noui *ptarmicem montanam*, folijs ferè *plantaginis*, flore aureo, radiculis ruffis, non sine odore, acribus, *Wälsche müttel wurtzen*.

Pulegium saxatile (regale puto quibusdā) *polycnemon* fortè, floret Iulio.

Pulegium ceruinum, floret Iulij fine *Monspelij*.

Pulmonaria *Plinij*, floret Mart. & April.

Pulmonariæ *Plinij* species, sine maculis foliorum, *kleine waltwurtz*, floret April. Vide *Symphytum*.

Pulmonaria *Gallis* vulgò dicta, floret Maij fine, semen fert in Iulio.

Pulmonaria muralis, *Wüßspick*, species syluestris *Lactucæ*, fortè *reseda* *Plinij*: nam similis eius vsus est hodie apud nos ad collectiones aut inflammationes sedandas, præsertim *Paronychias*, in quarum remedijs multi etiam incantationes adhibent, magis quàm ad vllas alias inflammationes, &c. floret Augusto.

Pyre-

Pyrethrum, in Aprili floret.

Pyretrum alpinum chamæmalo simile,
(perenne) radicibus repens, floret Iulio in
alpibus nostris.

Q.

Quercus circa diem D. Georgij flores seu
cachryes suas emittit.

Quercus quædam fructificant, circa diem
D. Bartholomæi, aliæ tardius.

Quercus quædam glandes ferunt, quæ-
dam etiam pilulas fungosas : in quibus ver-
miculi conduntur : aliquando squamu-
las rotundas, candidas, in sinistro foliorum
latere, quas rustici flosculos vocant, indicatiū
copiosi prouentus glandium anno sequen-
te: glandes Septemb. producit.

Quinquefolium, floret Iunio.

Quinquefolium minus in locis siccis, ra-
dicibus suis repit, floret Aprili & Maio.

Quinquefolium palustre floribus puni-
ceis, radicibus repens oblongis, floret me-
dio Maij.

R.

Ranunculi genera hortēsia & syluestria, sar-
doniū, aruenſe, echinatis seminib. Aquaticū
flore plantaginīs : & alterum minimū folijs

DE COLLECTIONE

minimis, multifidis, vt in cottula. Item flammeus. Item maior albus nō hortensis, tantū puto apud nos: florent Maio.

Ranunculi species diuersæ, & quę apium risus vocatur, florent Iunio.

Ranunculi genus primum, Martio floret & initio Aprilis, deinde disperit.

Ranunculi genus quartū Fuchsius, quod vulgò vocamus Martios flores, qui albi & purpurei sunt: & secundū Fuchsiū etiā lutei, apparent Martio & Aprili.

Ranunculus sardonius, quem apium risus vocant, & alius quem aliqui flammulam, floret Aprili.

Ranunculus sardonius semen fert Maio.

Ranunculus hortensis, albus flore denso, florem ostendere incipit in fine Aprilis.

Ranunculi quidam (hortensis, flauus, dēsus) florent Iulio.

Ranunculi pratenses pauci, florent Oct. vt & horteptsis, flore denso, paucus.

Ranunculus pratensis sine plumbo: cæteri enim præter aquaticos, pleriq; plumbum id est, maculas nigras habent, Causticus: florent Aprili.

Ranunculus pratensis, floret Septembri.

Ranunculus pratensis, hirsutus, floret Augusto.

Ranuncu-

Ranunculus albus in summo Braulio, monte Rhetorum, folijs simplicibus oblongis, angustis, &c. flor. Iul.

Ranunculus syluestris, albus, fiderische/ medio April. flor.

Ranunculus alpinus petreus, albus, ex monte Pilati mihi translatus, flor. Apr.

Ranunculus palustris, quem Dodonæus ouibus exitialem esse scribit, flor. Iun.

Ranunculus palustris am Farzen see/ floret Iulio.

Ranunculus chamæmeli folijs, rara herba & caustica, locis palustribus, flor. Apr.

Ranunculus, rarus, flor. Nouem.

Ranunculus bannen süß/ plumbum habet: interea serpit, in olera recipitur, flores habet maiores, iuxta semitas crescit, Maio floret.

Ranunculus humilis, radice crassa digitali, causticus, rarus, flor. Apr.

Ranunculus parvus calyce inuerso, floret Maio.

Ranunculo cognata herba, quæ in olera admittitur, flor. Aug.

Raphanus æstate, floret Iul. & Octob.

Raphanus maior, flor. Maio.

Raphanus syluestris rapistrum, siliquis acum natis, acribus, flore albo, flor. Maio.

DE COLLECTIONE

Rapistrum flore albo, vel sinapi agreste, flor. Iun.

Rapistrum flauis floribus, heiderich/ floret Iul. August. & Octob.

Rapum, flor. Iun.

Rapum syluestre, flore

Calathi, cœruleo (Vuularias etiam vocant.

1 Maius, quod medium putant, & albo etiam flore inuenitur.

2 Minus, quod suis radicib. serpit.

3 *Oterächten rapünzle*/ in quibus cœruleus color dilutior est.

4 Petræum, in muris.

5 Partense, flore in corymbos collecto.

6 Vnguium instar recuruatis in summo floribus, in collibus & montib.

7 In spica quadam, in syluis, folia maculosa.

8 Non Maculoso.

Rapum syluestre, *rapünzle*/ floret Iun. Iulio. Itemq; minus.

Rapi syluestris species parua in muris, campanulis cœruleis: primum & fermè violæ folijs minoribus, flor. Iul.

Rapi syluestris genus pratense, puniceo flore in corymbis, confercto, & syluaticum in mon-

in montibus cœruleo, floret Maio.

Rapum syluestre petræū, augen fraut/
fleckenfraut, flor. Aug. Vide Vuularia.

Rapum syluestre, Rapunzel / duorum
generum, commune quod procerissimum
est: minus cui corymbi sunt in summo: me-
dium folijs latiusculis, non longis vt primū,
(sunt & syluestria quædam genera.) Item
minimum petræum in muris ciuitatis, flo-
rent Iunij fine.

Rapunculi syluestris genus floribus cœ-
ruleis in se recuruis: Item die rächten Ra-
pungel, flor. Maio.

Rhamni genus Sandthorn/fronthorn/
fructum fert Septem.

Rhaponticum spurium, flor. Iun.

Rhaponticum ignobile, collinū vel pra-
tense folijs angustis, valde dissectis, flo. Aug.

Rhapontici genus degener, flore rubro,
calyce squaroso, flor. Septem.

Raponticum minus & degener, calyce
infra florem, protuberante squamis alter-
nis viridibus & fuscis corticato, flor. Iul. Vi-
de Centaurium.

Rhododaphne vera, in horto Massarij,
flor. Iul. medio.

Rhododaphne, pumila, vel filius ante
patrem maximus, flor. Iul.

DE COLLECTIONE

Rhododaphne minor vel herbacea ferè
fruct / floret in fine Iulij aliàs in principio.

Ribes vulgò dictum, floret Martio, April,
li, Maio.

Ribes frutex vulgaris, cuius fructus, à
tempore, acinos D. Ioannis vocamus, Iunio
producitur.

Ribes syluestre, aquaticum, sabinæ ferè
odore, flor. Apr.

Rosa Maij sine spina, floret April. me-
dio & fine.

Rosæ minoris fruticis, quæ à Maio de-
nominantur, & Meyen rōle: circa Maij medi-
um florent in monte Alpjo propè Tigu-
rum copiosè proueniunt: inde in hortos
transferuntur.

Rosa vna & altera etiam Augusto, in ro-
seto meo nascebatur.

Rosæ, primum albæ, deinde purpureæ
vel incarnatæ, tertio rubræ, florent Iun.

Rosæ albæ & incarnatæ dictæ: & cynor-
hodon, flor. Maio.

Rosæ femina Septembri maturescunt &
Nouemb.

Ros solis, die 20. Iulij iam ferè deflo-
ruerat.

Rosmarinus, flor. Maio.

Rubia satiuæ in horto meo, floret Iu-
lij fi-

lij, fine, minima squinantia.

Rubię genus prauum, asperula puto, folijs per genicula inferius quaternis, superius binis, floribus albis, specie vt in Phu, floret Iun. & Iulio.

Rubia syluestris, flor. Iun. & Aug.

Rubia alia parua syluatica flosculis paucis violæ dilutæ colore, flor. Iul.

Rubea syluestris, waldmeyster / floret Augusto.

Rubea minor syluestris, flor. Maio.

Rubiæ syluestris species hepatica, hertz freydt / flor. medio & fine Maij, & Iun.

Rubea syluestris, floret Augusto, Sonchi genus vt videtur, floribus luteis, pastillicantibus, barbatis multis, calyce foliosa (vt & lactucæ syluestris genus quod in area creuit, & aster Fuchfij) folijs molliter aculeatis, flor. Augusto.

Rubia palustris parua, flor. Iul.

Rubus humilis, chamæbatus, floret Maio & Augusto.

Rubus maior, & minor siue chamæbatus sua mora maturant Aug.

Rubus maior Augusto, & Septembri fructus fert.

Rubus maior, & florem adhuc, & fructum Augusto mense producit.

DE COLLECTIONE

Rubus Idæus, hindebere/ Maio & Iulio
flore.

Rubus idæus in montibus semen fert
Augusto. Erquidam in monte Pilati sine vl-
lis: p. is.

Ruscus in horto meo semel perpaucis
flosculis Martio floruit, anno 1562. & rursus
6. pluribus.

Ruscus flore medio & principio Apr.
in horto, med. js è folijs flosculi radiati cum
orbiculo puniceo in medio.

Ruscus florū rudimenta viridia, sed clau-
sa Decemb. ostendit.

Ruta flore: Iunio, Iulio, & Augusto: se-
men fert Octob.

Ruta capraria, flore Maio: semen fert
Augusto.

Ruta, rara, flor. Nouemb.

Ruta pratensis, cui flos capillaris, vt viti
sylvestri caustica, flor. Maio.

Ruta pratensis circa finem Aprilis

S

Sabina, flor. Apr.

Sabina fœmina rudimenta quædam ger-
minum exiguum ceu flosculos subluteos
in summis ramulis in Martio & Aprili o-
stendit.

Sabina

Sabina medio & fine Maij floret exiguis flosculis quadripartitis.

Sabina baccas profert Septembri, & Octobri.

Sabina flosculis exilibus, quadrangulis, albicantibus, flor. Iunij principio.

Salices incipiunt florere Martio, & Aprili mense, sed ante cæteras syluestris latifolia.

Saliunca in horto meo è montibus Vallesæ allata mensis Septemb. 7. flosculos ostendere incipit.

Salvia, flor. Iul.

Salvia nobilis, floret Iunio; communis etiam incipit florere medio Iunij, Iulio.

Sambucus Maij medio floret & circa finem eius, Iunio etiam: baccas fert Sept.

Sambucus montana vel rubra, floret Aprili.

Sambucus montana, Büchholzer/ acinis rubris, non in umbella, sed *Korpus* fert, in Iul. & Aug. maturescunt.

Sambucus aquatica Tragi, *Schwelchen*/ in fine Maij floret, & eadem floribus densis hortensi cultu.

Sambucus aquatica flore denso sterilis: item in sepibus nascens, flor. Apr.

Sambucus aquatica Tragi: fructum Septembri facit.

DE COLLECTIONE

Sampfucus, maiorana, flor. Iul.

Sanicula vulgò dicta, floret Maio & Iun.

Sanicula alpina, flor. Apr. & Iul.

Sanicula alpina, guttata, id est guttis sanguineis in flosculis albis, flor. Maio.

Saponaria vulgò dicta, quam Struthium aliqui malè nominant, floret in fine Iunij, Iul. & Aug.

Satureia, flor. Iul. semen fert Octob.

Satureia sed rara, flores simul & semina matura habet Octob.

Satyrium basilicum, quod palmā Christi vocant, (vti etiam Rieinum) mas, sine maculis foliorum floret Maio & Iunio.

Satyrium basilicum fœmina, maculosa folijs, Maio flor.

Satyrium basilicum alpinum flor. principio Iulij: Rûßfôlbly à colore fuliginoso? sicut & Brendle? Styracem olet calamitham.

Satyrium basilicum alpinum, Brendle à colore, rûßfôlbly, ab odore suauis puto, quo etiam rosas vincit. Rôlbly verò à figura flores in capitulum quasi clauæ coacti, floret Augusto.

Satyrij genus exiguum, in apricis montibus, flor. Iun.

Satyrij genus quoddam exiguum, autumnus

tumno appetente, floret in vliginosis campis, & pratis, Septembri nempe.

Satyrion trifolium Fuchſij, quod potius orchis species fuerit, floret Iunio.

Satyrionis genus quadrifolium, folijs angustis, floribus purpureis, paucis, odoratū, lactis quodam odore, vt genus quoddam meliloti, flor. Iun.

Satyrion Erythraicum Augustæ in horto Herwarti/ flor. Apr.

Saxifraga Fuchſij, floret Iunio, *Maurer* rauten, vere, & æstate inuenitur, potissimū autem Iunio, hanc ego adiantum nigrum dixerim, sed ea nunquam floret.

Saxifraga maior seu alba, cui radix multis granis orbiculatis compacta est, flor. Maio: Deinde statim euanescit.

Saxifraga alba in fine Iun. flor.

Saxifraga granata flor. albis, flor. Ap. Semen verò habet in fine Augusti, & Septem.

Saxifraga pinpinellæ similis, vel hircina minor & maior. Item maior alpina, purpurea umbella in Pilati monte, flor. Iunio, Aug. & Nouemb.

Saxifraga hircina pimpinellæ similis, maior & minor: & maior montana, floret in horto meo in Iul.

Saxifraga montana, radice alba, nodosa,

DE COLLECTIONE

quam nulli alteri compares nisi saniculæ albæ Hæstorum, aut ægoletthri radicibus initio: duplex est: alia folijs quinis, alia septenis, in vno coliculo, flor. Apr.

Saxifraga alba radicibus granulosis, floret Maio.

Saxifraga montana folijs quinis flore purpureo: alia septenis flore ex albo pallente, floret ad finem Martij in horto meo.

Saxifraga aurea Dodonei, flor. Apr.

Saxifraga aurea Dodonei florebat Feb. cum tepidior ille esset.

Saxifraga lutea, umbella parua, floribus albis sui generis, radicibus luteis, flor. Iul.

Saxifraga semen fert Nouemb.

Scabiosa, (trium aut quatuor generû,) floret in fine Maij, Iunio, & Iulio. Pauca florent Octob. & Nouemb.

Scabiosa læuis, flor. Octob.

Scabiosa læuis & hirsuta minor, floret Iulio.

Scabiosa læuis & hirsuta minor, insipida ferè & hirsuta maior in montibus florèt Augusto.

Scabiosa maxima incipit florere Iunij medio. Item communis læuis & media aspera, floret vt prima.

Scabio-

Scabiosæ

•Hirsuta folijs

Semper integris, in collibus & montibus, humidioribus locis.

Diuisis, in der spiraler wyfen alicubi.

Læuis, plenus est ager polij hac herba, flor. Iul. decimo simul omnes.

Scolymus, cinara, Artischock / floret

Iulio.

Scordium, floret Iun.

Scordium in horto meo, floret Iulio, &

Augusto.

Scorpioides secundum aliquos herba palustris odore borraginis, flosculis cæruleis, &c. vergiß nit mein / floret Maio, Iunio, & Iulio.

Scorpioidi palustri cæruleæ cognata herba, sed floribus albis, nec ita in se rectoris, floret Martio.

Scorpioides minus, in muris, fleiner vergiß nit min / flor. Apr.

Scorpioides Matthioli in horto meo, floret Iulio flosculis luteolis, binis, an semper?

Scrophularia maior, Brunwurtz / floret medio Maij. Vide Climenum.

Secale, Rocken / non (vt alij volunt) filigo, flor. Iun.

DE COLLECTIONE

Securidaca, flor. Iul.

Sedum, id est, semperuiua, & species eius vermicularis dicta, florent Iunio.

Sedum maius vulgare, flor. Iul.

Sedum minus (vulgare) album & purpureum, flor. Iul.

Sedum minus obtusioribus folijs, flor. Iunio.

Sedi genus tertium, illecebra, *Neuro pfeffer* / floret Maio.

Sedi montani genus, *fischjung* / floribus candidis, guttis sanguineis, vt sanicula alpina, flor. Maio.

Sedi vel Phylli montani genera quædam, vnum longè minimis foliolis in orbem circinatis candicantibus, flosculis albis. Et duo sedi minoris genera floribus croceis, maculosis perpulchris, flor. Aug.

Sferra cauallo Italis, floret Iunij principio.

Senecio, *freitgblum* / floret Martio, Aprili, Maio, Iun. Iul. Octo. Nou. & Decemb. initio: In vineis Febr. Semen facit Octob.

Serpillum, flor. Iul. Aug. Septemb.

Serpilli quædam genera, odore inter se differentia: alia pilosa, albi ora, alia glabra, alia sature iam odore refert quàm proximè & acrimonia ferè: quædam marginibus foliorum

rum punicañtibuſ, florebat Iunij initio.

Serpillum acinarium, Moosbeere/acinis rubentibus, ſubacidis, aſtringentibus, floret Maio. Incipit autem eodem tempore in paucis à ſuperioribus fructus ſe oſtendere.

Sefamoides Anglor. flor. Maio.

Sefelis genus in pratis paluſtribus, floret Aug.

Sefeli montanum, ſemen fert Aug.

Sideritidis vel geranij ſpecies, herba Roperti, Iulio floret. Herba Iudaica. (Cognata ei quædam ex loco umbroſo, vß dem Gard/ in horto meo, caule quadrangulo, graui odore, floribus purpureis, tanquam vrticæ mortuæ dilutioribus.)

Sideritis prima quæ & Tetrakit, in aruis, floribus albis, flor. Aug.

Sideritis prima Matthioli : lancea Chriſti, flor. Iul.

Sideritidis ſpecies, gratia Dei, flor. Maio, & Iunio, & Octob.

Sideritis prima, Vide Lancea Chriſti.

Sideritis, Blütwurtz/ floret Maij medio, & fine.

Silybus in montibus, äberwurtz/ floret Iulio, & Aug.

Sinapis duo genera Fuchſio, florent Iulio.

DE COLLECTIONE

Sinapi sylvestre vel lapsana floribus luteis in aruis, flor. Iun.

Sinapium sylvestre quoddam luteis floribus, floret Maio.

Sisarum hortense, flor. Iul.

Sisarum sylvestre Fuchsi, wildpasteney/ floret Iulio.

Siser, girgelin/ semen facit Septemb. maturescunt Octob.

Sisymbrium capitulis purpureis & albis, flor. Aug.

Sium, cardamine, Brunnenfressich/ floret Augusto.

Smilax hortensis, id est phasiolus, floret Iulio.

Smyrnum vulgo Libisticum, flor. Iul.

Solanum, floret Iulio, Aug. & Septemb.

Solanum commune & lignosum semen habet Nouemb.

Solanum perpetuum vulgò dictum aliquibus, te lenger te lieber/ cui flores cœrulei, acini rubri, fortè Malacocissus, floret Maio, Iunio, Iulio, & Augusto, semen facit Aug.

Solanum vesicarium, halicacabus, alkekengi, flor. Aug.

Solanum Indicum, floret medio & fine Iulij strychnodendron ad aquas stantes ferè.

Sola-

Solanum pomiferum, poma amoris vul-
gò, flor. Aug. Iul. Iun.

Solanum syluaticum, baccæ una cum flo-
re, Aprili.

Solanum syluaticum tetraphyllum, non
propagat sese in horto, flor. April. & princi-
pio Maij Früglebraut.

Solanum somniferum vulgare, schlaaff-
beere/ flor. principio & medio Iulij.

Solani somniferi genus, flore purpu-
rascente, cauo, instar calathi, vt hyoscyami fo-
rè, floret Maio.

*Solidago Saracenica heidnisch wunde-
braut*/ flor. Aug. Virga aurea. Species eius a-
lia maior neruo folij p uniceo, &c. in monte
prope Sergans, flor. Aug.

Sonchus vterq;, Iunio, & Iulio floret, ci-
cerbita, gensdistel.

*Sonchus agrestis marginibus foliorum
aculeatis*, Augusto mense semen & flores e-
mittit, semen fert Octob.

Sonchi genus quoddam syluestre, pro-
cerum, luteis floribus, subdulce, in horto
meo, folijs non dissectis, angulosis, totum læ-
ue est, id est sine aculeis, flor. Aug.

*Sonchi species, terra crispa, lactuca syl-
uestris* Gal. flor. Iun.

Sonchi vella lactucæ syluestres, flor. Nou.

DE COLLECTIONE

Sonchi species lævis, floribus lactuæ paruis, luteis : herba est odore grauiore quā aliæ huius generis, frigidior scilicet, in muris nascitur, floret in fine Iunij, & Iulio.

Sonchi species, *mulden*/flor. Iul.

Sonchus pinguis, caulibus & neruis rubicundis, floret & semen facit Octob.

Sorbus, fructum fert Septem.

Sorbus torminalis, quam Tragus pingit, fructum fert Octob.

Sorgi, *welscher hirs*. Panicum Indicū vocant Parisijs, Iulio, & Aug. floret.

Spatula foetida, quam aliqui veterum xyrin esse coniiciunt, flor. Aug.

Spica nardi herba vulgò dicta, flor. Iun.

Spina ceruinā, flosculis viridibus circa novos furculos conferctim erumpentibus, odoratis, odore fragorum ferè perquam suaui, flor. Maio.

Spinæ ceruinę acini leguntur, messis tempore Iul. mense, ad croceū colorē: autumno (initio Septem.) ad viridem: circa D. Martini diem, ad puniceum.

Sphondylium, floret Iunio, Aug. Vide Branca vrsina.

Spina alba vulgò quam eruditi oxycantham putant, floret initio Maij.

Spinæ albæ species Fuchsis, vulgò carduus

duus Mariæ, stechfrut/floret Iunio & Iulio.

Spina alba Dioscoridis, cardui genus, semen habet Augusto.

Spina alba quorundam fructu echini marini specie rotunda, floret Iulio.

Spina solstitialis, &

Spina citrina, Argentinæ in horto D. Didymi Obrechtii, floret principio Iulij.

Spina appendix, frutex spinosus, quem aliqui oxiacantham putant, vulgò spina alba dicitur, *μυῖσδο:n*, Augusto fructificat, Septemb. & Nouemb.

Spinachia olus, floret Iunio.

Stachys herba alba, hirsuta, odorata, marrubio congener, locis siccis & asperis nascens, bicubitalis ferè, caule quadrato, subacris, nulla verò amaritudine, quam suæ Stachyi Galenus tribuit, marrubio congenerem esse figura odorq; ostendunt, *μυλίζει γὰρ πῶς τὴν ὁσμὴν ἰμοίως τῇ πρασίῳ*, descriptio Dioscoridis planè cum hac herba facit. Habet non modò verticillos vt marrubium, sed stachyn quoq; id est spicam supra in qua flores partim albi, partim purpurei, figura ferè vt in vrticæ mortuæ floribus, minores, floret Iulio.

Stachys Fuchsi, *Riechender andorn*, floret Iun.

DE COLLECTIONE

Staphisagria, floret Iulio.

Stichas, floret Iunio.

Stichas citrina, quam aliqui stichadem veterum, alij ageraton esse putant, Reinblümen, floret Iulio.

Stramonium, folio oleracio, grauis odoris, vt venenatae herbæ frigidæ. Flos conuulsiui, maior candidus: suaui odore nescio quali, medicato, alijs nuxmethel dicitur: Augustæ etiam albo flore reperiri audio, floret Aug.

Symphytum maius April. floret: semen Augusto fert.

Symphytum alterum, floret Maio, Iunio, Iulio, walswurtz.

Symphytum alterum minus flore cæruleo purpurascente, Glaumer augentrost. V. Pulmonaria, floret April.

T

Tamarix myrica, floret in vere, Iun. pappos verò suos fundit, in quibus nimirum semen continetur, Septemb.

Tanacetum, floret Iulio & August. semen fert August.

Tanacetum fatuum, floret in fine Iunij.

Tanacetum minus dixerim, quòd Basileæ circa Birsam nascitur, locis arenosis, odore

&

& sapore tanacetum referens, imbecillius tantum: umbellis ad millefolium accedit. Ramosa est herba, multis ab vna radice caulibus, cubitalis ferè, folia quoq; nonnihil ad tanacetifolia accedunt, minora. Flores sunt minuti albicantes, radix lignosa, fibrosa. Meminit eius Tragus in millefolio & tanaceto, ambigit inter vtrumque, floret Iunij initio.

Tarchon, floret Iulio.

Tarchon sylvestre serratis folijs, floret Iulij medio.

Taxus floret Martio: Acinos rubros umbilicatos fert Sept.

Telephium, id est, crassula maior seu faba inuersa, vt quidam interpretantur. Sed mihi diligenter conferenti Telephium Dioscor. (quod caput in veterib. exemplaribus non legitur) eadè planè herba cù tertio sedi genere (Maurpsäffer) illecebra siue portulaca sylvestri (quod nomen vtriq; tribuitur) esse videtur. Cæterum faba inuersa fortè fuerit epipetron Aristotelis, quod lib. 4. cap. 5. de partibus animal. etiam absolutum à terra, & suspensum diu viuere scripsit, & Hippocrates in lib. de vlceribus, vbi Cornarius non rectè ligustrum transtulit. Hippocratis locum citat Galenus libr. 4. Methodi, epipetro sic candi vim tribuens, vt doctissimus medicus

DE COLLECTIONE

Michael Alysius nos admonuit. Eadem & Anacampseros Plutarchi in libro de facie apparente in orbe Lunari mihi videtur, quā ait euulsam etiam virere & germinare adhuc: id quod facit ferè cacumine reflexo, nimirum quia paulatim siccatur, & ceu spasmus conuellit, ut inde veluti amoris etiam redeuntis seq̃; reflectentis vim quandam habere superstitiosè existimata sit. Aniculæ nostræ talem vim vocant *widerthon*, ut in Adianto Apuleij. Hoc est quod Plinius dicit, vi anacampserotis herbæ amores vel cum odio depositos redire. Varinus quoq; meminit, apud Plutarchum non rectè anacampseros legitur. Nec aliud apud veteres reperio.

Thalictrum, Aprili floret.

Thlaspi quod Matthiolus pingit, bursæ pastoris dictæ planè similis herba, ut pro ea fallere legentem possit, adeò floribus, folijs, fructu & magnitudine totaq; specie illam representat, sed gustu acri: floret Iunio. Aliud est thlaspi Syluij, quod alliū redolet. Thlaspeos folia non sunt incisa, ut bursæ pastoris adultæ.

Thlaspi Lucæ Gyni, amarum, floret Iulio in horto meo, Augusto & Octobri.

Thlaspi verum Tragi in aruis nascens, folijs cauli adhærentibus, ut in sesamo, vnicaulis, &

le, & alterum multicaule in hortulo nostro, floret Maio.

Thlaspi allium redolens vnicaule, idem fortè Tragi, Maio floret.

Thymelææ genus illud (Zylānd) & Februario & Martio floret, nisi nix impediāt.

Thymelææ generis quod nostri Zylānd vocant, baccae Septemb. rubent, cum florem Februario ædat, vt nulli fortassis fructus à flore tardius perficiatur.

Thymelæa, vide Daphnoïdes.

Thymus, huic flos etiam pro semine est, Maio & Iunio floret.

Tilia vr̄bana, circa diem D. Vrbani (qui est Maij 25.) floret, syluestris tardius quàm satiua.

Tilia vr̄bana: nam syluestris sterilis est, Augusto fert semen.

Tithymalli quidam, vt helioscopius, & myrsinites, floret Februario.

Tithymallus myrtites, principio Aprilis floret.

Tithymallus folijs myrti ferè subhirsutis, vnicaulis in aruis, alibi multicaulis, floret Maio.

Tithymalli species myrti folio, floret Iun.

Tithymalli genus paruum in cultis nascens, quibusdam peplus videtur, floret Nemb.

DE COLLECTIONE

Tithymallus minimus flores & semina ostendit Augusto.

Tithymallus heliotropius, floret Octob.

Tithymalli heliotropij semina in medio Nouemb. nondum matura reperi.

Tithymallus Helioscopius, floret principio Decemb.

Tithymallus Paralius albicans, in horto meo, floret Iun.

Tomentum (vulgaris herba) floret in horto meo Iul. medio.

Tormentilla, heptaphyllum serò apparere incipit, & cum iam vites florent, Iunio floret.

Tormentilla, floret Iul. Aug. semen fert Augusto.

Tormentilla, vide *Heptaphyllum*.

Tribulus terrestris in hortis satus, floret Iun. & Augusto.

Trichomanes, carpitur estate, & autumnii initio.

Trifolij pratensis tria genera, florent Iun. Maio, Octob. & Nouemb.

Trifolium pratense album, floret Iun. Augusto. Sept.

Trifolium pratense purpureum, floret Iunio & Aug.

Trifolium, steinflee (sapore medicæ) luteis
Tri.

floribus, nullo odore, flor. Iul.

Trifolium odoratum Fuchsj, quod Matthæolus ineptè cytisum facit, omninò est Lotus, siue satiua, siue potius sylvestris: vide supra, Lotus, florèt Iun.

Trifolij species alta, inodora, florum corymbis flauis, circa aggeres & dumeta, nitroso sapore, folijs in summo tantùm incisis, floret Iunio.

Eiusdè m puto species alia in horto meo sata, est Medica, flore violaceo, floret Iun.

Trifolium asphaltites, floret Iunio & Augusto.

Trifolium asphaltites verum. Primo quo nascitur anno, floret Iul.

Trifolium acre maculis foliorum, & ipsum albis, aliquando nullis puto, in collibus siccis & aruis aliquando, floret Iun.

Trifolij genus calidius & tenuiorum partium flore purpureo, rariore (folijs minus latis nec maculosis) aliquando per ambitum purpurascens, acris in gustu, calidis in tertio gradu, nascitur in collibus, itemque aruis, floret in fine Iunij.

Aliud genus in area mea (Medica est) floret Iunij fine, folijs mucronatis parum, post medium serratis, flosculis purpurascens, sapore nitroso.

DE COLLECTIONE

Trifolij species floribus purpureis ad cœruleum inclinantibus per corymbos quinis aut senis, aliquando nouenis aut pluribus inodora, folia leuiter post medium serrata, Medica est, floret Iunio.

Trinitas, das guldin lärerfraut/alba, cœrulea, maior & minor, floret Februario.

Trinitatis (vt Itali vocant, nostri Hepaticam auream) flo. rudimenta, cœruleo colore proximè terram se ostendunt Decemb.

Triticum, floret Iunio.

Triticum vaccinum, Brand/Füwetzgen, a Trago descriptum, inutile medicinæ, vitium tritici, floret Iulio.

Tussilago, Martio floret & etiam Feb. & Aprili.

Typha, Fnospen, floret Iulio, herba nascēs in locis palustribus, gladioli aquatici folijs. Vocant autem locum palustrem Græci *τιφες* per iota, & sic typha etiam herba scribi deberet, nisi fortè differentię gratia à typha tritici genere per y scriberetur.

V

Valerianæ diuersæ, vna plantaginis folio, odoratissima, floret in Alpibus nostris, Iul.

Valeriana minima, semina fert in fine Maij

Maij cauliculis pedalibus cauis.

Valeriana, vide Phu.

Verbascum, floret in fine Innij, Iulio & Augusto: Germanis wulfrant.

Verbascum murale, in muris ciuitatis nostræ flores lutei in pappos soluuntur, vt in Conyzis in corymbis, floret Aug.

Verbasci genus apicibus purpureis, floret Aug.

Verbascum similis herba in muris nascens, flore luteo, &c. in nullo vsu, floret Sept.

Verbenaca supina, vt ego nomino, consolidam quibusdam dicta, flore cœruleo, blauw oder guldin gunsel, floret Maio & Aprili.

Verbena, floret Augusto & Sept. semen fert Octob.

Verbena fœmina seu supina Fuchsij circa canis ortum floret, & colligi debet. Item verbena recta & mas floribus luteis, sed aliquando citius. Sed posterior erysimi herbæ potius, aut sinapis similitudinē (nasturtij, erucæ) genus syluestre fuerit: nā cum verbena nihil commune habet.

Verbena lutea Fuchsij, floret Aug. & Sep.

Verbena altera Fuchsij, floret Iun.

Verbena alba in locis vmbrosis, flor. Iul.

Verbena quædam rarior (è prouincia)

DE COLLECTIONE

pulchrior & maioribus floribus, si bene meminimus, floret Iul.

Veronica, Erenbryß, floret Iunio.

Vetonica, floret Maio.

Vetonica, vide Betonica.

Viburnum: vide vitis sylvestris, floret Augusto.

Vicia, floret Iunio.

Vicia minor, vogel wick, silique subrubre antequam maturescant, floret Maio. Tüben wick. Vicia maior, ist schier wie erbe, eodem floret.

Viciæ genus floribus flavis, vide Aphacæ. Viciæ quædam species (an Aphaca) angustioribus, longioribus folijs, locis humidis, floribus è cœruleis ferè, ad ripam lacus, floret Iunio.

Alia flore luteo, folijs binis: an orobus sylvestris? floret Iunio.

Viciæ sylvestres, florent Iun.

Vicia quædam sylvestris (circa sepes & alibi) floribus cœruleis, floret Iul.

Vicia montana, folijs latioribus, floribus subcœruleis, radice nigra. Vicia floribus rubicundis: Vicia sylvestris flore purpureo, florent Maio.

Vincetoxicum, vide Asclepias.

Violæ Martiæ purpureæ seu nigre odoratæ

ratæ & inodoræ: item albæ, quæ nigris præueniunt, florent. Mart.

Viola purpurea vel Martia, Iunio semen fert.

Violæ nigræ sylvestres, florent Aug.

Viola matronalis Fuchsi, alba, purpurea, punicea, quam aliqui bacharin esse putant. Fuchsius hoc nomen ad imitationem vocis Germanicæ, *frauen veiol*, effinxit, nos quòd circa pentecostem florere incipiant, vocamus *pfingstnâgels*, floret medio Maij, Iulio & Augusto.

Viola trinitatis vel septicolor, heptachr⁹, floret April. Maio, Iunio, Octob. Nouemb. Decemb.

Violæ purpureæ odoratæ, inodoratæ & septicolores dictæ, florent April.

Violæ inodoræ genus, quam vulgò Trinitatis appellant, à triplici colore florû, aliqui iaceâ, Iul. mense & flores & semina edit. Itali Trinitatem vocant hepaticam terrestrem.

Violæ inodoræ, quas nostri vocant septicolores, Iulio mense florent & semina proferunt.

Viola inodorata, quam septicolorem dicimus, floret Sept.

Viola multicolor inodora, floret Maio.

Viola quædâ anonymos inodora est, è vio

DE COLLECTIONE

laceo purpurea, inter fruges (Auicularia Syl
uij) floret Iunio.

Violæ genus inodorum, in aruis, albicās:
in hortis purpureum & maius colunt, floret
Augusto.

Viola flammea, vt quidam vocat, Caryo-
philli Indici vel Portugallici, floret Sept.

Viola dasypus, vide paulo ante in Clema-
tide.

Viola alpina, folijs asari minoribus: floscu-
lo cœruleo, campanulæ instar conglobato,
sed minutatim dissecto, floret Maio.

Virga aurea, solidago Saracenica, floret
Iulio.

Virga aurea, vide Solidago.

Virga sanguinea Plinij (quam aliqui cor-
num fœminam putant) Itali sanguanum vo-
cant, hertrygel, floret Maio & Iunio: semen
fert Septemb.

Viscum, veris initio floret.

Viscum baccas fundit Septemb. & Octo.

Vitis satiuâ floret Maio & Iunio, & quæ-
dam Iulio: locis verò calidioribus fructum
profert Iulio & Augusto, & Septembri.

Vitis alba & nigra, floret Maio.

Vitis Idæa, heidelbere, vt ego ex Theo-
phraستي descriptione interpretor, floret Ma-
io: acinos suos cum cerasis maturat mense

Iunio

Iunio & Iulio. Itemq; moosbery, vitis Idæa maior Suevis sic dicta.

Vitis Idæa duplex in alpibus nigra & rubra, cuius acini acidiores sunt, sine umbilico, maturescunt Augusto.

Vitis sylvestris caustica, nielen, quam & viburnum aliqui vocant, ab usu viendi. Galli viornam vulgò. Fuchsius non rectè vitem nigram facit, Iulio & Augusto florent: semē profert Augusto, Octob. & Nouemb.

Vlmus ante folia florem Martio producit, qui & fructus eius est.

Vlmaria, in fine Iunij floret: semen fert Septembri.

Vlmaria, vide Barba caprina.

Vnifolium palustre, läberblümly alicubi, semen Iulio fert.

Vrticæ, florent Iunio & Augusto.

Vrtica mortua flore purpureo, Martio floret.

Vrtica mortua, Binsaug, floret Aprili, & Augusto.

Vrtica mortua, floret Octob.

Vrtica mortua, Galliopsis, floret Decem. principio, & semen facit Augusto.

Vrtica mortua, Lamium, floret Maio.

Vrtica mortua, & cognata ei quædam in ripa lacus nostri, conceptaculis florum spi-

DE COLLECTIONE

no sis. Vim habet discutendi, floret Iul.

Vua crispa, Fruselbœere, floret Mart. April. Maio.

Vua crispa, Galli grossularium vocant, unde Germanica vox corrupta videtur, nimirum quod acini eius crassi quodammodo, hoc est, pleni, & solidiusculi sint, maturescunt Iunio: Fructui præpilantur reliquæ floris, etiam maturo.

Vua quercina circa radices quercuum, sub terra vere inuenitur, ut Christophorus Encelius obseruauit.

Vulneraria quædam corymbis florum luteis, dulcibus, glaucis quibusdam, non rectè. Flores sunt penè nunc gæle tubent röp fle/ha- senfle, floret Maio.

Vuularia siue campanula vulgaris, hales freut, alia quàm laurus Alexandrina, quam aliqui vuulariam vocant, floret Iulio.

Vuularia maior, flore intus piloso, ex cœruleo purpurascēte. Campanula, hales freut, floret Aug.

Vuularia minima, Blauwer angentrost: cuius flos calathi vel campanulæ instar, cœrulei coloris est, herba lactescit, nascitur in muris & locis saxosis, floret Aug.

Vuularia pratensis, B: une gloggenblumen, vide Rapum syluestre, floret Maio.

Vuula-

Vuularia illa quæ flores cœruleos habet, qui prodeunt è singulis per caulem folijs alternatim positis, multos verò & conferatos in summi caulis corymbo, floret Iun. Hæc puto humilior & pratensis est. Item altera maior, in horto meo, durat annos aliquot, radicibus puto se propagat, floret itidem Iunio.

Vuularia, vide Rapum syluestre petræū.

X

Xanthium, Lappa minor, Flein Fletten, semen habet Sept. & Octob.

Xiphion siue gladiolus, floret Iun.

Xiphium radice simplici Curio missum, floret Iulio.

Z

Zea, spelta, Zinforn, floret Iunio.

TABVLA SE.

CVNDA STIRPIVM NOMINA

LATINA ET GERMANICA

continens, quæ singulis mensibus
aut florent aut fructum
maturant,

IANVARIO FLORENT.



I frigidior sit, vt solet apud nos, nullæ
florent stirpes, nisi pauca forsan in
cellis aut hypogeis inclusæ: Sin tepi-
dior, circa finem eius aut florent, aut
florere incipiunt, eadem quæ Februario. Circa
medium huius mensis, locis præsertim apricis,
floret

Arthritica, cui flores singuli in singulis petio-
lis: hæc tepida serè hyeme tota floret, & inde vsq;
ad aprilem, Schlüsselblümle.

Chelidonium minus, Flein schellfrant.

FEVRARIO MAXIME CIRCA
finem, & locis calidioribus, florent.

Alfine, hennerdarm, albis flosculis.

Alfins cœruleis flosculis.

Arthritica, de qua in ianuario.

Arthri-

Arthritica communis syl.

Afarum, haselwurtz.

Bellis, MülLENblümen.

Buxus, Buchsbaum.

Chelidonium minus, klein schellwurtz.

Codiaminum.

Cornus interdum, thierlinbaum.

Coryli, haselstaud.

Consiligo, leißfraut.

Crocus montanus.

Elleborus niger, Christwurtz.

Erica montana.

Fragaria sterilis.

Fumaria, erdrauch.

Leucoium bulbosum, weiß Hornung Blümen.

Myagrus.

Petasites.

Saxifraga aurea, guldin steinBredh.

Senecio.

Tithymallus Helioscopius.

Tithymallus myrsinites.

Trinitas, guldin läber Fraut.

Tussilago, Roßhub/Brandlattich.

Zyland.

MARTIO FLORENT.

Alfine duæ species, hânendarm.

Anemone species, Anemon rôßlin.

Aristolochia phragmites.

Arthritica species.

MARTIVS.

- Arum*, teut scher pfäffer.
Azarum, Haselwurtz.
Bellis minor, Müllienblümlinlein.
Betonica Pauli Turnero.
Bulbus sylvestris, Ackerzwibel.
Bulbina minor & maior.
Bursa pastoris, Tschelkraut.
Caltha palustris, Mißblumen.
Clematis peruinca, Blauw vnd Braun syn-
 grün/yngrün.
Consiligo, Leüßkraut.
Cornus, Thierlinbaum.
Corylus, Haselstaud.
Crocus montanus.
Erica montana.
Fragaria minor sterilis.
Gramen duriusculum, Niedtgras.
Hedera terrestris, Gudelrüb.
Helleborus vterq;, weiß vnd schwarz Nieß-
 wurtz.
Herba trinitatis cœrulea, Denckenblümlin/
 oder Dreyfaltigkeit Blümlin.
Hepatica terrestris vel aurea, Guldi läber-
 frant.
Hieracium quoddam.
Hyacinthi genera quatuor, Hyacinthen.
Leucoion, Keiri, Gelbnegeli.
Leucoion bulbosum Theoph.
Mercurialis sylvatica.
Pentaphragillon minus, Klein fünffinger frucht
Persicus

Persicus armeniaca, Berillen.
Petasites, Pestilenzwurtz.
Populus, Sarchbaum.
Prunus sylvestris, Schlehdorn.
Pulmonaria, Lungenfraut.
Ranunculi genus primum, Ranensfuß/ Moß
 blumen. & *Ranunculi genus quartum*.
Ribes, S. Johans treibel.
Ruscus, Metißdorn.
Sabina foemina, Scuyboum.
Saxifraga aquatica.
Saxifraga montana.
Salices, Wydenboum.
Senecio, Creützfraut.
Taxus, Jbenboum.
Thymelæa genus, Zyland.
Thusilago, Rosshüb.
Viola martie diuerse, Violen.
Vlmus, Ulmerboum.
Vrtica mortua purpureo flore.
Vua crispa, Kruselbeer.

APRILI FLORENT.

Aegolethras, Bößblüm.
Allium vrsinum, Waldknoblauch.
Alliaria, Knoblauchfraut.
Alnus, Erlenboum.
Amomum falsum.
Amygdalus, Mandelboum.
Antirrhinum, flore cœruleo. Vians.

A P R I L I S

- Apij genus palustre.*
Aquilegia, agleyen.
Aristolochia phragmites.
Arthritica odorata, schlüßelblümen.
Arthritica alpina lutea.
Arthritica pallida.
Asarum, haselwurtz.
Asphodelus marinus, ein geschlecht der gold
wurtz.
Bellis vrbana & sylvestris, Müllen blümle.
Borrago, Burretsch.
Bryonia, hundstürbs.
Bulbine, Blaw meyen rößlin.
Betonica Aegineta.
Betula, Bircken baum.
Castanea, Festenen baum.
Chamæmalum, Chamomillen.
Calathiana verna, Brendel blüml.
Caryophyllata aquatica.
Cerasus omnis, Firsy baum.
Chameleuce Ruellij.
Chelidonium minus, Flein schell Fraut.
Clematis Aegyptia, Peruinca, Ingrün.
Consiligo, Leiß Fraut.
Crucis flores.
Consolida quædam, gungelen/Bugla.
Cruciata folijs in geniculis quaternis.
Cyanus montanus.
Cynocrambe Fuchsj, id est, Mercurialis syl-
uestris.

Christo.

Christophoriana.

Chamaebuxus.

Caros, Kümuch.

Cerisolum, Rörblyfraut.

Calceoli diuæ Mariæ.

Caltha palustris.

Daphnoides Fuchsj, Syländ.

Daucus quidam sylvestris.

Elleborus agyrtarum.

Elleborus vterq;, weiß vnd schwarz Nies-
wurtz.

Esula, pityusa.

Esula dulcis.

Fagus suis Iulis.

Fragaria, Erdberfraut.

Fungorum genera, Pfifferling.

Geranium primum, Storchenschnabel.

Geranium maius, vel montanum.

Gnaphalij genus, Mattenflachs.

Gramen vulnerarium.

Hederæ terrestris, Gündelrâb.

Hieracium minus, dens leonis.

Heliotropio congener, Vergiß mir nüt.

Hepatica terrestris, trinitas, guldyleberfrut

Iris, Blaw gilgen.

Lapathum hortense, magnum, Groß Lend-
wurtz.

Lapathi vel acetosæ species.

Leucoion bulbosum.

Leucoium luteum, Weiß negeli.

A P R I L I S.

Lugustraria.

Lilium conuallium, Meyenryßli.

Lilium Mariæ, vnser frauwen gilgen.

Lithospermion, Meerhirß.

Lunaria Græca.

Lunaria lutea, abyssos quorundam.

Mespilus, Meispelbaum.

Myrrhis, Wilderkerbsen.

Narcissus quorundam, quibusdam lilium diuæ virginis.

Nasturtium pratense, Wyssen Kressich.

Nasturtium petraeum.

Nux iuglans, Nußbaum.

Ocimoides purpureum.

Ornithogalum, Erdnuß.

Oxys, Saurenklee.

Pæonia mas, Peonien rosen.

Pentaphyllum minus.

Persicus cuiuscunq; generis, allerley pfer sich
bdum.

Petasites, pestilenzwurtz.

Phu minimū sylvestre, Baldrian gschlechter.

Phu paruum saxatile.

Pimpinella, Bibinell.

Polygonaton, Weißwurtz.

Populus nigra, schwarz Sarbachbaum.

Prunus, Kriechen ald pflaumenbdum.

Prunus sylvestris, Schlehdorn.

Pseudamomum.

Pulmonariæ Plin. species, Kleinwalwurtz.

Pyretrum,

Pyretum, Bertram.

Pyrus, Byrbaum.

Quercus, Eichbaum.

Quinq;folium minus.

Ranunculi genus, quod flores Martij appellant,

Mosblümen, hanenstüß.

Ranunculus alpinus, petræus.

Ranunculus hortensis.

Ranunculus syluestris albus, Fidertsche.

Ranunculus Sardonicus.

Ranunculus quem flammulam dicunt.

Ranunculus chamæmali folijs.

Ranunculus humilis.

Ranunculus pratensis.

Ribes vulgò dictum, Sant Johans treib-
bel.

Ribes syluestre, aquaticum.

Rosa Maij sine spinis, Meyenrößlin.

Ruta pratensis, thalictrum.

Ruscus.

Salices, Wydboum.

Sambucus montana vel rubra, Holder-
boum.

Sambucus aquatica.

Sanicula alpina.

Satyrion erythraicum.

Saxifraga aurea Dodonei, Steinbrech.

Saxifraga granata.

Saxifraga montana.

A P R I L I S.

Senecion, Creutz fraut.
Solanum syluaticum.
Symphytum maius, Schinärwurz.
Symphytum alterum minus.
Tithymallus myrtites.
Thymelæa.
Tussilago, Rosshüb.
Valeriana, Baldrian.
Verbenaca supina.
Vetonica, Graß blümen.
Viola heptachrus, matronalis, Winterviolē.
Viola purpurea odorata.
Vitis nigra & *alba* puto.
Viscum, Nistel.
Vrtica mortua, Taubneslen.
Vua crispa, Kruselbeer.
Vua quercina.

S E M I N A P R O F E R V N T & fructum.

Aristolochia phragmites.
Cyclaminum, Scurw biot.
Hepatica terrestris.
Nieß Beere.

M A I O F L O R E N T.

Abietes, Dannen.
Absinthij species, Wurmset.

Accr

- Acer maius*, Ahorn.
Acorus falsus.
Alismatis species, Archus Fuchsf.
Alliaria, Knoblauchkraut.
Allium alpinum.
Allium ursinum, Waldknoblauch.
Alfinc species.
Alysson Plinij.
Alysson Ruellij.
Anagallis aquatica, Wasserpungen.
Angelica inodora, Angelicken.
Angelica odorata.
Antirrhinum, Orianthe.
Aparine, Klebkraut.
Aphace Fuchsf.
Apij aquatici genus.
Aquilegia genera omnia, allerley agleyen.
Asclepias, Schwalbenwurz.
Asparagus, Spargen.
Argemone, Genseric.
Aristolochia clematis, Geschlecht der Oster-
 lucey.
Argentaria alpina.
Barba caprina.
Barba senis, Habermark.
S. Barbara herba.
Barba hirci, Bockebart.
Bellis maior, Mäulenblümlin.
Betonica, Battonicken.
Betonica Aegineta, Turnero.

M A I V S.

Ectonice species minor, Frießnägel.

Bistorta maior, Laterwurz.

Borrago, Buretsch.

Brassica, Rabiß/köl Kraut.

Bryonia, vitis alba, Hundstürbe.

Buglossus Italica.

Cacalia lutea.

Calceoli D. Mariae.

Caros albus & purpureus, Wyßkümich.

Caryophyllata urbana & sylvest. Benedicta
wurz.

Caucalidis species, caro similis.

Cerisolum, chærephyllon, Rô:bly Kraut.

Chamæcyparissus, Cypress.

Chamædry similis, Schaffkraut.

Chamæpithys, Je lenger je lieber.

Chamæsyce.

Chamæsyce flore unico, paruo.

Chelidonium maius, Großschelkraut.

Chelidonium alpinum.

Cheiri, Gälbe negeli.

Chondrilla.

Christophoriana, costus niger.

Chrysanthemon Fuchs. Hanensfuß.

Cicuta, Schirling.

Cicutaria minor.

Clematis purpurea.

Colytea Fuchs.

Consiligo, Leißkraut.

Cenuolulus arvensis, Geschlecht der windē.

Con=

- Convolvulus separius.*
Conyza alpina.
Cornus foemina, Thierlin bonm.
Cotula foetida, Hundsdill.
Cruciata rubrae congener, Gulde waldmeyer.
Cucumis erraticus. (ster.
Cyanus, Kornblumen.
Cyanus montanus.
Cynoglossa, flore puniceo, Gschlechter der hünde
Cynorrhodon. (Zungen.
Daucus Tragi.
Dictamnus vulgo dicta.
Digitalis Fuchs. Fingerhut.
Doronicum vulgo dictum.
Eruca hortensis, Weisser senff.
Eruca sylvestris Fuchs.
Eruca sylvestris nostra.
Eruca sylvestris foetida.
Eryngium, Raddestel/manstrenw.
Erysimon, Bederich.
Esula.
Esula scabiosa non floret.
Flos louis.
Fraga, alba, rubra, Erdbeere.
Fraxinus aucuparia.
Fraxinella.
Fungorum genus praecipuum, Pfifferling.
Genista maior, groß pfrimen.
Genistella, klein pfrimen.
Geranium, Blutwurz.

M A I V S.

Geranij genus secundum, Storchenschnabel.

Geranium montanum.

Gladiolus aquaticus.

Graminis genera diuersa, allerley grass.

Gramen Fuchsj.

Gramen collinum.

Gerontopogon.

Geum, Benediktenkraut.

Gratiola

Hedera terrestris, Gudelrebe.

Heliotropium flore albo, Krebskraut.

Hieracium, Habichtkraut.

Hyoscyamus vulgaris, Bilsamkraut.

Iberis, Hauchblum.

Illecebra, Maupfester.

Iris, Blaugilgen.

Iris minor sylvestris.

Isatis sylvestris, Wilderweyd.

Iuniperus, Weckholterstaude.

Lampisana, Wildsenffkraut.

Lantana frutex Italorum.

Lapathi genera 4. Lendywurzen/grind-
wurzen geschlechter.

Lathyrus, Springkorn.

Lens palustris, Meerlinse.

Leucoion, Keiri, Gelb negelt.

Leucoium puniceum.

Leucoium roseum.

Leucoium album.

Ligustrum, Beinhülzen.

Lilium

- Lilium conuallium*, Meyenrößlin.
Lilij genus, quod pro *Asphodelo* usurpatur.
Lilium rubrum, Rottgülden.
Lilium aquaticum.
Lingua herba, Mäterzung.
Limonium nostrum.
Lithospermon, Nieerhirß.
Lithospermon minus.
 Vnicaule
 Multicaule.
Locusta, Müßlefraut.
Lunaria Græca, Monefraut.
Lunaria, Flublumen/gäl.
Lunaria montana,
Lunaria lutea.
Lupinus, Feigbaum.
Malorum genera, Villerley öpfelbüm.
Malua sylvestris, Wildpapelen.
Medica cœrulea.
Meliloti sylvestris species, Wilderstein flec.
Meliloti inodori species.
Melissa Fuchsi.
Melampyrum, Rurweysen.
Mercurialis, Scheißkraut.
Mercurialis sylvatica.
Millefolium aquaticum.
Moschatella Cordi.
Myagrus, Flachdotter.
Myrrhis, cicutaria, Wilderhößfel.
Narcissus, Tarcißen blümlin.

M A I V S.

- Nasturtium, Kressich.
- Nasturtium palustre, Brunenkressich.
- Nigella, Schwarzkümmel.
- Nummularia, Pfennigkraut.
- Nux vesicaria, Dimpfknäuel.
- Nymphaea utraq;, Seebäumen.
- Ocimoides rub. alpinum.
- Ocimoides album.
- Olusatrum.
- Orchis genus bifolium, geschlecht des Enan-
benkrauts.
- Orchis herbae genera quedam.
- Orchis genus rarum,
- Orminum sylvestre, Wilderscharlach.
- Orobanche nostra.
- Oxalis, Saurampferen.
- Oxyacantha, Erbselen.
- Oxys, aleluia, Sauwölkchen.
- Peonia, Peonien.
- Papaver cornutum, Gehdinter Magsamen.
- Paris herba, Wölfsbeere.
- Parthenium, Mutterkraut.
- Pecten veneris.
- Pelecinus sylvest.
- Pentaphylli tria genera, Waldwinden.
- Periclymenon.
- Peplus, Teufelsmilch.
- Peucedanum.
- Phu, Baldrian.
- Phyllirea nostra, Kerngerten.

Picaster.

Pilosella maior & minor, Nagelstrauch.

Pimpinella, Bibinell.

Plantagines, Wegerich.

Polygonatum, Weißwurtz, vtrung.

Polemonium.

Polium nostrum.

Porrum, Lauch.

Prunella vulgaris, B:annellen.

Pseudochamaedrys, Gamenderly.

Pulmonaria Gallica, Lungenkraut.

Quinq; folium minus, Fünffingerkraut.

Quinq; folium aquaticum.

Ranunculi genera hortensia et sylvestria, aller

Raphanus maior, Rettich. (ley benensfuß.

Rapi sylvestris genus.

Rapunculi syl genus, flor. caeruleo.

Ribes vulgò dictum, S. Johans treübel.

Rosa, Rosén.

Rosa minor, Meyenrößlin.

Rosa alba, Weißrosen.

Rosa incarnata, Leybsfarbrosen.

Rosmarinus, Rosmarin.

Rubia minor, & syl. zame vnd wilde rötte.

Rubus humilis, Aiderbrombeerstauch.

Rubus idaeus, Hindbeere.

Ruta, ruta pratensis, Rauten.

Sabina, Senybaum.

Sambucus aquatica Tragi, Bolder.

Sanicula guttata, alpina, Sanicel.

MAIVS.

Sanicula.
Sanguinea virga.
Saxifraga alba, Wyßer steinb: ed.
Satyrium basilicum.
Scabiosa, Apostemfrant.
Sclarea sylvestris.
Scorpioides, Vergiß miß nit.
Scrophularia mas, B: unwurtz.
Sedum genus tertium, Maupfäffer.
Sedum mont. Fischzung.
Serpillum acinarium, Moosbeere.
Sesamoides Anglor.
Seseli genus, Bärwurtz.
Sideritis, gratia Dei, Gottes gnad.
Sideritis. Blüt wurtz.
Sinapium syl. Wilder senff.
Spina alba, oxyacantha, Erbselen.
Spina ceruina.
Spina appendix.
Soloni genus syluat.
Solanum soniferum.
Symphytum alterum.
Thlaspi alterum Tragi, Wilder kreßsch.
Thlaspi allium redolens.
Tilia urbana, Cindern boum.
Thymus, Thym.
Trifolium pratense, Wyßen flec.
Trifolium, Bibertlec.
Valeriana minima, Baldrian geschlecht.
Valeriana saxatilis.

Veneris peecten.
Verbenaca supina, guldin gunsel,
Veronica, Ehrenbreys.
Vetonica syluestris, Miltwill.
Vicia flor. rubicundis, wicken.
Vicia montana.
Vicia syluest.
Vicia minor, vogelwick.
Viola Alpina.
Viola matronalis, pfingstnägele.
Viola multicolor.
Viola trinitatis, dencfenblümle.
Viola alba & nigra, Violen.
Virga sanguinea, cornus fœm.
Vitis, weynrâb.
Vitis idea, Heidelbeer.
Vnifolium.
Vrtica mortua, taubnessel.
Vulneraria, hasentlee.
Vua crispa, fruselbeer.
Vuularia pratensis, Brune glockenblümle.

M A I O SEMINA FERUNT.

Acgolethros, Bößblüm.
Asarum, haselwurtz.
Cerasa, Kirsche.
Fraga, Erdbeere.
Ranunculus Sardonius.
Saxifraga alba, weysser steinbrey.

I V N I V S.

I V N I O F L O R E N T.

Abfinthium commune, Wurnez.

Abietes, Tannen.

Aconitum luteum, caeruleum, flauum, Wollfe
Wurz.

Acorus vulgaris, Gälb wassergilgen.

Alcea, Rouvoenzar.

Alliaria, Knoblauchkraut.

Alfina italica.

Alfina species, Beñendarm.

Amaracus, Mayoran.

Anagallis, Gauchheyl.

Anagallis aquatica, Bachpungen.

Anagallis rubro flore, Gauchheyl mit roten
Blümen.

Androsomon, Unser fromwen Bettstrouw.

Anethum, Dill.

Antirrhinum purpureū, album, Sterckkraut
mit roten Blümen.

Antirrhinum folijs hyssopi.

Antirrhinum aruense, Großer süßer Flee.

Aphaca species, S. Chustoffelskraut.

Apios quorundam, Erdnuß.

Apium, Garten eppich.

Apium montanum, Berg eppich.

Argentaria.

Arthemisia tenuifolia, Wildereypreß.

Arthritica alpina, Geschlächt der schlüssels
Blümen.

Aristo.

Aristolochia clemat. Lange osterluccey.

Asclepias siue hirundinaria, Vincetoxicum,

Schwalmenwurtz.

Ascyrhoides, Gschlächht des S. Johannis

Aspergula, Kläberkraut. (kraut.

Asphodelus, Goldgilgen.

Astrantia, vulgò Laser.

Astrantia nigra, Schwartzmeisterwurtz.

Atriplices, Burchharts Freüter.

Auicularia Syluij.

Auena, Haber.

Ballote, Strickender andorn.

Barba caprina, Ymbenkraut.

S. Barbare herba, Weysser senff/S. Bar-
blenkraut.

Bellis maior, Geyßblümen.

Bellis albus & ruber, Weysser/rote müly-
Blümlv.

Betonica altilis, Betonien/Graßblümen.

Betonica foetida.

Bistorta, Waterwurtz.

Elattaria Fuch. Gschlächht des wullkrauts.

Blitum, Meyer.

Blitum rubrum, Rotmeyer.

Botrys, Traubenkraut/Frottenkraut.

Branca ursina, Bärenflaumen.

Bryonia, Schmärwurtz/hundstürbo.

Bulgossium min. & ma. Ochsenzungen.

Bursa pastoris, Teschelfkraut.

Cepa, Zwiebeln/Böllen.

Calamintha, Steinmüntz.

IVNIVS.

- Calendula, Ringelblumen.
- Campanula cœrulea, Jäpfelkraut.
- Cantabrica quorundam.
- Cardiaca, Herzkraut.
- Caros vulgò Carui, Weyssen Kümmich.
- Carduus arvensis, Haber distel.
- Cardui genus maculis albis.
- Carduus palustris.
- Caryophyllata, Benedictenwürtz.
- Cassutha, cuscutha, Filzkraut/flachs syden.
- Centaurium minus, Tausendguldenkraut/
Erdgall.
- Chamaedrys vera, Gamanderlin.
- Chamaecyparissus, Cypreßkraut.
- Chamaepithys, Ye lenger ye lieber.
- Chamaemalum.
- Chamaemalum nobile, Chamomillen.
- Chelidonium maius, Schellwurtz.
- Chrysanthemum Fuchsij.
- Chrysanthemum verum, Goldblum.
- Cicuta, Schirling/falberborn.
- Cicutarie quedam.
- Cichorium, Wägwurt.
- Clymenum vtrunq;.
- Condrylla, Wild Endiuien.
- Consiligo, Weißkraut.
- Conuoluulus minor, Winden/zaunglog-
gen.
- Conyca species, Dürrewurtz.
- Conyza collina.

Corcho

Corchorus, Gauchheyl.

Coronopus, Krayenfuß.

Costus hortensis minor, Costwurtzel.

Cotyla foetida, Hundtsdill.

Cucumis anguinus, Gschlächt der Cucumeren.

Cyanus mont. Gschlächt der Fornblümen.

Cymini sylvestris genus, Ritterspöly.

Cynoglossum, Hundtzung.

Daucus sepiarius.

Dauci tria genera, Wilde rüblin.

Dentillaria, aliquibus Schuppenwurtz.

Digitalis Fuchsij, Fingerhüt / fingerkraut.

Dipsacus albus & purpureus, Kartendistel.

Doria herba.

Dulcis radix, Süßholz.

Ebulus, Artich.

Echion, Wilde chsenzung.

Eruca syl. Wilder weyßer sänff.

Erysimon Fuchsij, Roderich.

Erysimon hortense.

Faba, Bon.

Filius ante patrem, Schoßkraut.

Flos louis, Rimmelrößly / Marienrößly.

Flos Portugall. Indianische nägele.

Iæniculum, Sänchel.

Fumaria, Erdrauch / rote taubenkröpfle.

Fungi, Pstifferling.

Gallion, Gälb angentrost.

Genista minor, Pfingstblümen.

IV N I V S.

- Gentiana*, Entian/Bitterwurtz.
Gentiana species, Madelgeer.
Geranium, gratia Dei, Gottes gnad.
Geraniū montanū, Gschlächter der Storchenschnabel.
Gladiolus, xiphiū, Klein Blauw schwertel.
Gramen minus.
Gratiola minor.
Helxine cyssampelos, Winden.
Heptaphyllon, tormentilla, Tormentill.
Hieracij genus in pratis, Habichkraut.
Hirci barba, Habermarck.
Hyoscyamus cōmunis & Syriacus, Bilsam.
Hypericum minus, S. Johannis kraut.
Iacea, D. Iacobi herba, S. Jacobs blüm.
Iasminum, Veielträben.
Ibiscus, Ybschen.
Intubus sativus, Endintien.
Iulia Italis dicta.
Lactuca sylvest genus procerum, Wilder late.
Lagopus, Katzenflee/hasenpfädlin. (rich.
Lampsana flore luteo, Wild senffkraut.
Lantana Ital. Kleiner mälbaum.
Lathyrus, Treybßner/springßner.
Lauendula, Lauendel.
Lens, Linse.
Lepidium Aeginetæ, Art deß sänffokraut.
Ligustrum, Kerngert.
Lilij genus montanum, Art der gilgen.
Liliū albū, crocēū & rubrū, Allerley gilgen
 gschlächter. Lina

Linaria, Leynfrant.

Linum, Flachse.

(brech.

Lithospermum, Meerbirß/weyßer stein-

Lotus inodorus floribus luteis, Ein flec-

schläch.

Lotus syl. Stundfrant.

Lunaria Fuch. Gschläch des Monatsfrant.

Lupinus, Feygbonen.

Lichen hepatica, Stein läberfrant. (frant.

Lysimachia flaua, Gälber weiderich/ schoß

Lysimachia purpurea, Roter weiderich.

Malua, syl. maior.

Malua magna, Ernrosen.

Marrubium, Lungenfrant/ erliche läber-

frant.

Medica sylvestris & hortensis, Art der flec.

Melampyrum, Růweißen aliquibus.

Melilotus inodora, alba, Steinflec.

Melilotus crisp.

Melilotus agrestis.

Melissa Fuchsij, Melissen.

Ment. astrum, Wilde müntz.

Mercurialis, Scheyßfrant.

Millesolij species, Garb.

Millefolium commune.

Myrica, Tamarisc.

Myrrhidis species, Art des wilden peter-

lins.

Narcissi species, Unser frouwen gilgen.

Nardus vulgaris.

I V N I V S.

Nasturtium, Kressich.
Nigella coronata, Schabab.
Nymphaea vtraq;, Seeblümen.
Noli me tangere, Springfrait.
Nummularia, Pfännigfrait.
Ocimum Tragi, Heydenkorn.
Ocymon Basilicon, Basiliën.
Ocymoides album.
Ocymoides rubrum.
Ocymoides croceo flore.
Oenante, Roter Steinbrech.
Olea, Ölbaum.
Ononis, Ochsenb:ä;ch/heumhechel.
Orchis, Unser frouwen trähen.
Origanum commune, Hochen costeng.
Orminum vtrunq;, Scharlach.
Ornus, grosser Nälbaum.
Ophris Fuchsi, Sweyblatt.
Panaces Chironium, Sonnenblümen.
Papauer Erraticum, Kornrosen.
Papauer triplex, Nagsaamen gschläche.
Parhenium, Mütterfrait.
Pastinaca erratica umbellis luteis.
Pentaphyllum erectum, Fünffingerfrait.
Perfoliata rubra.
Perfoliata, Durchwachß.
Perforata, Androsæmon, S. Johansfrait.
Periclymenon, Späckgilgen.
Persicaria maculosa, Flöhhfrait.
Pes leonis, Sinnauw.

Phœnix

- Phœnix*, Kotten wilden haber.
Phalangium, Wilde grasß gilgenli.
Phu (maius) *Dioscor.* Balduan.
Pilosella maior & minor, Nagelkraut.
Pimpinella, Bibenell.
Pyrola, Wintergrün.
Pisum, Erbe.
Plantago maior aquatica, Wasserwägerich.
Polygonum Fontanoni, Lidweyß.
Polygonum viscosum.
Polium commune, Feldpolium.
Porum sectium, Louch.
Portulaca, Bürtzelkraut.
Polytrichon Apuleij, Guldwidertthon.
Polygonum, Wägggrasß/wäggtritt.
Prunella, Braunnellen.
Pseudochamaedrys, Schaeßkraut.
Pseudonardus.
Pseudomelanthium, Katten.
Ptarmice, Nüßterwurtz.
Quinq; folium, Fünffingerkraut.
Ranunculi diuersæ, Allerley moosßblumen/
 hanenfuß.
Raphanus, Kettich.
Rapistrum flore albo.
Rapum syl. Rapungzly.
Rhaponticum spurium.
Rhododaphne nun. Shürkraut.
Rosa, Roosen.
Rubia syl. species, Eschlächter der rōte.

Rubus, Brombeerstaud.

Rubus Idæus, Hindbeere.

Ruta, Kaurten.

Sabina, Sennybaum.

Salvia nobilis, Edle salbey.

Sambucus, Holder.

Sanicula, Sanickel.

Saponaria, Weschfrait.

Satyrion trifoliū Fuchsj, Eschlächter der Enn
benfrait.

Satyrion basilicon quadrifolium.

Saxifraga Fuchsj, Maurtrauten.

Saxifraga pimpinella similis.

Scabiosa, Apostemfrait.

Scabiosa maxima.

Scordium, Wasser Gattennig.

Scorpioides coeruleum.

Scrophularia maior, Brauwurz.

Sedum, Hauswurz.

Sedum minus, Kleinfrait.

Senecio, Creutzfrait.

Sphondylium.

Syderitis, Gottognad.

Sinapi, Sänff.

Sinapi syl. Wilder Sänff.

Solanū perpetuū, Ye lenger ye lieber.

Solanum pomiferū, Nachtschatten.

Sonchus vterq;, Gens distel.

Sonchus levis.

Spicanardi vulgò dicta.

Spina alba species.

Stachis Fuchsi, Riechender andorn.

Stichas, Rhein Blumen.

Symphytum alterum, Wallwurtz.

Thamarix, *Myrica*, Tamariscen holz.

Tanacetum fatuum,

Tanacetum minus, Reinfarn.

Telephium, Mundfraut.

Thlaspi, Wilder sänff.

Thymus, Thym.

Tilia, Linden boum.

Tithymallus parallius, Wolffe milch.

Tithymallus myrthicus.

Tormentilla, Tormentill.

Tribulus terrestris.

Trifolia, Klee.

Triticum, Korn.

Verbascum, Mullfraut.

Verbena, Eysenhart/ ey senfraut.

Verbena altera Fuchsi.

Vicia sylvestres, Wild wicken.

Vicia, Wicken.

Vincetoxicum, Schwalmbenwurtz.

Vitis sativa & sylvestris, Weynraß zam vñ

Vlmaria.

(wild.

Viola septicolores, Sibenfarbwen blüm.

Viola anonymos.

(lyn.

Virga sanguinea Plinij, Hartrigel.

Vrtice, Kießlen.

Vuularia flore caeruleo, Balß fraut.

IVNIVS.

FRUCTVS ET SEMINA proferunt.

Alysson pratense.
 Azarum, Haselwurtz.
 Barba caprina.
 Caros.
 Cerasus, Birschenbaum.
 Colchicon, Zeytlosen / herbstblumen.
 Fragaria maior, minor alba, Erdbeerfraut.
 Filix, Farn.
 Graminis vel auenæ syl. genus.
 Graminis genera varia, Mancherley gras.
 Hordeum, Gersten.
 Lathum oxalys, Saurampfer.
 Malus præcox, Paradyß opfel.
 Malus verna.
 Ocymoydes rubrum.
 Pimpinella, Bibenell.
 Piper montanum, Syländ.
 Polymonium petraeum.
 Ribes, S. Johannis treübel.
 Viola purpurea.
 Vitis idæa.
 Vua crispa, Krauselbeer.

IULIO FLORENT.

Absinthium commune, Wurmet.
 Aconitum luparia dictum, Letißfraut.
 Aconitum cœruleum, Napellus, Woißwurtz.
 Alcea

- Alcea*, Sigmarßwurtzen.
Alga palust. & fluuiatiles, Wasser violen.
Alkali, Ein meerfraut.
Allium hortense & sylvestre, Knoblauch.
Alysson Ruellij.
Amaracus, Mayoran.
Ammi, Gschlächt des Fümichs.
Anagallis purpurea, Gauchheyl mit pur-
 purfarben Blümlinen.
Anagallis aquatica maior.
Androsæmon minus & *maius*.
Androsæmon Fuchsij, Rünradt.
Ammonæ altera, Gensjerich.
Anethum, Sill.
Angelica aquatica, Wasser angelicken.
Anisum, Zeniß.
Anonis, Ochsenbrech.
Anthemis, Chamillen Blumen.
Antirrhini genus albis floribus.
D. Antonij herba.
Apij genera, Eppich gschlächter.
Apparine, Kleberfraut.
Aristolochia longa, Osterluccey
Arthemisia, Beyfuß/rot Buggeln.
Asclepias, Schwalmenwurtz.
Ascyron Fuchsij.
Asparagus, Spargen.
Aspergula, Kleberfraut.
Astrantia, Neysterwurtz.
Atriplex syl. Wilder Burchhart.

IV L I V S.

- Bellote, Stinckender andorn.
 Bellis maior & minor, Neülle blümlin.
 Betula duo genera, Weyßer vñ roter man.
 Betonica, Battonicken, Betonien. (golt.
 Betonicum utile, Steinnägely.
 Betonica Pauli.
 Blicum (album) Meyer.
 Borrago, Burreisch.
 Botrys, Traubenfraut.
 Branca vrsina, Bärenflauwen.
 Bryonia, Hunds fürbe.
 Buphthalmus, cotyla non foetida, Rinds au-
 gen.
 Bursa pastoris, Teschelfraut.
 Cape, Zwideln.
 Calamintha tria genera, Steinnütz ge-
 schlächter.
 Calamintha montana.
 Caltha, Ringelblümen.
 Campanula, Balß fraut.
 Cannabis, Hanff.
 Capsicum, Indianischer pfäßer
 Caput monachi, halicacabus peregrinus.
 Cardiacum, Hertz gspan.
 Carlina, Eberwurtz.
 Carduus sine caule.
 Carduus arvensis maior.
 Carduus benedictus, Cardenbenedicten.
 Caryophyllus Indicus, Indianische nägele.
 Caryophyllata sylvestris.

- Centaurium maius* & *minus*, Tausend gul-
Centimorbia, Pfennigkraut. Oisfraut.
Chamaecyparissus, Hirtzwurtz.
Chamaedrys vera, Gamanderly.
Chamaedrys f. Fuchsi.
Chamaeleon, Eberwurtz.
Chamaemalum, Camillen Blumen.
Chamaepithys, Ye lenger ye lieber.
Chamaesyce, Eschlächte der wolffs milch.
Chondrylla minor, Genß distel.
Cicer sylvestre.
Cichorium, Wägwurt/wäglügen.
Cicuta aquatica, Schirling.
Cicutaria, Wilder Föissel.
Consolida regalis, Rittersporn.
Conuoluulus maior, Zaungloggen.
Conuoluulo similis, Schwarz winden.
Conyza species, Eschlächter & Dürrwurtz/
 oder Donnerwurtz.
Conyza genus tertium.
Conyza muralis.
Conyza palustris.
Conyzoides.
Corchorus quidam.
Coronopus flore caeruleo, Drakensfuß.
Cucurbita, Kürbis.
Cumin syl genus.
Cyanus, Roubblumen.
Cyclaminus prima.
Cyperus, Cypreßbaum.

IV L I V S.

- Cytisus suffrutux*, Weltsch Linsen.
Daucus sylvestris maior.
Daucus creticus, Bärwurtz.
Daucus palustris.
Dauci sylvestris species.
Dentillaria.
Dentillaria grivartensis.
Digitalis duplex, Fingerhüttraut.
Dipsacus, Kartendistel.
Dorychnium Monsp.
Draco hortensis.
Ebulus, Actenwurtz.
Echinopus meus.
Elleborus albus, Weiß Nießwurtz.
Eruca vera.
Eruca sylvestris, Wilder senff.
Erva d'arapic, Polonor.
Eruca Fuchsij.
Eruum Fuchsij.
Eruum syl. minus, Eruen,
Eryngium marinum, Eschlächet der mans-
 treiw.
Erysimum hortense.
Erysimum sylvestre, Hederich wild vñ zam,
Esula tria genera.
Esula rotunda, πικλος, Teufelsmilch.
Eupator, Auic.
Eupator, Græc. Agrimüngen oder monig.
Euphrasia, Augentrost.
Filius ante patrem triplex, Braun ald rot
 weiderich. Flos

- Flos Iouis, Himelrößli.
 Flos Portugal, Indianische negli.
 Fœniculum, Fenchel.
 Fœnugræcum, Bockshorn/kühorn.
 Fragaria, Erdbeerfrant.
 Frumentum turcicum, Türkisch Korn.
 Fumaria, Rottetaubentröpfli.
 Gallion, Gelberaugentrost.
 Galiopsis, Braunwurtz.
 Genista minor non spinosa et spinosa, Erd-
 pfrummen.
 Gentiana species, Modelgär.
 Glycirrhiza, Süßholz.
 Gnaphalion, Rürfrant.
 Graminis genus, gschlecht des gras.
 Gratiola.
 Hesenöl.
 Heliotropium minus, Flein Frebsfrant.
 Heliotropij genus, Vergiß mein nit.
 Heidenhyssop/Buchfrant.
 Helxine, tag vnd nacht.
 Helxine cyssampelos, Winden.
 Herniaria, Buchfrant.
 Hirundinaria, Schwalmenwurtz.
 Hyeracium pratense.
 Hypericum Fuchsj.
 Hyperici species maior, S. Johans frant.
 Hyppuris vtraq;
 Hyosciamus, Bilsamfrant.
 Hyosciamus ex Syria.

- Hyssopus, Byssop.
 Hyssopus alba.
 Diui iacobi flos, S. Jacobs blüm.
 Iasminum.
 Ibisus, Ibschen.
 Intubus, Endinien.
 Inula, Alantwurtz.
 Iouis flos, Tondernägeli.
 Iua aruensis quadam.
 Käberblümlin, im a d'raus.
 Lactuca syl Lattich.
 Lagopus, Hasen Flee.
 Lancea Christi, Natterzünglin.
 Lapathum aquaticum, Gschlecht der grind
 wurtz.
 Lappa maior, Kletten Fraut.
 Lauendula, Lauander.
 Lens, Linse.
 Lentibularia.
 Lepidium, Pfeffer Fraut/sensffraut.
 Leucoium marinum.
 Libanotis Italica.
 Libanotidis species.
 Lichen, Brunnensäberfraut.
 Limonium Fontanoni.
 Linaria, Flachs Fraut.
 Linum, Flachs.
 Linum syl. Wilder flachs.
 Lithospermum, Neei hirs.
 Locusta herba, Nüßlefraut.

Loti species.

Lotus sylvestris, Zigerfraut.

Lupini, Feig bonen.

Lysimachia lutea, rubra, gelb roth weiderich.

Maiorana, Mayoran.

Malva tria genera, pappelen schlecht.

Malva crispa.

Malva maxima.

Marrubium, Andorn.

Medica quedam.

Melilotus lutea et alba.

Meliloti species, Stein fleck.

Melissophyllon, Melissen.

Mentastrium, Katzenmüntz.

Mentha, Müntz.

Meon aquaticum.

Mercurialis, Scheiß fraut.

Millefolium, Garb.

Millefol. luteum.

Milium indicum, Indianischer hirs.

Myrica, Tamariscenholz.

Nardus vulgaris.

Nasturtium aquaticum, Brunnen kressich.

Nigella flore luteo, Schwarz kumel.

Noli me tangere, Spring fraut.

Numularia Fuchsi, Pfennig fraut.

Nymphaea lutea, Seeblumen gälb.

Ocymus duo genera, Basil gen.

Ocymoides album et rubrum.

Ononis, Ohsenbrech/höwbrech.

I V L I V S.

Oriofelinum.

Origanum vulgare, Wilder wolgemüt.

Orminum hortense & pratense, Scharlach.

Osyris, Barmkraut/flachskraut.

Panaces Chyronium.

Papauer cornutum et erraticum, & sat. Nag
samen geschlechter.

Parthenium, Mütterkraut.

Pastinaca tria genera, geschlecht der rüblis
nen/vnd Bastiney.

Pastinaca syl. Brenn Kraut.

Pecten Veneris.

Pentaphyllum, Fünffinger Kraut.

Peplus, Esula rotunda, teuffels milch.

Periclymenon, Speckgilgen.

Perficaria maculata, Flöck Kraut.

Pes anserinus, Zennwed.

Phalangitis, Graßgilgen.

Phalangitis maior.

Phalaris, Hispanisch saet.

Phu, Baldrian.

Plantago vtrazq; Wegerich.

Pimpinella maior, Bibenell.

Polymonium palustræ.

Polymonium.

Polyenemon.

Portulaca, Burtzel Kraut.

Potamogeton, Samkraut.

Prunella, Braunellen.

Psyllium, Flöck Kraut.

Pulegium

- Pulegium*, Poley.
Pulegium saxatile.
Pulegium ceruinum.
Ranunculus parvus.
Ranunculus palustris.
Ranunculi quidam, Hanenfuß gschlechter.
Rapum syl. Rapiungly.
Rapi syl species.
Rapistrum, Hederich.
Rhaphanus, Kettich.
Rhaponticum minus.
Rhododaphne vera, Oleander baum.
Rhododaphne pumila.
Ros Solis, Sonnen Douw.
Rubia palustris parva, Kleine rötte.
Rubia sativa, Rötte.
Rubia species, aspergula, Walmeyster.
Rubia syluatica, Wilde rötte.
Ruta, Kautten.
Samsuchum, Mayeran.
Salvia, Saluyen.
Saponaria, Wesch Fraut.
Satyrion basilicon, alpinum.
Satureia, Garten hyssop.
Saxifraga hircina duplex, Steinbrechartt.
Saxifraga lutea.
Scabiosa trium aut quatuor generum, Ap-
 stemfraut.
Scolymos, Cynera, Artischaru.
Scordium, Wasser battenmig.

IV L I V S.

Scorpioides Math.

Scorpioides quorundam.

Securidaca, Peltischen.

Sedum maius et minus, groß vnd klein hauß
wurtz.

Serpillum, Quendel.

Sisarum hortense, gerlin.

Sysarum syl. wild pasteney.

Syderitis prima, Blüt wurtz.

Syderitidis species, herba Roberti.

Silibus, Eberwurtz.

Sinapis duo genera, Senff.

Smilax hortensis, Welschbonen.

Smyrnum, groß Eppich.

Solanum, Nachtschatten.

Solanum somniferum, Schlafbeere.

Solanum perpetuum, Lenger ie lieber.

Solanum indicum.

Solanum pomiferum.

Sonchus vterq;, Gensdistel.

Sonchi species, Milchen.

Sorgi, Welscher hirß.

Sphondylium.

Spica celtica falsa, Barentappen.

Spinae albae species Fuchsf.

Spina alba quorundam.

Spina solstitialis.

Spina citrina.

Staphisagria, Speichelfraut.

Stachys herba, Weiß andorn.

Stoechas citrina, Rein blümen.
Symphytum alterum, Wallwurtz.
Tanacetum, Reinfarn.
Tarchon, Or syl.
Telephium, Wundkraut/forz zwang.
Thlaspi Lucae Gyni.
Tomentum.
Tormentilla, Tormentill.
Trifol. pratensis tria genera, Klee.
Trifol. bituminosum.
Triticum vaccinum, Rûweizen.
Typha, Rospen.
Verbascum, Wulffraut.
Verbascum murale.
Verbena foemina, Eisenkraut
Verbena rara.
Verbena recta, mas, Eisenhart.
Vicia syl. Wicken.
Viola matronalis, Winter violen.
Viola trinitatis, Denckenblümlin.
Virga aurea, Guldinrûst.
Vites quædam adhuc, etlich weynrâben.
Vitis syl caustica, Vielen.
Ulmaria.
Urtica mortua, Taubneßlen.
Vularia, Zepfle oder halßkraut.
Xiphium, Schwertel.

IN IULIO SEMINA PROFERVNT.

Acer minus, Ahorn.

IV L I V S.

Aconitum cœruleum, Kappenblümen.
Anacampteros, Knabenkraut.
Anagallis, Gauchheil.
Anguria, Angurien.
Aron, Teutscher jamber.
Beinhülzen.
Barba caprina, Geißbart.
Caryophyllata, Benedickt wurtz.
Clematis Aegyptia.
Cerasa dulcia, Süße kirsy.
Eldebeere.
Fraga rubra & alba, Erdtbeere.
Lantana.
Lapathi genera, Allerley ampferen lendy
 wurtz.
Lilium conuallium, Meyenblümlin meyen-
 ryßlin.
Lunaria Græca, gschlecht deß Monekaut.
Mala præcocia, Paradyßopsel.
Mahaleb.
Nigella, Schabab.
Orminum, Scharlach.
Periclimenon, Speckgilgen.
Phu hortense, Garten baldrian.
Pimpinella, Bibenell.
Pira præcoria & superba, Muscatbyrly.
Pira a fœno denominata, Rôwbyren.
Plantago aquatica, Wegerich.
Pruni genus, Blaw friechen.
Pseudocyperus.

Pulmonaria, Lungenkraut.
Rubus idæus, Hindbeerin.
Sambucus, Holder.
Spina ceruina, Creutz bere.
Viola inodora, Dreyfaltigkeit blüml.
Vitis, Weynraß.
Vitis idæa, maior, Noßbeer.
 Wyßmoßblümen.

A V G V S T O F L O R E N T.

Abinthium, Wurmst.
Abrotonum mas & fœmina.. Stabwurz.
Alcæa, Sigmarokraut.
Aconitum luteum, Rappenblümen.
Allium montanum, Bergknoblauch.
 Alprosen.
Althæa, Ibschen.
Alysson, Klaffenkraut.
Amaracus, Mayeron.
Amaranthus, Samet blüme/tausendschön.
Ammi, Ammey.
Anagallis, Gauchheil.
Anacampteros, Knabenkraut.
Angelica odorata, Angelicken.
Angelica aquatica.
Arthemisia, Buckelen/Beyfuß.
Arundo, Roß.
Asclepias, Schwalmenwurz.
Aster atticus Fuchf. Sternkraut/wägstrow.

AVGVSTVS.

Astrantia nigra.

Attractilis viraq; Wilder Veldsaffran.

Ballote, Stinctender andorn.

Balsamine viraq; Balsam öpfel.

Bellis hortensis, syluest. maior, minor, müllen-
blümli.

Ectonicum mont. duplex.

Borrage, Buretsch.

Botrys, Traubenkraut.

Bupthalmum, cotyla non foetida, Rindsaug/
füdillen.

Bursa pastoris, Teschel kraut.

Bryonia, Hundsfurbe.

Calamintha montana, Stein müng.

Caltha, Ringelblumen.

Capficum, Calcutischer pfeffer.

Carduus asininus com.

Caryophyllatae syl. genus, Nütwillen.

Centaurium minus flore rubro, Tausendgul-
din kraut.

Chamaemalum, Chamillen.

Chamaesyce, geschlecht der wolffsmilch.

Chelidonium maius, Schellkraut.

Chondrylla, Wild endiuien.

Cichorium syluest. satium, Sam Endiuien/
wegwart.

Cici, Wundelbaum.

Clinopodium, Steinpoley.

Cicuta, Schirling.

Cnicus, Wilder saffran.

Cola

Colchicon. Zeitloß/ herbſtblüm.

Consolida regia, minor, maior, Geſchlecht d
ſchwarz wurtz.

Conuoluulus maior, minor, Zünglogen.

Conuoluulo ſimilis, Orobanche.

Conyza utraq; Dürr wurtz.

Conyza aquatica.

Conyzoides cœrulea.

Conyzoides in collibus.

Costi hortensis genus minus.

Cucumis erraticus.

Cucurbitarum genera, allerley Kürbſen.

Cuminum genus ſylueſtre.

Cyperus, Cyperß.

Cyclaminus, Setiwebrott.

Dauci genus. Wilderüblin.

Detrahit.

Dipsacus minor, Kartendiſtel.

Doronicum, Gemßwurtz.

Dorychnium.

Echinopus carduus.

Erica, Heyd.

Eruca, Wilder weyßer ſenff.

Erysimon, Bederich.

Eryngium alpinum, Manſethreiß.

Eſula.

Euphrasia, Augentroſt.

Eupatorium Meſue, frömb dleberkraut.

Eupatorium aquaticum.

Filius ante patrem maior & maximus, weides
riß flein vnd groß.

AVGVSTVS.

Flos Portugal. maior, Indianische negeli.
 Flos louis, Himmel rößli.
 Fœniculum vtrunq; Fenchel.
 Frumentum Turcicum, Türkisch Korn.
 Galliopsis, Braunwurtz.
 Gentiana minor & maior.
 Gentiana palust. Bitterwurtz gschlechter.
 Geranium gratia Dei, Gottes gnad.
 Geum, Benedicta, Benedicten Fraut.
 Granum Nil.
 Helxine, tag vnd nacht.
 Helxine cyssampelos, Winden.
 Herniaria, Buchfraut.
 Hyeracium vtrunq; Gänßdistel.
 Hydropiper, flßh fraut/wasserpfeffer.
 Hypericon, S. Johans blüm.
 Hyssopus, Byssop.
 D. iacobi flos, S. Jacobs blüm.
 Ibiscus, Ibisch.
 Iberis Matthioli, Besemfraut.
 Inula, Alantwurtz.
 Lactuca sylvestris, Wilderlattich.
 Lagopus, Käzlyflee.
 Lancea Christi, Natterzünglin.
 Lathyrus, Sprüngeröner.
 Leucoia Medicorum.
 Limonium, bistorta, Natterwurtz.
 Linaria, flachsfraut.
 Lotus urbana, trisol, caballinum, Seiben-
 zeyt.

Lupus

Lupus salictarius, Hopfen.

Ly simachij genera, gschlächter d weiderich.

Malum insanum, Dollöpfel.

Malua vulgaris, Pappeln.

Malua hortensis maior.

Malua crispa.

Marrubium, Andorn.

Marrubio similis herba.

Medica floribus violaceis.

Melilotus lutea & alba, Unser frouwen
schüchlin.

Melilotus inodora, Steinklee.

Melon, Melopepon, Meloun.

Mentha genera, Mäntz geschlächter.

Mentastrum, Wilde münz.

Mercurialis, Scheyßkraut.

Milium, Hirß.

Millefolium album, purpureum, Garb.

Morsus diaboli, Teufels abbiß.

Nasturtium alpinum, Berg kressich.

Noli me tangere, Springkraut.

Nux Methel.

Ocymum, Basilien.

Ocymoides peregrinum.

Ocymoides floribus albis.

Ocymoides rubrum.

Orobanche Ruellij.

Origanum vulgare, Hohencostentz.

Oxylapathum vulgare. Lendy wurtz.

Papauer erraticum, Kornrosen.

AUGVSTVS.

- Pastinaca erratica*, Vogelnäst.
Pentaphyllum petraeum.
Periclymenū, Speckgilgen.
Perficaria, Pfersich kraut.
Petroselinum Fuchsj.
Peucedanum, Haarstrang/seiwosenchel.
Plantago, Wägerich.
Polycnaemon, Langer dost.
Polymonium, Widerstoß.
Porrum, Rouch.
Prunella, Brunellen/guldeguntzel.
Psyllium, Flößkraut.
Ptarmice, Nüßterwurtz.
Pulmonaria muralis, Büchspick.
Ranunculus pratensis, Moßblüm.
Rapum petraeum, Augenkraut.
Rapistrum.
Raponticum ignobile.
Rosa aliquando, Rosen.
Rubus maior, humilis, Brombeer.
Rubia syluest. Waldmeister.
Ruta, Kaurten.
Saponaria, Wäschkraut.
Satyrion, Unser frauen trähen.
Scabiosa, Apstemkraut.
Scordium, Wasser Rachenig.
Sedi vel phylli mont genera.
Serpillum, Quendel.
Seselis genus.
Syderitis prima.

Sisymbrium, Nisch oder wasser müntz.

Sylbus, Eberwurtz.

Sium cardamine, Brunenfressich.

Solanum, Nachtschatten.

Solanum vesicarium, Alkekengi, Judentirse.

Solanum perpetuum, Ye lenger ye lieber.

Solanum pomiferum, Goldopfel.

Solidago Sarracenta, Heydnisch wunde

fraut.

Sonchus agrestis, Hasenfdl.

Sonchi genus quoddam.

Sorgi, So:gliamen.

Spatula foetida, Welsch schwertel.

Sphondylion.

Strammenia Stechdpfel.

Tanacetum, Wurmfraut.

Thlaspi, Gyni.

Tormentilla, Tormentill.

Tribulus terrestris, Burtzeldorn.

Trifolia, Klee.

Verbascum, Wulffraut.

Verbascum apicibus purpureis.

Verbena, Eysenfraut.

Verbena lutea Fuchsi.

Viburnum, Schlingbaum.

Viola matronales Fuchsi, Winter violen.

Viola nigra syl. Same vnd wilde violen.

Viola inodora.

Virga aurea, Guldin rüt/Heydnisch wünd

fraut.

A V G V S T V S.

Vrtica, Nessel.

Vrtica mortua, Taubnessel.

Vuularia minima, Blauw augentrost.

A V G. PROFERVNT SEMINA.

Aconitum luteum, Gälb wolffwurtz.

Anemone mont. gschlächt der Fuchenschell.

Aron, Teütscher Ingber.

Balsamine pomifera, Balsam opfel.

Botrys, Traubenkraut.

Cerasa duracina, Rnelkirse.

Cornus, Thierlin baum.

Corylus sativa, Haselstand.

Daucigenus humile, Gschlächt des Füm-

Digitalis vtraq;, Fingerhut. (michs.)

Ebulus, Altich.

Eruca, Wilder weysser pfäffer.

Ficus in Italia, Feygenbaum.

Filius ante patrem maximus, Weiderich.

Fraga, Erdbeere.

Gentiana cruciata, Gschlächt der Bitterwurtz.

Genistella, Pfrummen blümle.

Herba S. Anthonij.

Hordeum, Gersten.

Hydropiper, Wasser pfäffer.

Hyosciamus Syriacus, Syrischen Bilsam.

Laureola vulgaris, Zyland.

Lithospermon, Meerbirß.

Lotus

Lotus sylvest. Wilder steinflee.

Lunaria Græca, Gschlächter des Monats
Fraut.

Lupus salictarius, Hopfen.

Lysimachij genus purpureis floribus.

Mali diuersæ, Allerley opfelbaum.

Mala insana, Döll opfel.

Mercurialis mas et foemina, S cheyßfraut.

Morus, Maulbeerbaum.

Nigella, Schwartz kummel.

Nux iuglans, Nußbaum.

Ocymoides peregrinum.

Oxyacantha, Erbselen.

Pastinaca maior, Rübli.

Phalaris, Canarien saamen.

Pira diuersa, Manchesterley biren.

Plantagines, Wä gerich.

Polygonaton erectum.

Pruna diuersa, Manchesterley Friecken.

Pseudomelanthium.

Quercus, Eichbaum.

Rubus Idæus, Hindrbeerin.

Rubus maior et minor, Brombeer.

Ruta capraria, Geyß raute.

Sambucus, Holderbaum.

Saxifraga hircina.

Seseli montan. Berg kummel.

Sonchus, Hasenöl/gänß distel.

Sorbus aucuparia, Wiclâschen.

Spina appendix, Weyßdorn.

AUGVSTVS.

Spina alba Dioscor. Mariendistel.
 Symphitū magnū, Wallwurz/Schwartz.
 Tanacetum, Wurmfrant. (wurz.
 Tilia yrbana, Lindenbeum.
 Tormentilla, Tormentill.
 Trifolium bitumnosum, Hartzflee.
 Vitis Idæa, nigra et rubra.
 Vitis syluest caustica, Vielen.
 Vitis satiuā, Weynraß.
 Vrtica mortua, Taubnessel.

SEPT. FLORENT.

Alfina maior, Rännendarm/ vogelfraus
 Amaracus, Meyoran. (Gschlächt.
 Ammi.
 Asteratticus, Fuchsj.
 Ballote, Stinctender andorn.
 Bellis minor, Mülleblümlin.
 Ectonicum altile, Graß nägeli.
 Borrage, Bozetsch.
 Bursa pastoris, TäscheFraut.
 Calendulæ. Ringelblümen.
 Calamintha mont. Gschlächt der Mütz.
 Cardamomū Arabicū, Calecutischer psaffer.
 Carduus asininus.
 Carduus benedictus. Cardobenedict.
 Chamæmalum, Chame millen.
 Cichorium syl. Wilder Endiuien art.
 Colchicon, Herpstblümen.
 Costus hortensis.

Crocus,

Crocus, Saffran.

Cucurbita, Kürbs.

Cyclaminū, Seiwobiot.

Dipsacus, Kartendistel.

Dorycnium.

Echion, Wilde Ochsenzung.

Ennea dynamis Polonor.

Erica, Heyd.

Filices, Farn.

Flos Iouis, Himmelsrößli.

Foeniculum, Fändel.

Granum Nil.

Hieracium minimum.

Indici flores crocci.

Lactuca, Lattich.

Lactuca sylvestris genus, Wilder Lattich.

Lapathi genus, Geschlecht der Ländewurz.

Lauendula pauca, Lauendel.

Leucis, Gälbe Nägele.

Libanotis, *Coronaria*, *Rosmarinus*, Roosmaryn.

Lotus urbana, Seibengezeyt.

Malua quaedam domestica, Pappeln.

Malua crispa.

Malum insanum, Bollöpfel.

Mercurialis, Scheyskraut.

Morsus diaboli, Teufels abbis

Mastartum, Bressich.

Nil granum.

SEPTEMBER.

Ocymoides peregrinum minus.
Pentaphyllum minus, Fünffingerkraut.
Personata, Großflecken.
Polycnemon origano simile.
Prunella vulgaris, Braunellen.
Ranunculus pratensis, Moßblumen/hanen
Rhapontici genus degener. (fuß.
Saliunca.
Satyrii genus quoddā, Gschlächte der stendel
Serpillum, Quendel. (wurtz.
Solanum, Nachtschatt.
Trichomanes, Roter Steinbrech.
Trifolium pratense flore albo, Weyssen flec.
Verbasco similis, gschlächte des wulfrauts.
Verbena, Eysenkraut.
Verbena lutea Fuchsj.
Viola inodora, Dencrenblümlin.
Viola flammea, Dreyfaltigkeits Blümlin.
Viola autumnales cœrulea, Gschlächte des
 Modelgeers.

SEPTEMBRI PROFERUNT femina.

Acer minus, Klein Maßholtern.
Acorus vulgaris, Gälb schwerttel.
Alnus, Erlinboum.
Amydalus, Mandelboum.
Apium, Eppich.
Arbutus, Hagdorn.
Balsamine vtraq;, Balsamöpfel.

- Bellis*, Mäulenblümlin / Maßlieben.
Betula, Birchen.
Bryonia, Hundsfürbs.
Buxus, Buchsbaum.
Cardamomum Arabicum,
Castanea, Keitenbaum.
Cicuta maior, Schirling.
Convolvulus maior, Winden.
Corylus syl. Wildhaselnuß stand.
Cucurbitarum genera, Allerley Fürbsen.
Daucigenus humile, Wilder Kümmeel ges.
Echion, Hundszung. schläch.
Fagus, Buch.
Ficus, Feygenbaum.
Foeniculum, Fenchel.
Glycyrrhiza, Süßholz.
Ilex aquifolia, Stächend palmen.
Juniperus, Kechholteren.
Lactuca sylvestris genus.
Lantana, Kleiner mälbaum.
Ligustrum, Berngerten.
Malus diversorum generum, Mancherley Äpfel.
Nux iuglans, Nußbaum.
Nux vesicaria, Dimpertüßle.
Ornus, Großer mälbaum.
Oxyacantha, berberis, Erbselen.
Papaver erraticum, rheas, Kornrosen.
Pastinaca erratica, Wilde räblin.
Periclymenum, Speckgilgen.
Persicus, Pfersichbaum.

SEPTEMBER.

Pirorum genera diuersa, Allerley biren.
 Plantago, Wägerich.
 Populi nigra, Schwarz Sarbach.
 Pruni genera quædam urbana, Siparten.
 Prunus syluest. Schlechenboum.
 Quercus quædam, Etliche Eichboum.
 Rhamni genus, Sandthorn.
 Rosa, Rosen.
 Rubus maior, Brombeer groß.
 Sabina, Seuy boum.
 Sambucus, Holderboum.
 Sambucus aquatica Tragi.
 Saxifraga pumpinelle similis.
 Siser, Mören oder gälb rüben.
 Sorbus, Sperwerboum.
 Spina ceruina, Creützbeer/wägdorn.
 Spina appendix, spina alba, Mariendistel.
 Tamarix, Tamarisc.
 Taxus, Ybenboum.
 Thymelæa genus, Wolffsmilch gschlächte.
 Virga Sanguinea Plinij, Hartrigel.
 Viscum, Mistel.
 Vitis domestica, Weynrâb.
 Vlmaria
 Xanthium, lappa minor. Spizfletten.
 OCTOB. FLORENT.
 Alsine maior & minor, Sännendarm.
 Althæa peregrina.
 Amaranthi Pliniani species.
 Ammi.
 Bellis maior & minor, Klein vnd groß mü-

in Blümlin/maß lieben.

Betonica altilis, Graßnägelin.

Borrago, Buretsch.

Bursa pastoris, Tetschel Fraut.

Calendula, Ringelblumen.

Cardamomū Arabicū, Catecusscher pfeffer.

Cichorij genus, Mülchen.

Cicuta, Schirling.

Clematidis Aegyptiacae genus.

Conyzae genus, dürrwurtz gschlecht.

Costus hortensis, costwurtz.

Doronicum.

Erysimum hortense garten hederich.

Foeniculum, Fenchel.

Gentiana pumila, gschlecht der Enzian.

Herba lula, frömbd leberfraut.

Helxine, tag vnd nacht.

Hieracium altum, Rösle Fraut.

Iberis Mathioli, Seiff Fraut.

Iouis flos purpureus & albus, Himmelsrößlin.

Iulia herba, frömbd läber Fraut.

Lapathum, Lendy wurtz.

Latoris Plinij.

Leucoium purpureum.

Libanotis coronaria, Reßmarin.

Lotus urbanus & syl.

Lunaria species, mons Fraut gschlechter.

Ocymoides, Baßilien gschlecht.

Malva crispa, Winter rösen.

Nigella sativa, Schabab.

OCTOBER.

Polycnemori origano simile.

Prunella vulgaris, Braunellen.

Ranunculi pratensis. Geißblumen/hanensfuß.

Raphanus, Rettich.

Satureia, Hünerfülle/Isöple.

Scabiosa, Apostemkraut/grundkraut.

Securidaca, Peltischen.

Senecio, Weinbrech/creütz wurz.

Sideritidis genus, gschlecht deß Juden=Frauts.

Sonchus quidam, Hasenfuß.

Thlaspi Gyni, Wildfressich.

Tithymallus heliotropius, Milch kraut.

Trifolium pratense, groß flec.

Viola dasypus, gschlecht der Osterluccey.

Viola septicolor, Väncken/treysaltigkeitsblümlin.

Urtica mortua, Taubneßlen.

OCTOBRI SEMINA

proferunt.

Atriplex sylvest. wilderburchhart.

Cardamomū Arabicū, Calcutischer pfeffer.

Carduus asininus.

Cichorij genus, Wäggwart.

Convolvulo similis.

Cornus, Welsch kirschen/furbeere.

Cucurbitæ, Kürbisen.

Fraxē

Fraxinus, Aeschbaum.

Helxine, tag vnd nacht/S. Petters kraut.

Hieracium alterum, Teuffelskraut.

Iris non foetida.

Juniperus, Wäccholteren.

Lepidium, Senffkraut/pfefferkraut.

Libanotis ferulacea genus.

Ligustrum, Kerngert/Beynhölzlin.

Mala quædam, etlich öpfel.

Mespilus, Nâspfen.

Oxyacantha, erbselen/weynlegelin.

Pastinaca erratica, Wilde rüble.

Persica duracina, Rote pferfich.

Personata, Klettenkraut.

Pira quædam, etlich biren.

Polycnemum origano simile, gschlecht deß wil
den wolgemüts.

Prunus, Kriechenbaum.

Prunus syl. Schlehen.

Ruta, Raut.

Sabin., Seuenbaum/seuenpalmen.

Satureia, Hünerfülle/Isöple.

Senecio, Creütz wurtz.

Sifer, Gelbe rüben.

Solanum amplexicaule, gschlecht der nacht-
schatten.

Sonchus pinguis, Hasenföl.

Sorbus torminalis, Baum der holzburly
treget.

Verbena, Eisenkraut.

OCTOBER.

Viscum, Mistel.
 Vitis urbana, Weynräben.
 Vitis sylvestris caustica, Nielen.
 Xanthium, Klein Kletten.

NOVEMBRI FLORENT.

Arthritica inodora, Schlüsselblumen.
 Bellis hortensis Milleblümle.
 Borrago, Buretsch.
 Bursa pastoris, Terschelkraut.
 Calendula, Ringelblumen.
 Carduus asininus.
 Cichorium sylvestre, wägwurt.
 Consiligo, Leutskraut.
 Conyza Laniflora, groß dürrwurtz.
 Fumaria, Erdrauch/rotte taubenkröpslin.
 Hyssopus rara, Kirchenhyssop.
 Iouis flos rarissimus.
 Leucoia rara, Bälbe nägelin.
 Locusta herba, Müßlin kraut.
 Mercurialis, Scheißkraut.
 Ocymoides, Wildebasilien.
 Papaver cornutum, Nagsamen mit käsen.
 Ranunculus, geißblumen/moßblumen.
 Ruta, Rauten.
 Saxifraga pimpinella similis, Steinbrech.
 Scabiosa, Apostemkraut.
 Senecio, Heimbrech/erütz wurtz.
 Sonchi vel lactuca syl. Bajenöl.

Thibhy:

Tithymali genus paruum, Milchfraut.
Viola septicolor, Sänckenblümly.

SEMINA PROFERVNT NOVEM.

Alnus, Erlin boum.
Carduus asininus.
Costus hortensis, Costwurcz.
Dipsacus minor, Kartendistel.
Ligustrum, Kerngarten.
Papauer cornutum, gehornter magsamen.
Plantago, Wägerich.
Polycnemon.
Rosa, Rosen.
Saxifraga, Steinbrech.
Solanum com. Nachtschatten.
Solanum lignosum, Je lenger ie lieber.
Sonchi & *lactuce* syl. Wilder lattiſch.
Spina appendix, Nälbeere.
Vitis sylvestris caustica, Vielen.

DECEMBRI FLORENT INITIO
 præsertim & locis tepidioribus.

Arthritica species quædam, Schlüsselblü-
 men gſchlechter.
Bellis hortensis, Nüßly blümlin.
Betonicum altile, graß blümen.
Borrago, Buretsch.
Calendula, Ringelblümen.

DECEMBER.

Cariophylli Indici, Indianische negeli.
Consiligo, Leißfrant.
Cynoglossus minor, Hundezung gschlecht.
Helleborus niger, Christwurtz.
Hepatica aurea, Edel läberfrant.
Hypoglossis, Zepflinfrant.
Hieranij species apij solijs.
Laurus Alexandrina.
Lithospermi florum principia.
Ruscus, Neußdorn/Feerbürsten.
Senecio, Creißfrant.
Tithymallus helioscopius.
Viola heptachrus.
Vrtica mortua, Taubneßel.

FINIS.